

17011
all
106:2
M-B
B67
1779
Library of the Museum 22

OF

COMPARATIVE ZOÖLOGY,

AT HARVARD COLLEGE, CAMBRIDGE, MASS.

Founded by private subscription, in 1861.

~~~~~  
DR. L. DE KONINCK'S LIBRARY.

No. 665.














*Ignatii a Born Equ.*

*Academiae Imp. Naturæ Curiosorum, Petropolit.  
Londinens. Holmens. Göttingens. Upsaliensis, Londin.  
gothorum, Senens. Monacensis, Burghaus. Pata.  
vinæ nec non Physicorum Bercliniensium Sodalis.*

*INDEX  
Rerum Naturalium  
Musei  
Cæsarei Vindobonensis  
Pars I.<sup>ma</sup>  
Testacea*

---


*Verzeichniß  
Der natürlichen Seltenheiten  
des k.k.  
Naturalien Cabinets  
zu Wien  
Erster Theil  
Schalthiere*

---

*Vindobonæ, ex Officina Krausiana. 1778.*

2473  
12





C. Schütz.

## AD LECTOREM.

*Si publicas rerum naturalium collectiones  
opportuna atque efficacia ad dilatandam  
historiae naturalis cognitionem subsidia esse  
conuenit, finis hic nulla alia ratione obti-  
netur, quam si cuius naturae scrutatori  
aditus aperiatur ad ea ex thesauris istis de-*

\*

*pro-*

## AD LECTOREM.

*promenda, quae siue ad vniuersale aliquod systema concinnandum, perpoliendumue, siue ad singulares observationes instituendas vsui ipsi esse possunt.*

*Patent quidem Musea rerum naturalium passim curiosorum conspectui, & quidquid in iis rarum & singulare admirandum est, a Praefectis diligenter ostenditur. At vero si perpendimus, quam velocibus, & quasi fugientibus oculis, totum hunc corporum naturalium apparatus, ob temporis, quod ei exhibendo definitum est, angustias, percurrere oporteat; quam exigua mora in hoc illoue corpore, quod animad-*  
*uer-*

## AD LECTOREM.

*uersionem nostram maxime excitat, obtutum attentionemque defigere liceat; quam raro singulae partes naturali & continua serie sua exhiberi possint, ac demum quam plena molestiae tædiique eorum, qui Museis istis praesunt, sit occupatio, eandem, ut ajunt, crabem fere quotidie recoquere, operamque suam saepius apud homines scientiae naturalis prorsus ignaros & magis curiositati suae, quam scientiae amplificandae studio seruientes perdere; facile profecto videbimus: Musea haec semper aliena fore a proposito, donec res naturales iis contentae accurate describantur, atque ea*



## AD LECTOREM.

ratione ad notitiam manusque omnium, qui  
iisdem uti volent, perueniant. Sane si-  
ne tali instituto pretiosissima licet & rarif-  
sima naturae cimmelia exteris maximam  
partem incognita, indigenis vero inutilia  
remanere necesse est.

Id animo reuoluens *AVGVSTA* on-  
stra, non patriae tantum, sed & scien-  
tiarum artiumque Mater, cuius gloriosif-  
simi, sapientissimique imperii haec aeterna  
& peculiaris erit memoria, prouidisse ip-  
sam singulari sollicitudine omnia, quaecun-  
que ad instituendos excolendosque subdito-  
rum animos conducere valeant, locupletif-  
si-



AD LECTOREM.

*simum ac pretiosissimum rerum naturalium thesaurum, qui in palatio Caesareo Viennae adservatur, quemque FRANCISCO Augusto, Diuo illius Conjugi, sagacissimo rerum istarum aestimatori, conquisitorique solertissimo, acceptum referimus, publici juris facere, atque ad id peragendum opera mea — quamvis praeter meritum — uti decrevit. Parui, ut par erat ILLIUS mandato, atque una cum exquisitis artificibus operi concinnando, exornando, perficiendoque illico manus admoveui, cuius Volumen primum propediem typis exscriptum prodibit in lucem.*

*Quo-*

## AD LECTOREM.

*Quoniam vero neque omnes officii mei partes exsecutus, neque totam beneficentiae AVGVSTAE amplitudinem complexus videri poteram, si diligentiam meam soli illi operi adornando impenderem, majoris utpote pretii, quam ut a quolibet historiae naturalis studioso comparari possit, ad indicem hunc, facile cuius parabilem, conscribendum, animum adjeci. Is enim & iis, quibus Museum hoc Caesareum videndi est facultas, quidquid eodem continetur, intento velut digito commonstrabit, & aliis, qui alibi degunt, scientiae naturalis cultoribus, haud mediocri adjumento erit.*

*Ni-*

## AD LECTOREM.

*Nil aliud Indici huic inseri poterat, nisi quod re ipsa in Museo nostro reperitur. Vnde & corpora eodem contenta non secundum novum quodpiam, a me fortasse condendum systema, sed secundum aliquod ex iis, quae jam ab aliis constituta habemus, disponi oportebat. Qua re & illa difficultate me expediui, qua naturalis historiae scriptores in novis novarum rerum nominibus apte imponendis passim implicantur.*

*In prima hac parte, quae Conchyliorum indicem exhibet, diligenti omnium prope Conchyliographorum instituto examine, mag-*

## AD LECTOREM.

*ni Linnaei systema secutus sum, propterea :  
quod omnium, quae adhuc extant — quid-  
quid alii obloquantur — sit absolutissimum ;  
quod characteres generum, familiarum, spe-  
cierumque singularum, quoad in systemate,  
quod sola testarum figura nititur, fieri po-  
tuit, accuratissime designet ; quodque tam-  
diu praestantiam suam, auctoritatemque  
tuebitur, donec Adansonii, Basteri, Otto-  
nes Mülleri consequentium seculorum, stu-  
dio, sagacitate & industria Svammerda-  
mii, Bradleii, Pouparti, & Reaumurii  
animati, accuratam descriptionem formae,  
partium, genii, viuendique rationis, quae*



AD LECTOREM.

*unicuique testaceorum animalium propria sunt, praebeant; ut tandem genuinum Conchyliorum systema naturale, aut saltem ad naturam proxime accedens constitui possit.*

*Linnaei igitur, ut dixeram, systema secutus, nequaquam tamen presse adeo vestigiis ipsius institi, ut non interdum generum ac specierum definitiones ab ipso propositas distinctius enarrare, & si dicere fas est, emendare ausus fuerim. Neque non conatus sum, singulas Concharum partes decentioribus nominibus insignire; figuras a Linnaeo commemoratas rectius indicavi, du-*  
*bias*

*bias omisi, easque ex recentioribus Conchyliologis supplui, parum curans: quid teutonica Linnaeani systematis editio, Index Linnaeanus in Knorriana Conchyliographia, & Jo. Sam. Schröterus in Bibliothecae lithologico conchyliographiae Tomo IV. peccauerit.*

*Eas Conchyliorum species, quas Linnaei systema haud complectitur, methodo, summo huic viro usitata, descripsi, illis familiis, quibus procul dubio ipse easdem inserturus erat, singulas inserui, notas omnes characteresque fusius declaravi, &*  
*ad*

## AD LECTOREM.

*ad accuratas earundum effigies, quae in maiori opere conparebunt, prouocaui.*

*Denique singulorum testaceorum nomina triuialia, quibus gallica, anglica & belgica lingua compellantur, ex optimis harum nationum scriptoribus adieci; generaque, familias, species, & varietates eorum, quae hoc indice continentur, apposita alphabeti littera distinxi, ut ii, qui Museum lustraturi sunt, omnia facilius inueniant.*

*Eadem methodo & in aliis thesauri huius Caesarei rerum naturalium Classibus describendis progrediar, quarum quidem*  
*ma-*

AD LECTOREM.

*maturationem , tametsi pluribus aliis negotiis destinear , tanto certius polliceri audeo , quod Viri doctissimi Georgii Sebastiani Helbling de Hirzenfeld , qui pro singulari , qua in rerum naturalium cognitionem fertur , studio , eximiam hoc in genere doctrinam sibi comparavit , amica opera me non parum adjuvari hic gratus profitear.*



## An den Leser.

Sollen öffentliche Naturaliensammlungen wirksame Hilfsmittel zu Erweiterung der Kenntnisse in der Naturgeschichte seyn, so wird dieser Entzweck nur dadurch erreicht, wenn jedem Naturforscher Gelegenheit verschafft wird, aus diesen Behältnissen natürlicher Seltenheiten die erforderlichen Materialien herzuholen, deren er etwann zur Darstellung eines allgemeinen Natursystems, zur Vervollkommnung desselben oder zu seinen einzelnen Beobachtungen bedarf. Zwar

## An den Leser.

stehen die meisten Naturalien Kabinete dem  
Wissbegierigen offen , und werden von den  
Vorstehern derselben vorgezeigt. Wenn man  
aber weiß , wie flüchtig man meistens in dem  
kurzen Zeitraume , der zu diesen Vorzeigungen  
bestimmt ist , den ganzen Vorrath natürlicher  
Körper durchzugehen gezwungen werde ; wie  
wenig man sich bei einem oder dem andern Ge-  
genstände , welcher etwann unsre Aufmerksam-  
keit mehr reizet , verweilen dürfe ; wie selten  
alle einzelne Stücke in ihrem Zusammenhange  
vorgezeigt werden können ; wie unangenehm  
es den Vorstehern dieser Sammlungen fallen  
müsse , eine und eben dieselbe Sache fast täg-

lich

lich zu wiederholen , und ihre Mühe öfters an Leute zu verschwenden , welche ohne alle Vorbereitung und Kenntniß in diesem Fache mehr aus Neugierde , als aus Verlangen sich zu unterrichten herbeigelockt werden ; und daß endlich bei derlei Anstalten dennoch immer diese Schätze der Natur dem auswärtigen oder entfernten Gelehrten verborgen bleiben ; so wird man sich leicht überzeugen , daß der Hauptzweck , welcher die Errichtung öffentlicher Naturalienkabinete veranlasset hat , in so lang verfehlet werde , bis diese nicht durch eine vollständige Beschreibung aller einzelnen Theile derselben allgemein bekannt gemacht und

## An den Leser.

auf diese Art gleichsam in die Hände eines jeden, der solche benützen kann, gebracht werden.

Unsere erhabene Monarchinn, deren weiseste Regierung sich durch eine unumschränkte Sorgfalt für alles, was zum Unterrichte und zur Aufklärung ihrer Unterthanen beitragen kann, vorzüglich auszeichnet, hat aus diesen Beweggründen die öffentliche Bekanntmachung des k. k. Naturalienkabinetts, dessen Entstehung und Daseyn wir Allerhöchst Ihrem verewigten Gemahl verdanken, anzubefehlen, und diese Arbeit — wieder meine Verdienste — mir aufzutragen geruhet, an welche sowohl ich, als die zur Vervollkommnung und Verschönerung

die



An den Leser.

dieses Werks ausersehenen Künstler unverzüglich Hand angelegt haben; so daß wir im kurzen den ersten Band der Beschreibung des k.k. Naturalienkabinets zu Wien herauszugeben, im Stande seyn werden.

Vielleicht würde ich aber meiner Pflicht und der allerhöchsten Absicht nicht ganz Genüge leisten, wenn ich mich bloß auf jene kostbare Ausgabe, die ihres höhern Preises wegen nicht gemeinnützig genug werden dürfte, einschränken sollte. In dieser Rücksicht habe ich das gegenwärtige, minder kostbare Verzeichniß entworfen, welches jenen, die dieses Kabinet selbst zu besehen Gelegenheit haben, zu einem

An den Leser.

Handbuche dienen, den von dieser Hauptstadt entfernten Naturforschern aber immer noch einen zureichenden Begriff von den darinn befindlichen Seltenheiten geben kann.

Da ich in diesem Verzeichnisse bloß diejenigen natürlichen Körper, welche sich wirklich in diesem Kabinete befinden, anführen darf, so folgt aus diesem Umstande, daß ich solches nach keinem eigenen Systeme, welches immer sehr unvollkommen ausgefallen seyn würde, ordnen konnte, sondern hiezu eines der schon bekannten Systeme wählen mußte, wodurch ich zugleich der unvermeidlichen Schöpfung neuer

Bez

Benennungen , welche das Studium der Naturgeschichte so sehr erschweren , auswich.

Bei diesem ersten Theile , welcher das Verzeichniß der Konchylien enthält , habe ich nach einer sorgfältigen Prüfung der meisten Konchylien Werke das Linneische System gewählt , weil es , was man auch immer dagegen einwenden mag , unter den bisher bekannten , das vollständigste ist , die unterscheidenden Kennzeichen der Geschlechter , Abtheilungen und Arten — so viel es sich in einem künstlichen Systeme, welches sich bloß auf die Gehäuse der Schalthiere gründet, thun läßt — am richtigsten und bündigsten angiebt , und diesen

## An den Leser.

seinen Vorzug in so lang behaupten wird; bis uns nicht die Adansone, Bastere, und Otto Müllere der künftigen Zeiten, mit dem Scharfsinn dem Beobachtungsgeist und der Genauigkeit eines Swammerdams, Bradley, Poupert, und Neaumur ausgerüstet, die vollständige Beschreibung der Gestalt, Theile und Lebensart eines jeden Schalthieres liefern werden, um alsdenn ein natürliches, oder der Natur sich mehr näherndes Konchyliensystem zu erbauen.

So pünktlich ich nun in dieser Beschreibung der Konchylien, der Linneischen Ordnung und Eintheilung nachgegangen bin, so habe ich dennoch meinem Führer nicht so knechtlich fol-

gen



gen wollen, daß ich mir nicht hätte erlauben sollen, die meisten Bestimmungen seiner Geschlechter und Arten deutlicher zu erklären, und — wenn ich mich so was zu sagen erlauben darf — vielleicht zu verbessern. Auch wagte ich es die Benennungen der einzelnen Theile der Muscheln anständiger auszudrücken; dann berichtigte ich die von Linne angeführten Figuren, ließ die zweydeutigen hinweg, und ergänzte dieselben aus den neuern Konchyliologen, ohne mich durch die deutsche Ausgabe des Linneischen Natursystems, und durch die Linneischen Register in dem Knorr'schen Konchylienwerke, und in dem vierten Bande des Schröter'schen

An den Leser.

rischen Journals für die Liebhaber des Steinreichs und der Konchyliologie irre führen zu lassen.

Diejenigen Konchylien, welche in dem Linneischen Systeme nicht enthalten sind, beschrieb ich nach dieses berühmten Systematikers Methode, ordnete sie in jene Familien, wohin er sie vermuthlich selbst gesetzt haben würde, erklärte sie durch eine weitläuftigere Beschreibung ihrer Kennzeichen, und berief mich auf die Abbildungen, welche wir in der Beschreibung des k. k. Kabinetts sowohl von diesen als von allen jenen, die bisher in keinem Konchylienwerke

An den Leser.

werke gemallet, oder etwan nicht gut gemallet sind, liefern werden.

Endlich habe ich die holländischen, französischen und englischen Trivialnamen aus den bessern Schriftstellern einer jeden Nation hinzugefügt, und die in diesem Verzeichnisse enthaltenen Geschlechter, Unterabtheilungen, Arten und Abarten mit einem nach alphabetischer Ordnung hinzugesetzten Buchstaben bezeichnet, um denjenigen, welche dieses Kabinet besuchen, die Auffindung der Stücke, die sie etwann vorzüglich zu sehen wünschen, zu erleichtern.

Nach diesem Plane werde ich in der Beschreibung der übrigen Theile dieser kais. Sammlung

An den Leser.

lung fortschreiten ; deren baldige Vollendung ich — ungeachtet meiner übrigen Beschäftigungen — um so gewisser versprechen darf, da mir diese Arbeit durch die freundschaftliche Mitwirkung des Hrn. Helbling von Hirzenfeld — eines Mannes der von einem seltenen Hange zur Naturgeschichte hingerissen, diese Wissenschaft, in welcher er sich die ausnehmendsten Kenntnisse erworben hat, sein einziges Geschäft seyn läßt, treflich erleichtert wird.




EX-



# EXPLICATIO

## CITATIONVM ABBREVIATARVM.



### Erklärung der angeführten Verkürzungen.



*Adans. Seneg.* Histoire naturelle du Sénégal, Coquillages par M. Adanson, avec des figures, a Paris 1757. 4.

*Argenv. Conch. Zoom.* L'histoire naturelle éclaircie dans une des ses partie principales la Conchyliologie, augmentée de la Zoomorphosie; nouvelle edition, avec des figures en taille douce, par M. (Argenville) a Paris 1757. 4.

*Aldrov. Test.* Ulyssis Aldrovandi de exanguibus. Libri quatuor &c. cum figuris, Bononiae 1642. fol.

*Bast. Subf.* Jobi Basteri Opuscula subseciva, Tomus I. & II. cum Figuris, Harlemi 1762. 1765.

*Bell.*

# EXPLICATIO

*Bell. aq. Petr.* Bellonii de aquatilibus, cum figuris  
Parif. 1553. fol.

*Berlin. Mag.* (Hrn. D. Martini) Abhandlung von  
Erdschnecken mit Kupfern im II. und III. Ban-  
de des berlinischen Magazins. Berlin 1766. 8.

— — (Ebendes.) Abhandl. von Conchylien der süßen  
Wässer, mit Kupfern im IV. Bande des Ber-  
linischen Mag. 1767.

*Bonan. Mus. Kirch.* Museum Kircherianum a Philip-  
po Bonnano S. I. cum figuris, Romae 1709.  
fol.

*Brown. Hist. Jam.* The civil and natural history  
of Jamaica with figures, by Patrik Browne.  
London 1756. fol.

*Clem. Naturf. Herrn Past.* Chemnitz Abhandlung  
von dem innern Wunderbau mancher Schne-  
cken, mit einer ausgemalten Kupfertafel im  
IX. Stücke des Naturforschers. Halle 1776. 8.

*Column. purp. Fabii* Columnae opusculum de Pur-  
pura cum figuris. Kiliae 1675. 4.

*Da Cost. Elem.* Elements of Conchology by Emanuel  
Mendes Da Costa with seven illuminated Pla-  
tes. London 1776. in. 8.

*Dav.*

# CITATIONVM ABBREVIATARVM.

*Dav. Cat. syst.* Catalogue systématique , & raisonné de Curiosités de la nature , & de l'art , qui composent le cabinet de M. Davila. avec figures en taille douce. Tome I. a Paris 1776. 8.

*Ellis. Transact.* An Account of several rare species of Barnacles in a Letter from. John Ellis. with figures, in the philosophical Transactions. Vol. L. Part. II. for the Year 1758. Wittenberg. 1771. 4.

*Fav. Dictionnaire* d'histoire naturelle, qui concerne le testacées ou les coquillages de Mer , de terre , & d'eau-douce par M. l'Abbé Favart d'Herbigny. Tome I. — III. a Paris 1775. 8.

*Geof.* Traité sommaire des coquilles tant fluviatiles, que terrestres, qui se trouvent aux environs de Paris par M. Geoffroy. a Paris 1767. 12.

*Gev. Belust.* Monatliche Belustigungen im Reiche der Natur an Konchylien und Seegewächsen mit illuminirten Kupfern. Hamburg 1755. gr. 4. mit deutsch und französische Text.

*Ginan. adr.* Opere postume del Conte Giuseppe Ginanni Ravennate con figure. Tomo II. in Venezia 1757. fol.

*Gualt.*

## EXPLICATIO

*Gualt. Test.* Index testarum conchyliorum , quae  
adservantur in Museo Nicolai Gualtieri cum  
tabulis aeneis. Florentiae 1742. fol.

*Helbl. Abb. e. Priv. Ges. in Boehm.* Georg. Sebast.  
Helblings Beiträge zur Kenntniß neuer und  
seltener Conchylien mit Kupfertafeln , im IV.  
Bande der Abhandlungen einer Privatgesellschaft  
in Böhmen. 1778. gr. 8.

*Hill. Hist. of. Anim.* An History of Animals illustra-  
ted with figures. by John Hill. London 1752.  
fol.

*Klein Meth. Ostr.* Jac. Theod. Klein Tentamen  
methodi ostracacologicae cum figuris. Lugd.  
batav. 1753. 4.

*Knor. Del. Nat.* Deliciae naturae , von Georg  
Wolfg. Knorr , mit deutschen und französischen  
Text und ausgemalten Kupfertafeln. I. Theil.  
Nürnberg 1766. gr. fol.

*Knor. Vergn.* Vergnügen der Augen und des Ge-  
müthes in Vorstellung einer Sammlung von  
Schnecken und Muscheln , mit ausgemalten  
Kupfertafeln I. — VI. Theil. Nürnberg. 1757 —  
1772. 4.



CITATIONVM ABBREVIATARVM.

*Koelr. nov. com. petr.* Descriptio tubiporae maris albi indigenae, auctore J. T. Koelreuter cum tabulis aeneis in nouis commentariis academiae scientiarum petropolitanae. Tom. VII. Petropoli 1761. 4.

*Linn. S. N. Car.* a Linné Systema naturae, editio duodecima. Holmiae 1766. Tom. I. m. 8.

*Linn. It. vvestg.* Karl von Linne Reisen durch einige schwedische Provinzen II. Theil, welcher die Reise durch Westgothland enthält. mit Kupfern. Halle 1765. gr. 8.

*List. angl.* Martini Lister, Historiae animalium angliae tres tractatus, unus de araneis, alter de cochleis tum terrestribus tum fluuiatilibus, tertius de cochleis marinis. cum figuris. Londini 1678. 4.

*List. Hist. Conch.* Martini Lister, Historiae conchyliorum liber I — IV. Volumina duo cum tabulis aeneis, Londini 1685 — 1688. fol.

*Mart. berlin.* Beschaeft. Konchyliologische Rhapsodien von Friedr. Heinr. Wilh. Martini; im II. Bande der Beschäftigungen der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin, mit gemalten Kupfern. Berlin 1776. gr. 8.

Obendesselben — Zwoschalige Konchylien überhaupt beschrieben; mit ausgemalten Kupfern im III. Bande derselben Beschäftigungen. Berlin 1777. gr. 8.

\* \* \*

Mart.

# EXPLICATIO

*Mart. Konch. Kab.* Neues systematisches Konchylienkabinet von Fried. Heinr. Wilh. Martini, I — IV. Band mit illuminirten Kupfertafeln. Nürnberg 1769 — 1778. 4.

*Müll. Linn. Naturf.* Von Linne vollständiges Natursystem aus dem Lateinischen von Phil. Ludw. Stätius Müller mit Kupfern. VI. Th. 1. Band. Nürnberg 1775. gr. 8.

*Müll. Hist. Verm.* Vermium terrestrium & fluviatilium succincta historia auctore Othon. Friderico Müller, Volumen II. Havniae 1774. 4.

*Müll. Zool. dan.* Zoologiae danicae icones editae ab Othone Friderico Müller. Fasciculus I. Hafn. 1777. fol.

*Murr. Fund. Test.* Fundamenta testaceologiae auctore Adolpho Murray. Upsaliae 1771. 4.

*Mus. Caes. Vindobon.* Museum Caesareum Vindobonense jussu MARIAE THERESIAE Augustissimae edidit Ignatius Eq. a Born latine & germanice cum tabulis pictis. Beschreibung des kais. kön. Naturalienkabinets auf Befehl Ihrer Majestät der Kaiserinn Königin herausgegeben von Ignaz Edlen von Born, mit ausgemalten Kupfertafeln, deutschen und lateinischen Text. Wien 1779. fol.

*Mus.*

*Mus. Olear.* Adami Oleari Museum gottorpiense.  
cum figuris. Schleßv. 1674. 4.

*Mus. Tessin.* Museum Tessinianum opera Comi-  
tis Car. Gust. Tessin. latine & suecice, cum  
tabulis aeneis Hayniae. 1753. fol.

*Mus. Worm.* Museum Wormianum seu Historia  
rerum tam naturalium, quam artificialium &c.  
adornata ab Olao Worm, cum iconibus. Lugd.  
batav. 1655.

*Petiv. Gaz.* Jacobi Petiveri Opera ad historiam  
naturalem spectantia. containing Gazophyla-  
cium naturae & artis &c. with figures. Vo-  
lume I, London 1712 — 1767. fol.

*Petiv. amb.* Aquatiliū animalium amboinae &c.  
icones & nomina with their latin, englisch,  
and native names, and figures by James Pe-  
tiver, London 1713. fol.

*Planc. Conch.* Jani Planci de conchis minus notis.  
Veneriis 1739. 4.

*Reaum. Mem. de Paris.* De différentes manieres  
dont plusieurs especes d'animaux de mer s'atta-  
chent au sable, aux pierres & les uns aux au-  
tres par M. de Reaumur — Decouverte d'une

nouvelle teinture de Pourpre &c. avec figures, par le meme, dans l'histoire de l'academie royale de sciences de l'année 1711. a Amsterdam 1715. 12.

*Regenf. Samml.* Sammlung von Muscheln, Schnecken und andern Schalthieren auf Befehl Seiner königl. Majestät von Dännemark 2c. mit deutschen und lateinischen Text, und illuminirten Kupfertafeln gezeichnet und gestochen, von Franz Michael Regensfuß. Kopenhagen 1758. Regalsfolio. Ou Recüeil de coquillages, de Limaçons, & de crustacés par ordre de Sa Majesté le Roi de Danemark gravés en taille douce, & illuminés de couleurs naturelles par Franc. Mich. Regensfuß, avec le text françois & allemand. Copenhague 1758. fol. royal.

*Rondel. Test.* Guil. Rondeletii universae aquatiliū historiae pars altera, cum figuris, folio transverso. Lugd. 1555. fol.

*Rumph. amb.* Georg Ebeh. Rumph's amboinische Raritätenkammer von den steinschalichten Thieren, mit Kupfertafeln, aus dem Holländischen übersezt von Ph. Ludw. Statius Müller, und mit Zusätzen vermehret von Joh. Hieron. Chemnitz. Wien 1766. fol.

*Schlott.*



*Schlott. Act. helv.* Observatio physica de cochleis quibusdam, nec non de turbinibus nonnullis &c. Philipp. Jac. Schlotterbeccii, cum figuris aeneis in actis helveticis physico medicis. Volum. V. Basil. 1762. 4.

*Schroet. Erd.* Versuch einer systematischen Abhandlung über die Conchylien um Thangelstadt von Joh. Sam. Schröter m. K. Berlin 1771. 8.

*Seb. Thes.* Lucupletissimi rerum naturalium thesauri descriptio (idiomate latino & belgico) cum iconibus Albert. Seba. Tomus III. Amstelod. 1757. fol. Regal.

*Spengl. Berlin. Beschaeft.* Beschreibung einer besonders schönen Korallenmuschel mit einer ausgemalten Abbildung. im II. Bande der Beschäftigungen der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin. Berlin 1775. 8.

*Ebendesselben.* Beschreibung einer seltenen Dünnmuschel mit ausgemalten Figuren, im III. Bande derselben Beschäftigungen. Berlin 1776. 8.

*Swammerd. Bibl. nat.* Jo. Swammerdam Biblia naturae seu historia insectorum in classes redacta, idiomate latino & belgico, cum tabulis aeneis. Lugdun. bat. 1737 — 1738. fol.

EXPLIC. CITAT. ABBREVIATARVM.

*Valent. Abb.* Franz Valentyns Abhandlung von Schneckenmuscheln und Seegewächsen um Am-  
bonia aus dem Holländischen übersezet von  
Phil. Ludw. Stätius Müller mit Kupfern. Wien  
1773. fol.

*Walch. Naturf.* Beschreibung einiger Ronchylien  
von Zmanuel Walch, mit ausgemalten Figuren im  
achten Bande des Naturforschers. Halle 1776. 8.




# PARTES CONCHARVM

## NONNVLLAE EXPLICATAE.

---

### E r f l ä r u n g

einiger Benennungen der Theile an Muschel-  
schalen.



**C**ARDO, Pars ambitus, vbi  
valvae coherent.

**D**as Schloß ist derjenige  
Theil des Umfanges, an wel-  
chem die Klappen aneinander  
passen.

**LATVS** cardinis, **ANTI-**  
**CVM**; huicque oppositum  
**POSTICVM** vocatur.

Die Seite am Schlosse  
heißt die vordere; die entge-  
gengesetzte die hintere Sei-  
te.

**LIGAMENTVM**, *Hymen*  
*Linn.* Membrana cartilaginea  
valvas connectens.

Das Band ist die knorpel-  
lige Haut, welche die Klap-  
pen mit einander verbindet.

**AREA ANTICA.** *Vulva*  
*Linn.* Regio extra liga-  
mentum; quae si introrsum  
declivis sit **SINVS** audit.

Die Vorderfläche ist die  
Gegend außer dem Bande  
und heißt, wenn sie einwärts  
abhängig ist eine Vertiefung.

**LABIA EXTERNA** *Labia Linn.* ea vocantur, quae extra ligamentum locata sunt.

Die äußeren Lefzen heißen diejenigen welche außer dem Bande stehen.

**LABIA INTERNA**, *Nymphae Linn.* sunt labella intra ligamentum, & cum eo devincta.

Die inneren Lefzen heißen diejenigen kleineren Lefzen, welche inner dem Bande stehen, und mit demselben verbunden sind.

**VMBONES**, *Protuberantiae ventricosae valvae cuiusvis extra cardinem.*

Die Backen sind die häufigen Erhöhungen einer jeden Klappe außer dem Schlosse.

**APEX**, *Nates Linn.* *Protuberantiae cuiusvis finis attenuatus.*

Die Spitze ist das Ende in welches sich jede verdünnte Backe verlängert.

**RIMA**, *Hiatus a ligamento tectus.*

Die Spalte ist die Oefnung, welche von dem Bande gedecket wird.

**AREA POSTICA** aut **AREOLA**, *Anus Linn.*

Die Hinterfläche heißt die der Vorderfläche entgegengesetzte Seite.





# GENERA TESTACEORVM.

## METHODO LINNEANA.

### Geschlechter der Schalthiere

nach Linneischer Ordnung.

#### MVLTIVALVIA.

#### Vielflappige.

|            | Pag. |                      | Seite. |
|------------|------|----------------------|--------|
| A. Chiton. | 1.   | A. Die Käfermuschel. | 1.     |
| B. Lepas.  | 2.   | B. Die Meereichel.   | 2.     |
| C. Pholas. | 7.   | C. Die Steindattel.  | 7.     |

#### BIVALVIA.

#### Zweiflappige.

|               |     |                       |     |
|---------------|-----|-----------------------|-----|
| D. Mya.       | 10. | D. Die Klafmuschel.   | 10. |
| E. Solen.     | 13. | E. Die Messerscheide. | 13. |
| F. Tellina.   | 17. | F. Die Tellmuschel.   | 17. |
| G. Cardium.   | 27. | G. Die Herzmuschel.   | 27. |
| H. Mastra.    | 39. | H. Die Korbmuschel.   | 39. |
| I. Donax.     | 40. | I. Die Stumpfmuschel. | 40. |
| K. Venus.     | 43. | K. Die Venusmuschel.  | 43. |
| L. Spondylus. | 63. | L. Die Klappmuschel.  | 63. |
| M. Chama.     | 65. | M. Die Gienmuschel.   | 65. |
| N. Arca.      | 72. | N. Die Arche.         | 72. |

O. Ostrea.

|             | Pag. | Seite.                      |
|-------------|------|-----------------------------|
| O. Ostrea.  | 80.  | O. Die Auster. 80.          |
| P. Anomia.  | 101. | P. Die Bastardmuschel. 101. |
| Q. Mytilus. | 106. | Q. Die Miesmuschel. 106.    |
| R. Pinna.   | 115. | R. Die Steckmuschel. 115.   |

## VNIVALVIA.

|               |      | Einschalige.                   |
|---------------|------|--------------------------------|
| A. Argonauta. | 119. | A. Der Segler. 119.            |
| B. Nautilus.  | 121. | B. Die Kammermuschel. 121.     |
| C. Conus.     | 123. | C. Die Zuthenschnecke. 123.    |
| D. Cypraea.   | 155. | D. Die Porzellanschnecke. 155. |
| E. Bulla.     | 183. | E. Die Blasenschnecke. 183.    |
| F. Voluta.    | 195. | F. Die Faltenschnecke. 195.    |
| G. Buccinum.  | 228. | G. Das Kinkhorn. 228.          |
| H. Strombus.  | 264. | H. Die Flügelschnecke. 264.    |
| I. Murex.     | 282. | I. Die Stachelschnecke. 282.   |
| K. Trochus.   | 330. | K. Die Kräuselschnecke. 330.   |
| L. Turbo.     | 345. | L. Die Mondschnecke. 345.      |
| M. Cornu. *   | 371. | M. Die Hornschnecke *. 371.    |
| N. Helix.     | 372. | N. Die Schnirkelschnecke. 372. |
| O. Nerita.    | 410. | O. Die Schwimmschnecke. 410.   |
| P. Haliotis.  | 427. | P. Die Ohrenschnecke. 427.     |
| Q. Patella.   | 430. | Q. Die Napfschnecke. 430.      |
| R. Dentalium. | 448. | R. Die Zahnschnecke. 448.      |
| S. Serpula.   | 452. | S. Die Röhrenschnecke. 452.    |

TE-

\* Vide tab. huius indicis.

\* Sieh die Tafel dieses Verzeichnisses.

TESTACEA.

---

Schaltiere.





# TESTACEA.

## Schalthiere.

Ordo primus. Erste Ordnung.

Multivalvia.

Vielflappige.

A. Chiton.

A. Die Käfermuschel.

*Linn. Syst. Nat. Gen. 300.*

Valvae plures longitudinaliter digestae, dorso incumbentes.

Die Schale besteht aus mehreren, nach der Länge des Rückens hintereinander liegenden Klappen.

A. 1. Chiton squamosus.

A. 1. Die schuppige Käfermuschel.

*Linn. S. N. Sp. 5.*

Testa octovalvi carinata; valvulis oblique angulatis, striatis, corio squamoso.

Die acht Klappen der Schale sind oben keilförmig, der Quere nach eckig, und gestreift, mit einer schuppigen Haut.

*Petiv. Gaz. t. I. f. 3. ?*

*Mus. Caes. Vindobon.*

A. 2. Chiton cinereus.

A. 2. Die kleine Käfermuschel.

A

*Linn.*



*Linn. S. N. Sp. 8.*

Testa oëstoualui obtuse carinata, planiuscula, cinerea. Die etwas flache aschengraue Schale hat einen stumpfen Rücken, und bestehet aus acht Klappen

*Infidens ostreae eduli L.*

Sie sitzt auf einer gemeinen Muschel.

*Adans. Seneg. Pl. 2. f. II.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

B. Lepas.

B. Die Meereichel.

*Linn. Syst. Nat. Gen. 301.*

Valvae plures inaequales, per paria opposita affixae. Die feststehende Schale bestehet aus mehreren ungleichen, einander paarweise entgegen gesetzten Klappen.

B. 1. Lepes Balanus.

B. 1. Die große Meereichel.

*Linn. S. N. Sp. 10.*

*Belg. Zee puitten. Gall. Gland de Mer Tulipe. Dav. Angl. The common english Barnacle. Ellis.*

Testa conica truncata, valvis longitudinaliter sulcatis; areis interjectis transverse striatis. Die kegelförmige oben abgestuzte Schale hat nach der Längsrichtung gefurchte Klappen, und in die Quere gestreifte Zwischenflächen.

Oper-



Operculum valvulis quatuor,  
binis conniuentibus, unguicula-  
tis, altioribus; binis transuerse  
fulcatis, minoribus.

Der Deckel besteht aus vier klei-  
nen Klappen, deren zwei, die un-  
ter einem Winkel zusammenstoßen,  
klauenförmig und höher; zwei über  
in die Quere gefurchet, und klei-  
ner sind.

Insidet Murici despecto.

Sie sitzt auf einer nordischen  
Spindel fest.

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 286.*

*Ellis. Transact. angl. 1758. t. 34. f. 17.*

*Baster. Subs. t. 12. f. 7 — 10.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

B. 2. *Lepas balanoides.* B. 2. Die Seepocke.

*Linn. S. N. Sp. 11.*

*Belg. Zee pocke. Gall. Glands de mer rayés. Dav. Angl. The nar-  
row mouth'd grey Balanus Hill.*

Testa conica truncata, va- Die kegelförmige abgestutzt;  
luis glabris, operculis obtusis. Schale hat glatte Klappen,  
und stumpfe Deckeln.

*List. angl. t. 5. f. 41.*

—— *Hist. Conch. l. 3. f. 287.*

*Klein. Meth. Ostrac. t. 12. f. 94. 95.*

*Argenv. Conch. Pl. 26. f. D.*

*Hill. Hist. of. Anim. 11. Pl.*

*Da Cost, Elem. Pl. 1. f. 12.*



B. 3. *Lepas Tintinabulum*. B. 3. Die Meertulpe.  
lum.

*Linn. S. N. Sp. 12.*

*Belg.* Tulpen; *Rumph. Angl.* The great wide mouth'd Balanus.  
*Hill. Gall.* Gland de mer Turban. *Day.*

Testa conica, gibba, arcis  
transuerse striatis.

Die kegelförmige ungleiche  
Schale hat in die Quere ge-  
streifte Zwischenflächen.

α coloris rosei.

α rosenfarbig.

*Mus. Caes. Vindobon.*

β ex rosea violacea.

β rosenfarbig und violet;

*Lift. Hist. Conch. L. 3. f. 285.*

*Rumph. amb. t. 41. f. A.*

*Gualt. Test. t. 106. f. H.*

*Ellis. Trans. angl. 1758. 34. Pl. 8. f.*

*Argenv. Conch. Pl. 26. f. A.*

*Hill. Hist. of. Anim. Pl. 11.*

*Knor. Vergn. II. 2. t. 6. f.*

— — — *V. 30. t. 1. f.*

B. 4. *Lepas Diadema*. B. 4. Die Wallfischpode.

*Linn. S. N. Sp. 13.*

*Belg.* Zeeschelling. *Rumph. Angl.* The wrinkled. Star-Cake. *Petiv.*  
*Gall.* Pou de Baleine. *Day.*

Testa





Testa subcylindrica, valvis Die etwas walzenförmige  
longitudinaliter sulcatis, costis Schale hat nach der Länge ge-  
decussatim, areis transuerse furchte Klappen, mit kreuz-  
striatis, weise durchschnittenen Ribben,  
und in die Quere gestreiften  
Zwischenflächen.

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 288.*

*Petiv. amb. t. I. f. II.*

*Rumph. amb. Rarit. K. t. 14. f. H.*

*Gualt. Test. t. 160. f. Q.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

B. 5. *Lepas testudina-*  
*ria.*

B. 5. Die Schildkrö-  
tenpode.

*Linn. S. N. Sp. 14.*

*Belg. Schildpa de Luis. Rumph. Angl. The tortoise-wart Barnacle.*  
*Ellis. Ital. Ballano, Gin.*

Testa suborbiculari plano-  
convexa laevi, intus lamellis  
ferrulatis; areis excavatis,  
transuerse sulcatis.

Die scheibenrunde, unten fla-  
che, oben erhabene und platte  
Schale hat inwendig gezähnel-  
te Blättchen, und ausgehöhlt-  
te nach der Quere gefurchte  
Zwischenflächen.

Operculum valvis sex, binis ho-  
rizontalibus, quatuor erectis, ob-  
tusis, conniuentibus, rima supera  
longitudinali.

Der Deckel bestehet aus sechs  
kleinen Klappen, davon zwei wag-  
recht, vier stumpfe aber, aufge-  
richtet gegen einander geneigt stehen,  
und in die Höhe eine nach der Län-  
ge laufende Spalte bilden.



*Bonan. Mus. Kirch. cl. I. f. 36.*

*Petiv. Gaz. t. 9. f. 9.*

*Rumph. amb. 40. t. K.*

*Planc. Conch. t. 5. f. 2. 3.*

*Gualt. Test. t. 106. f. M. N. O.*

*Klein. Meth. Ostr. t. 12. f. 99.*

*Ellis. Trans. angl. 1758. t. 34. f. 12. 13.*

*Ginan. adr. II. t. 30. f. 175.*

*Knor. Vergn. III. 30. t. 3. 4. f.*

B. 6. *Lepas anatifera.*

B. 6. Die Aentenbrut.

*Linn. S. N. Sp. 18.*

*Holl. Eende Schulpe. Angl. The goose Schell. Hill. Gall. Conque anatifere Dav. Ital. Conca anatifera. Gin.*

Testa compressa quinqueval-  
ui laeui, affixa intestino mem-  
branaceo.

Die zusammengedrückte  
Schale bestehet aus fünf glat-  
ten Klappen, und sitzt Mittels  
einer darmförmigen Haut fest.

*Aldrov. Test. l. 3. p. 544.*

*Bonan. Recr. cl. 2. f. 2.*

*Mus. Wormian. p. 256.*

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 282.*

*Planc. Conch. t. 5. f. 4.*

*Gualt. Test. t. 106. f. A. D.*

*Seb. Thes. III. t. 16. n. I. a, b.*

*Hill.*



Hill. Hist. of. Anim. Pl. II.

Ginan. adr. II. t. 30. f. 182.

Knor. Vergn. II. 30. | t. 4. 5. f.

Müll. Linn. Nat. Syst. VI. I. B. 10. t. 8. f.

Da Cost. Elem. I. Pl. f. II.

## C. Pholas.

## C. Die Steindattel.

Linn. Syst. Nat. Gen. 302.

Testa bivalvis, lata, urrinq. diuarcata, accessio- Die Schale ist zweyflap-  
nis prope cardinem; car- pig, breit, an beiden En-  
dinis margo replicatus, den klappend, mit einigen  
ligamento nexus interme- Nebenschalen am Schlosse.  
dio. Das Schloß hat einen  
auswärts übergeschlagenen  
Saum, und ein darzwi-  
schen liegendes Band.

### C. I. Pholas Dactylus,

### C. I. Der Steinbohrer.

Linn. S. N. Sp. 20.

Belg. Steen - Scheede. Angl. The oblong withe Pidak Hill. Gall. Dail. Ital. Ballano. Ginan.

Testa lata, ventricosa, pli- Die bäuchige Schale ist nach  
cis transuersis, striisque lon- ihrer gestreckten Breite gefal-  
A 4 gitu-



gitudinalibus decussata, postea, der Höhe nach kreuzweise gestreift, hinterwärts nezförmig.  
 ce reticulata.

*Aldrov. Test. l. 3. p. 455. f. 3.*

*Rond. Test. t. 23. f. 2.*

*Bonan. Recr. cl. 2. f. 25. 26. 27.*

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 276.*

*Petiv. Gaz. t. 79. f. 10, 11.*

*Gualt. Test. t. 105. f. A. B. C. D.*

*Seb. Thes. III. t. 16. f. 6.*

*Hill. Hist. of. Anim. II. Pl.*

*Ginan. adr. II. t. 31. f. 184.*

*Murray. Fund. Test. t. 2. f. 3.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

C. 2, *Pholas costatus.*

C. 2. Der geribbte  
Steinbohrer.

*Linn. S. N. Sp. 21.*

*Belg. Eeviger Gapper. Angl. The deeply furrowed Pholas. Hill. Gall, La grande Pholade de l'Amerique. Favart.*

Testa lata ventricosa transverse striata, costis longitudinalibus, extimis acutis remotioribus.

Die Schale ist in die Breite gestreckt, bäuchig, in die Quere gestreift, mit nach der Länge laufenden Ribben, deren äußerste scharf sind, und etwas von einander entfernt stehen.

*List.*





*List. Hist. Conch. l. 3. f. 277.*

*Gualt. Test. t. 105. f. G.*

*Knor. Vergn. II. 25. t. 4. f.*



*C. Schütz.*



# Ordo secundus. Zweyte Ordnung.

Bivaluia.

Zweyflappige.

D. Mya.

D. Die Klafmuschel.

Linn. S. N. Gen. 303.

Testa bivalvis, altera extremitate hians; cardinis dente primario crasso, Die zweyflappige Schale klappt an einem Ende; der Hauptzahn des Schlosses ist dick.

D. I. Mya Glycimeris.

D. I. Die bäuchige Klafmuschel.

Testa umbonata, extremitatibus oblique truncatis, dente antico crassissimo, longitudine ligamenti, Die bäuchige Schale hat schiefe stumpfe Seitenende, und einen sehr dicken Vorderzahn nach der Länge des Bandes.

Aldrov. Test. l. 9. p. 473. 474.

List. Hist. Conch. l. 3. f. 258.

Gualt. Test. t. 9. f. A.

Mus. Caes. Vindobon.

Testa subovata umbonata laevis, pone apices utrinque coarctata, extremitates oblique truncatae hiantes; Dens anticus fere longitudine ligamenti, crassissimus, pollicus minor, subjacens apicibus Die etwas eiförmige bäuchige und glatte Schale ist an den Spitzen beiderseits ausgehöhlet. Die Seitenende sind schief und stumpf. Der Vorderzahn ist sehr dick, fast von der Länge des Bandes: der

in-



incurvatis, retro quos series crenularum extenditur. Color pallido griseus.

Hinterzahn ist kleiner, liegt unter den einwärts gekrümmten Spitzen, hinter welchen eine Reihe kleiner Kerbe ausläuft; ihre Farbe ist lichtgrau.

D. 2. *Mya pictorum*. D. 2. Die Malermuschel.

*Linn. S. N. Sp.* 28.

*Gall.* Moule des peintres. *Angl.* The Pearl River Muscle. *Da Cost.* *Ital.* Concha de Pittori. *Ginan.*

Testa lata, convexa, cardinis dente primario crenulato, laterali elongato, quovis in altera testa duplicato.

Die Schale ist breit, ensörmig, und bündig, der Hauptzahn ist gekerbt, der Nebenzahn verlängert, und an einer Klappe doppelt.

*Bonap. Recr. cl.* 2. f. 40. 41.

*List. angl. t.* 2. f. 30.

— *Hist. Conch. l.* 2. f. 146. 147.

*Swammerd. Bibl. nat. t.* 10. f. 6, 7.

*Gualt. Test. t.* 7. f. E.

*Berlin. Magaz. IV.* 12. t. 66. 67. f.

*Ginan. adriat. II.* t. 4. f. 17.

*Da Cost. Elem.* 7. Pl. 12. f.

D. 3. *Mya margaritifera*. D. 3. Die Flußperlmuschel.

*Linn.*



*Linn. S. N. Sp. 29.*

*Gall. Telline fluviatile. Dav.*

*Testa lata, ovata, planiuscula, infra coarctata, dente primario crasso, lateralibus elongatis.* Die Schale ist breit, eiförmig, etwas platt gedrückt, am Unterrande eingebogen; der Hauptzahn dick und die Nebenzähne verlängert.

*List. Hist. Conch. l. 2. f. 149.*

*Klein. Meth. Ostr. t. 10. f. 47.*

*Berlin. Magaz. IV. 12. t. 65. f.*

*Knor. Vergn. IV. 25. t. 2. f.*

**D. 4. Mya Vulsella.**

**D. 4. Der Bartkneifer.**

*Linn. S. N. Sp. 31.*

*Be'g. Baardnyper. Rumph.*

*Testa elongata linguiformi, cardine terminali concavo rotundato.* Die Schale ist der Höhe nach zungenförmig verlängert; das Schloß bildet am Unterende eine rundliche Höhlung.

*Rumph. amb. n. 46. t. 1.*

*Gualt. Test. t. 90. f. H.*

*Mus. Tessin. t. 6. f. 3.*

*Knor. Verg. V. 2. t. 1. — 3. f.*





Habitu a concentricis diversissima, utrisque linnæalis proprior.

Dem Ansehen nach unterscheidet sich diese von allen ihren Nebenarten, sie gehöret auch mit mehr Recht unter das Geschlecht der Auster des Linne.

## E. Solen.

## E. Die Messerscheide.

Linn. Syst. Nat. Gen. 104.

Testa bivalvis, aequalis, latissima, utrinque hians. Cardinis dens unus reflexus aut duplex, non insertus testae oppositae.

Die Schale bestehet aus zween gleichen Klappen, welche in die Breite sehr verlängert sind, und an beiden Enden klaffen. Der Zahn des Schloßes ist zurückgebogen, oft doppelt, und heißet nicht in die entgegenesetzte Klappe ein.

## E. 1. Solen. Vaginâ.

## E. 1. Die Rinne.

Linn. S. N. Sp. 33.

Belg. Orgelpypen. Rumph. Angl. The thick Razor-Shell. Hill. Gall. Manche de Couteau. Dav. Ital. Languetti.



Testa lineari, recta; cardine prope extremitatem alteram truncatam unidentato.

Die Schale ist gleichbreit und gerade, nahe am abgestumpften Ende mit einem einfachen Zahne versehen.

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 256.*

*Rumph. amb. 45. f. M.*

*Gualt. Test. t. 95. f. D.*

*Argenv. Conch. Pl. 24. f. K.*

*Hill. Hist. of. Anim. Pl. 10.*

*Klein. Meth. Ostrac. t. 11. f. 65.*

*Knor. Vergn. I. 28. t. 3. f.*

*Gipan. adriat. II. t. 27. f. 170.*

*Da Cost. Elem. Pl. 7. f. 8.*

E. 2. Solen Siliqua.

E. 2. Das Messerheft.

*Linn. S. N. Sp. 34.*

*Belg. Messerhecht. Angl. The little Strait Razor. Hill. Gall. Manche decouteau lemelle. Venet. Cappa lunga. Bonon. Pesche canella.*

Testa lineari recta, extremitatibus rotundatis, cardine pone alteram bidentato.

Die Schale ist gleich breit, und gerade, die Ende sind rundlich, an einem davon ist das Schloß mit zweien Zähnen versehen.



*Bell. aq. t. 414. f. 2.*

*List. angl. t. 5. f. 37.*

— *Hist. Conch. l. 2. 255. f.*

*Bonan. Recr. cl. 2. f. 57.*

*Planc. Conch. t. 3. f. 6.*

*Gualt. Test. t. 95. f. C.*

*Argenv. Conch. Pl. 24. f. M.*

*Hill. Hist. of. Anim. Pl. 10.*

*Müll. Linn. N. S. VI. 1. B 11. t. 1. f.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

E. 3. Solen Ensis.

E. 3. Die Erbsenschote.

*Linn. S. N. Sp. 35.*

*Belg. Ben Idoublet. Angl. The blucifch crooked Razor. Hill. Gall. Manche de couteau courbée. Dav.*

Testa lineari subarcuata, Die Schale ist gleichbreit,  
extremitate utraque rotunda- etwas gekrümmt, an beiden  
ta, cardine pone alteram bi- Enden rundlich, an deren ei-  
dentato. nem das Schloß mit zweien  
Zähnen versehen ist.

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 257. A.*

*Argenv. Conch. Pl. 24. f. L.*

*Hill. Hist. of. Anim. 10. Pl.*

*Knor. Vergn. VI. 7. t. 1. f.*

E. 4.

E. 4. *Solen radiatus*.E. 4. Die blaue Strahl-  
scheide.*Linn. S. N. Sp. 38.*

*Belg.* De violetblauwe. Zonnestraal. *Rumph. Gall.* Le soleil le vant.  
*Dav. Angl.* The violet - purple papyraceus *Solen.* *Hill.*

*Testa lineari recta, subdia-* Die Schale ist gleich breit,  
*phana, laevi, costa cardinis* gerad, halb durchsichtig und  
*obliqua, depressa.* glatt. Die Rippe inner dem  
 Angel lauft schif, und ist platt  
 gedrückt.

*Violacea radiis quatuor albis.*Violettfärbig mit vier weissen  
Strahlen.*List. Hist. Conch. l. 3. f. 266.**Rumph. amb. 45. t. E.**Petiv. amb. t. 21. f. 16.**Gualt. Test. t. 91. f. E.**Argenv. Conch. Pl. 22. f. P.**Knor. Delic. I. t. B. III. f. 9.*— *Vergn. I. 6. t. 5. f.*E. 5. *Solen frigidatus*.E. 5. Die rosenrothe  
Strahlischeide.*Linn. S. N. Sp. 39.*

*Belg.* Roose - roodt Zonnestraal. *Angl.* The thick red *Solen.* *Hill.*  
*Gall.* Lanterne rouge rayonnée de blanc.

Testa





Testa lineari recta, crassa, Die Schale ist gleichbreit,  
 conuexa, lineis oblique in- gerad und dick, die Klappen  
 sculptis, costa cardinis nulla. gewölbt, mit schiefen ausge-  
 schnittenen Linien, ohne Aus-  
 gelrippe.

Rosea, radiis duobus albis.

Rosenfarbig mit zween weißen  
 Strahlen.

Bonan. Recr. el. 2. f. 77.

List. Hist. Conch. l. 3. f. 260.

Gualt. Test. t. 91. f. C.

Adans. Seneg. Pl. 19. f. 2.

Knor. Vergn. VI. 5. t. 4. f.

## F. Tellina.

## F. Die Tellmuschel.

Linn. Syst. Nat. Gen. 305.

Testa bivalvis antice Die zweiflappige Schale  
 hinc inflexa; dentes late- le ist am Borderrande un-  
 rales alterius testae plani. gebogen. Die Seitenzäh-  
 ne sind an einer Klappe  
 platt.

F. I. Quatze crassiusculae.

F. I. Mit eysdemigen dicken  
 Schalen.

F. I. 1. Tellina lingua felis. F. I. 1. Die Katzenzunge.

Linn. S. N. Sp. 45.

B

Belg.



Belg. Katetonge Rumph. Gall. Le Chagrin Dav.

Testa lata subouata, scabra Die Schale ist breit, eckrund,  
squamis fornicatis quincuncia- und mit hohlen ins Gevierte  
libus. stehenden Schüppchen besetzt.

Rumph. amb. t. 45. f. G.

Gualt. Test. t. 76. f. B.

Klein Meth. Ostr. t. II. f. 62.

Knor. Vergn. II. 2. t. I. f.

F. I. 2. Tellina rugosa. F. I. 2. Die runzelichte  
Tellmuschel.

Testa subouata lata, ru- Die etwas eckförmige breite  
gis membranaceis transuersis, Schale hat häutige nach der  
rima hiantes. Quere laufende Runzeln, und  
eine klaffende Spalte.

Mus. Caes. Vindobon.

Testa lata, subouata, scabra, Die Schale ist breit, etwas eckför-  
membranis elevatis rugosis trans- mig, und durch querlaufende erhabene  
uersis. Rima hians. Labra promi- dünne Runzeln raub. Die Spalte klaf-  
nula. Apices acuti contingui, an- fet. Die Lippen ragen hervor. Die  
trorsum recurui. Ligamentum in- Spitzen sind dünn, vorwärts gekrümm-  
uestiens labra, alterumque retro met, und berühren einander. Die Lip-  
apices tenuius. Color totius testae pen werden von dem Bande bedec-  
albus. ket, ein anderes dünneres Band  
läßt sich hinter den Spitzen wahr-  
nehmen. Die Farbe der ganzen  
Schale ist weiß.

F. I. 3. Tellina virgata. F. I. 3. Der gestreifte  
Sonnenstrahl.

Linn.



*Linn. S. N. Sp. 46.*

*Belg. Zonnenstraal. Rumph. Angl. Rayed Tellin. Petiv. Gall. Telline radiée Dav.*

*Testa lata subouata, antice angulata, lineis eleuatis transversis, radiis rubentibus.* Die breite etwas enfförmige, und vorne eckige Schale hat erhabene Querlinien, und rothe Strahlen.

*Rumph. amb. t. 45. f. H.*

*Petiv. amboin. t. 17. f. 19.*

*Argenv. Conch. Pl. 25. f. A.*

*Knor. Vergn. II. 21. t. 4. f.*

—— ——— *IV. 25. t. 1. f.*

*F. I. 4. Tellina angulata.*

*F. I. 4. Die eckige Tellin-  
muschel.*

*Linn. S. N. Sp. 47. ?*

*Testa lata subouata, striis transversis recuruatis, antice oblique angulata, labris prominulis, dentibus lateralibus nullis.* Die breite etwas enflange, vorne schief eckige Schale hat erhabene zurückgekrümmte Querstreife, hervorragende Rippen, und keine Seitenzähne.

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 241.*

*Mus. Caes. Vindobon.*



F. I. 5. Tellina Gari.

F. I. 5. Die Bacassan-  
muschel.*Linn. S. N. Sp.* 48.*Belg.* Bacassandoublet *Rumph. Gall.* Telline bariolée de violet, & de blanc. *Argenv.*

Testa lata subaequilatera, Die breite beinahe gleichseits-  
striis transversis deflexis, la- tige Schale hat zurückgeboge-  
bris prominentibus, dentibus ne Querstreife, und keine Sei-  
lateralibus nullis. tenzähne.

Violacea, radiis pallidis.

Violetblau mit blassen Strah-  
len.*List. Hist. Conch. l. 3. f. 261.**Rumph. amb. t. 45. f. D.**Argenv. Conch. Pl. 22. f. F.**Mus. Caes. Vindobon.*F. I. 6. Tellina ano-  
mala.F. I. 6. Die unächte  
Tellinmuschel.

Testa subovata lata, ven- Die etwas eysförmige breite  
tricrosa, longitudinaliter rugo- bänchige Schale ist der Länge  
sa, striis transversis utrinque nach runzelicht, und durch  
scabra, limbo antico intus Querstreife an den Seitenenden  
violaceo. rauh, inwendig am Border-  
rande violet,

*List.*





List. Hist. Conch. l. 3. f. 273.

Knor. Vergn. II. 20. t. 1. f.

— — — VI. II. t. 2. f.

Testa subovata lata ventricosa, antice utrinque obsolete carinata. Sulci longitudinales undulati, striis transversis prope extremitates exasperati. Apices umbonati incurvati. Ligamentum crassius ante apices, & retro hos tenuius alterum. Dentes primarii duo, alter bifidus, laterales nulli. Limbus internus praesertim anticus violaceus.

Die Schale ist etwas eiförmig, breit und bähig, an beiden Seiten vorne mit einer stumpfen Ecke versehen. Nach der Länge herab laufen runzelichte Furchen, welche von Querstreifen durchkreuzet den Seitenenden ein rauhes Ansehen geben. Die Spizen sind aufgeblasen und einwärts gekrümmt. Vor den Spizen ist das gewöhnliche dicke Band, und hinter denselben noch ein anderes dünneres. Das Schloß hat zween Hauptzähne, deren einer zweispaltig ist. Die Seitenzähne fehlen. Der innere Rand ist besonders vorne violett.

a pallide lutescens intus lutea.

a bläßgelb, innen gelb.

ß alba apicibus violaceis, intus tota violacea.

ß weiß, mit violeten Spizen und gleichfarbiger Höhlung.

γ violacea, alboradiata intus violacea, albaque.

γ Violett mit weißen Strahlen, mit blau und weiß gefleckter innerer Höhlung.

δ alba, cavitate & apibus miniatis.

δ weiß mit meningfarbiger Höhlung und Spizen.

F. II. Ovatae compressae.

F. II. Mit eyrunden platgedrückten Schalen.

F. II. 1. Tellina albida.

F. II. 1. Die blaßrothe Tellmuschel.

Linn. S. N. Sp. 50.?



Testa lata ovali laevi, sub- Die breite ensförmige Schae-  
tus transverse inaequaliter sul- le ist glatt, unten mit unglei-  
cata, labiis prominentibus, den- chen Quersfurchen, die Lippen  
tibus lateralibus obsoletis. ragen hervor, die Seitenzäh-  
ne sind undeutlich.

*Knor. Vergn. IV. 3. t. 4. f.*

— — — *V. 9. t. 3. f.*

**F. II. 2. Tellina punicea.** **F. II. 2. Die dunkelro-**  
**the Tellmuschel.**

Testa lata ovali, sub aequi- Die breite ensförmige glän-  
latera, glabra, striis trans- zende Schale ist beinahe gleich-  
uersis approximatis. seigig, und mit gedrängt an-  
einander stehenden Querstreifen  
überzogen.

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa ovalis lata complanata, la- Die Schale ist breit, lensförmig,  
teribus utrinque subaequalibus. Api- und platgedrückt, an den Seiten  
ces tenuis breues. Labia testa. beinahe gleichlang. Die Spitzen  
Dentes primarii, & laterales se- sind kurz und fein. Die Lippen  
cundum characterem generis. Co- bedeckt. Die Hauptzähne haben wie  
lor pallide incarnatus, prope api- die Seitenzähne das gemeine Merk-  
ces & in superficie interna puni- mal dieses Geschlechtes. Die Far-  
ceus. be ist an der Oberfläche fleischroth,  
an den Spitzen und inwendig dun-  
kelroth.

**F. II. 3. Tellina pla-** **F. II. 3. Die scharf-**  
**nata.** **randige Tellmuschel.**

*Linn. S. N. Sp. 52.*

Testa



Testa lata, ouata, compressa, transuersim substriata, ist platt gedrückt, der Quere nach sehr fein gestreift, an den Rändern scharf.

*Gualt. Test. t. 89. f. G.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

F. II. 4. Tellina radiata. F. II. 4. Der glatte Sonnenstrahl.

*Linn. S. N. Sp. 54.*

*Belg* Een roode witstraalige Tellmossel. *Angl.* The tulip tellina  
*Da Cost. Gall.* Telline rayée de couleur de chair. *Favart. Roman.* Capparozole. *Venet.* Capparole.

Testa lata substriata glabra, Die breite Schale ist fein-  
labris hiantibus, areola lan- gestreift und glänzend, mit her-  
seolata. vorstehenden Rippen und einer  
lanzettförmigen Hinterfläche.

Cavitas citrina. Apices rosei. Die Farbe der inneren Fläche ist  
Fasciae saepe radiantes roseae. schwefelgelb, die Spitzen und öfters  
auch die Strahlen sind rosenroth.

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 240.*

*Gualt. Test. t. 89. f. F.*

*Regensf. Samml. I. 3. t. 28. f. 8. t. 22. f.*

*Knor. Vergn. II. 19. t. 1. f.*

— — — IV. 2. t. 24. f.

— — — Del. nat. I. t. B. III. f. 8.

*Da Cost. Elem. Pl. 6. Fig. 11.*

B 4

F. II. 5.



F. II. 5. *Tellina ro-*  
*strata.*

F. II. 5. Das Schind-  
then.

*Linn. S. N. Sp. 55.*

*Belg. Banket Hammetjes. Angl. Wedge Muscle. Petiv. Gall. Pince de Chirurgien Dav.*

Testa ovata antice angulato  
rostrata, transuersim subtilis-  
sime striata.

Die eysförmige Schale hat  
vorne einen verlängerten eck-  
igen Schnabel, und ist der  
Quere nach sehr fein gestreift.

α Flava, rostro breuiore.

α gelb, mit kürzerem Schnabel.

*Mus. Cæs. Vindobon.*

β incarnata, rostro longiore.

β fleischfarbig, mit längerem Schna-  
bel.

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 225.*

*Petiv. amboin. t. 17. f. 20.*

*Gualt. Test. t. 88. f. F.*

*Argenv. Conch. Pl. 22. f. O.*

*Knor. Vergn. II. 2. t. 5. f.*

F. II. 6. *Tellina inae-*  
*quivalvis.*

F. II. 6. Die Bastard-  
telline.

*Linn. S. N. Sp. 56.*

*Belg. Platzydige Telline.*

Testa





Testa lata ouata rostrata, Die breite eynlange schnabel-  
 valua altera plana, dentibus förmige Schale hat eine ganz  
 lateralibus nullis. flache Klappe, und keine Sei-  
 tenzähne.

Spengl. berlin. Beschaeft. III. 7. t. 25 — 28. f.

F. II. 7. Tellina incar- F. II. 7. Der kleine  
 nata. Sonnenstrahl.

Linn. S. N. Sp. 58.

Belg. Rood Juffertje.

Testa lata ouata rostrata Die Schale ist breit eynlang  
 complanata, apicibus acutis, und schnabelförmig, mit sei-  
 pallido radiata. nen Spizen und weißen Strah-  
 len.

List. angl. app. t. 1. f. 3.

Gualt. Test. 1. 88. f. M.

Mrs. Caes. Vindobon.

F. III. Suborbiculatae.

F. III. Mit ründlichen Schalen.

F. III. 1. Tellina Re- F. III. 1. Die Sand-  
 mies. telline.

Linn. S. N. Sp. 62.

Belg. Remies, Rumph.



Testa subrotunda, crassa, Die rundliche dicke Schale  
transuersim tenuissime striata, ist nach der Quere sehr fein  
rima patula. gestreift, und mit einer klaf-  
fenden Spalte versehen.

*List. Hist. Conch. l. 2. f. 102.*

*Rumph. amb. t. 43. f. 7.*

*Mus Caes. Vindobon.*

F. III. 2. Tellina sco-  
binata.

F. III. 2. Die schuppige  
Tellmuschel.

*Linn. S. N. Sp. 64.*

*Gall. La guillochée: Dav.*

Testa orbiculari, scabra, Die scheibenrunde Schale  
squamis lunatis in quincun- ist wegen der mondfarbigen ins-  
cem digestis. Gevierte stehenden Schüppchen  
rauh anzufühlen.

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 143.*

*Gualt. Test. t. 76. f. E.*

*Knor. Vergn. VI. 37. t. 3. f.*

F. III. 3. Tellina car-  
naria.

F. III. 3. Die Fleisch-  
linse.

*Linn. S. N. Sp. 66.*



Testa orbiculata, striis obliquis, deorsum reflexis, undulatis.

Die scheibenförmige Schale hat eingeschnittene schiefe und rückwärts herabgebogene wellenförmige Streifen.

*List. Hist. Conch. l. 2. f. 176.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

F. III. 4. Tellina balthica.

F. III. 4. Die dreyeckige Tellmuschel.

*Linn. S. N. Sp. 68.*

Testa triangulo rotundata, laevi, transuersim subtilissime striata, incarnata.

Die Schale ist dreyeckig, rundlicht, glänzend, in die Quere sehr fein gestreift, von fleischrother Farbe.

*Mus. Caes. Vindobon.*

G. Cardium.

G. Die Herzmuschel.

*Linn. Syst. Nat. Gen. 306.*

Testa bivaluis, aequaluis, dentibus cardinis mediis binis, alternatis; lateralibus remotis insertis.

Die Schale bestehet aus zween gleichen Klappen; an dem Schlosse stehen zween wechselweise Mittelzähne, mit entfernten einbeißenden Seitenzähnen.

G. I.



G. 1. Cardium costatum. G. 1. Die geribbte Herzmuschel.

Linn. S. N. Sp. 73.

Belg. Geribte Venus doublet. Rumph. Angl. The exotick Heart Cockle. Hill. Gall. Conque exotique. Dav.

Testa lata ventricosa, costis longitudinalibus, carinatis, Die breite und bäuchige Schale ist nach der Länge herab mit keilförmigen hohlen Rippen besetzt.

Column. purp. t. 27.

List. Hist. Conch. l. 3. f. 164.

Rumph. amb. 48. t. 6. f.

Gualt. Test. t. 72. f. D.

Argenv. Conch. Pl. 23. f. A.

Adans. Seneg. Pl. 18. f. 2.

Hill. Hist. of. Anim. Pl. 10.

Knor. Vergn. I. 28. t. 2. f.

G. 2. Cardium Cardissa. G. 2. Das Menschenherz.

Linn. S. N. Sp. 74.

Belg. Venus hart. Angl. human Heart-Cockle. Hill. Gall. Coeur de Venus. Dav.

Testa cordata, valvis compressis carinatis, apicibus inflexis contiguis. Die herzförmige Schale hat flachgedrückte keilförmige Klappen, mit eingerollten nahe aneinander stehenden Spizen.

Ca-





α Carina valvularum integra.

α mit ganzen Riele.

β Carina valvularum crenata.

β mit gekerbtem Riele.

*Bonan. Recr. el. 2. f. 49.*

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 155. 156.*

*Rumph. amb. t. 42. f. E.*

*Gualt. Test. t. 84. f. E. C. D.*

*Argenv. Conch. Pl. 23. f. 7.*

*Klein. Meth. Ostr. t. 10. f. 39.*

*Hill. Hist. of. Anim. Pl. 10.*

*Knor. Vergn. I. 18. t. 2. f.*

—— ——— VI. II. t. 1. f.

*Mus. Caes. Vindobon.*

G. 3. Cardium retu-  
sum.

G. 3. Das Nabelherz.

*Linn. S. N. Sp. 75.*

Testa cordata oblique cari-  
nata, sinu politico lunari in-  
truso.

Die herzförmige und schief  
gekielte Schale hat hinter den  
Spizen eine tief eingedrückte  
mondförmige Höhlung.

Valva solitaria.

Eine einzelne Klappe.

*Mus. Caes. Vindobon.*

G. 4. Cardium imbri-  
catum.

G. 4. Das schuppige  
Herz.

Testa



Testa cordato trilatera, inter sulcos longitudinales tenuis transuersae & dense squamulosa.

Die herzförmige dreysseitige Schale ist nach der Länge mit feinen Furchen, und dazwischen in die Quere mit dicht aneinander liegenden Schüppchen besetzt.

*Litt. Hist. Conch. l. 3. f. 152.*

*Gualt. Test. t. 83. f. E.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa cordata trilateralis. Valvae utrinque angulatae longitudinaliter sulcatae, sulcis tenuibus, inter quos squamulae, undique arcuatae, & dense imbricatae locantur. Marg. crenatus, anticus ferratus. Color testae niveus, squamularum citrinus.

Die Schale ist herzförmig und dreysseitig. Die Klappen sind an beiden Seiten eckig erhoben, nach der Länge herab laufen linienförmige Furchen, zwischen welchen sich allenthalben bogenförmige gedrängt aneinanderstehende Schüppchen befinden. Der Rand ist gekerbt, vorne sägeförmig. Die Schale ist von schneeweiß, die Schüppchen von zitronengelber Farbe.

G. 5. Cardium Hemiacardium.

G. 5. Das dreysseitige Herz.

*Linn. S. N. Sp. 76.*

*Holl. Driezydig Venus hart. Gall. Coeur triangulaire Dard. Engl. Strawberry Heart Cockle. Petiv.*

Testa cordata subtrilatera, valuis angulatis, sulcis tenuibus excavato punctatis, utrinque transuersae tuberculatis.

Die Klappen der herzförmigen beinahe dreiseitigen Schale sind eckig, mit tief punktirten dünnen Furchen, und in die Quere stehenden Körnern besetzt.

*Rumph.*



*Rumph. amb. t. 44. f. H.*

*Petiv. amb. t. 17. f. 4.*

*Gualt. Test. t. 83. f. C.*

*Knor. Vergn. VI. 3. t. 2. f.*

G. 6. Cardium medium.

G. 6. Das Mittelherz.

*Linn. S. N. Sp. 77.*

Testa subcordata, valuis, longitudinaliter sulcatis, angulatis, laevibus.

Die Klappen der einigermaßen herzförmigen Schale sind nach der Länge gefurchet, eckig und glatt.

*Knor. Vergn. V. 20. t. 5. f.*

G. 7. Cardium aculeatum.

G. 7. Das Nagelherz.

*Linn. S. N. Sp. 78.*

*Belg. gedornte Nageldoublet. Angl. Coeur de boeuf. epineux Dav. Angl. The Oxheart Cockle. Hill.*

Testa subcordata costis spinoso ciliatis,

Die einigermaßen herzförmige Schale ist mit spizen Dornern besetzt.

α Spinis fornicatis compressis.

α Mit hohlen zusammengebrückten Dornern.

β Spinis fornicatis crassis inflexis.

β Mit hohlen dicken umgebogenen, oder nagelförmigen Dornern.

*Aldrov.*



*Aldrov. Test. l. 3. p. 452.*

*Bonan. Recr. cl. 2. f. 96. 97.*

*Gualt. Test. t. 72. f. A.*

*Argenv. Concb. Pl. 23. f. B.*

*Hill. Hist. of. Anim. Pl. 10.*

*Knor. Vergn. VI. 3. t. 1. f.*

G. 8. *Cardium tuberculatum.*

G. 8. Das knotige Herz.

*Linn. S. N. Sp. 81.*

*Angl. Grain Cockle Petiv.*

Testa subcordata sulcata, costis obtusis transverse striatis, extus nodosis.

Die etwas herzförmige gefurchte Schale hat stumpfe, in die Quere gestreifte, und außen knotige Rippen.

*Rumph. amb. t. 48. f. 11.*

*Petiv. amb. t. 17. f. 7.*

*Knor. Vergn. V. 30. t. 2. f.*

G. 9. *Cardium Icofardia.*

G. 9. Das Ziegelberg.

*Linn. S. N. Sp. 82.*

*Beig. Nagelschulp. Rumph. Gall. Coeur de boeuf rouille Argenv. Ang. The rough. Oxheartshell. Hill.*

Testa





Testa subcordata sulcata,  
squamis fornicatis erectis.

Die einigermaßen herzför-  
mige Schale ist gefurchet, und  
mit aufgerichteten hohlen  
Schuppen besetzt.

*Bonan. Recr. cl. 2. f. 95.*

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 160.*

*Rumph. amb. t. 48. f. 9.*

*Petiv. Gaz. t. 152. f. 7.*

*Argenv. Conch. Pl. 23. f. M.*

*Hill. Hist. of. Anim. 10. Pl.*

*Regenf. Samml. I. 5. t. 56. f.*

G. 10. Cardium Une-  
do.

G. 10 Die rothe Erde-  
beere.

*Linn. S. N. Sp. 84.*

*Belg. Aardbesic. Rumph. Angl. The red Straw - Berry. Gall. La  
Fraise rouge. Argenv.*

Testa subcordata trilatera  
obtuse angulata, multisulca-  
ta, lunulis transversis colora-  
tis sparsis.

Die etwas herzförmige und  
dreyseitige Schale hat an ih-  
ren Klappen stumpfe Ecken,  
viele Furchen, und zerstreute  
gefärbte Querschüppchen.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 375.*

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 151.*



*Rumph. amb. t. 44. f. F.*

*Gualt. Test. t. 83. f. A. B.*

*Regenf. Samml. I. 3. t. 25. f.*

*Knor. Vergn. IV. 14. t. 3. f.*

— — VI. 3. t. 4. f.

*Da Cost. Elem. 7. Pl. 8. f.*

**G. II. Cardium magnum.**

**G. II. Die große Herzmuschel.**

*Linn. S. N. Sp. 86. ?*

Testa subcordata ven-  
triosa fulcata, costis angula-  
tis posticis transverse, striatis.

Die etwas herzförmige,  
bäuchige und gefurchte Schale  
hat eckige Rippen, deren hin-  
tere mit nach der Quere lau-  
fenden Streifen besetzt sind.

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 158.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

**G. 12. Cardium leu-  
costomum.**

**G. 12. Das gelbmün-  
dige Herz.**

Testa subovata fulcata, co-  
stis anticis muricatis, posticis  
transversim crenatis, areo-  
la lanceolata.

Die etwas eiförmige gefurch-  
te Schale ist an den Vorder-  
ribben rauh, an den Hinterrib-  
ben nach der Quere gekerbt,  
ihre Hinterfläche ist eiförmig.

*List.*



List. Hist. Conch. l. 3. f. 168.

Mus. Caes. Vindobon.

Testa subouata crassa, fulcis 33. longitudinalibus. Costae compressae angulatae, posticae muricatae, anticae squamulis dense imbricatae; sulci intermedii transversum striati. Margo crenatus, antice serratus. Arcola plana lanceolata, qua ab adfinibus differt. Limbus aurantii coloris.

Die Schale ist dick, einigermaßen herzförmig, mit 33 nach der Länge laufenden Rurhen besetzt. Die Ribben sind etwas flach gedrückt und eckig; die hinten stehenden sind rauh, die vordern mit ziegelförmigen Schüppchen dicht besetzt. Die Zwischenfurchen sind in die Quere gestreift. Der Rand ist gekerbt, vorne sägeförmig. Die Hinterfläche ist platt und lanzetförmig, wodurch sie sich besonders unterscheidet. Der innere Rand ist pomeranzenfarbig.

G. 13. Cardium flauum.

G. 13. Das gelbe Herz.

Linn. S. N. Sp. 87.

Testa subouata, longitudinaliter obsolete fulcata, margine crenato.

Die fast herzförmige Schale ist nach der Länge schwach gefurchet, und am Rande gekerbet.

Mus. Caes. Vindobon.

G. 14. Cardium lae-  
uigatum.

G. 14. Das glatte Herz.

Linn. S. N. Sp. 88.



Testa subouata glabra, Die etwas eysförmige Scha-  
striis longitudinalibus, obso- le ist glatt, und mit matten  
letis. Streifen nach der Länge besetzt.

*Gualt. Test. t. 82. f. A.*

*Knor. Vergn. II. 20. t. 4. f.*

— — V. 10. t. 7. f.

G. 15. Cardium aeoli-  
cum.

G. 15. Die Ost- und  
Westmuschel.

*Belg. Oost en West-Doublet.*

Testa subouata sulcis tenui- Die etwas eysförmige Scha-  
bus longitudinalibus, plicis- le ist mit dünnen Furchen nach  
que transuersis obtusis postice. der Länge, und rückwärts mit  
stumpfen Quersalten besetzt.

*Bonan. Recr. cl. 2. f. 91.*

*Knor. Vergn. V. 26. t. 2. f. 27. t. 3. f.*

Testa subouata umbonata glabra, Die Schale ist einigermaßen ey-  
longitudinaliter sulcata, postice pli- sförmig, häuchig und glatt, nach  
cis transuersis, complanatis, sur- der Länge gefurcht, und hinten  
sum imbricatis. Margo anticus cir- mit platt gedrückten aufwärts  
ca ligamentum laevis. Labia retro ziegelförmig gestellten Falten verse-  
apices crassa prominentia. Color hen. Der Vorderrand ist neben  
albo roseoque varius. dem Bande glatt. Hinter den Spi-  
zen ragen diese Lippen hervor. Die  
Farbe ist weiß mit Rosenroth ver-  
mischt.



G. 16. *Cardium latum*.

G. 16. Die breite Herzmuschel.

Belg. Blausäbtig Hart. Gall. Coeur enflé.

Testa lata ovali, longitudinaliter sulcato striata, utrinque scabra, margine antico ferrato,

Die breite eysförmige Schale ist nach der Länge gefurchet und gestreift, an beiden Enden rauh, und am Vorderrande sägeförmig.

Knor. Vergn. VI. 7. t. 6. f. ?

Mus. Caes. Vindobon.

Testa lata ovalis, longitudinaliter sulcato striata. Costae anticae posticaeque acutae, muricatae, mediae obtusae laeves, interstitiis duplicato striatis. Umbones tenuissimi striati, antrorsum subcarinati; Apices incurvi laeves. Cardo, dentibus generis characterem exhibens; Limbus striatus. Margo anticus acute ferratus.

Die breite eysförmige Schale ist nach der Länge mit Furchen und Streifen besetzt. Die vordern und hintern Rippen sind scharf und rauh, die mittleren stumpf und glatt, mit zweifach gestreiften Zwischenräumen. Die Wölbungen sind sehr zart gestreift und vorwärts einigermassen kiefelförmig. Die Spitzen sind einwärts gekrümmt und glatt. Das Schloß hat an den Zähnen das dem Geschlechte eigen thümliche Kennzeichen. Der innere Rand ist gestreift. Der Vorderrand hat scharfe sägeförmige Ausschnitte.

\* alba, luteo maculata.

a weiß und gelb gefleckt.

ß alba, rubro maculata.

ß weiß mit rothen Flecken

G. 17. *Cardium pectinatum*,

G. 17. Die kammtähnliche Herzmuschel.

C 3

Testa



Testa rotundata complanata,  
costis triangularis, lateribus mu-  
ricatis.

Die rundliche etwas flach  
gedrückte Muschel hat dreiecki-  
ge Ribben, und rauhe Seiten.

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa suborbiculata profunde sul-  
cata. Costae triangulae transuersim cre-  
natae; extimae squamulis fornicatis  
scabrae. Margo crenatus, anticus fer-  
ratus. Superficies externa albida,  
maculis dispersis fuscis. Cavitas  
longitudinaliter sulcata, alba.

Die Schale ist einigermaßen schei-  
benrund, tiefgefurchet. Die Ribben  
sind dreieckig in die Quere geker-  
bet, die äußern davon sind durch  
hohle Schüppchen raub. Der Rand  
ist gekerbet, vorne sägeförmig. Die  
äußere Fläche ist weiß mit zerstreuten  
braunen Flecken. Die innere  
Höhlung aber ganz weiß und nach  
der Länge gefurchet.

G. 18. *Cardium rusticum.*

G. 18. Das Hahnen-  
herz.

*Linn. S. N. Sp. 91.*

*Belg. Bonte Kokhaan. Gall. Le Coq bigarré.*

Testa subcordata, umbona-  
ta, antiquata, sulcis remotis  
longitudinalibus, transuersim ru-  
gosis.

Die etwas herzförmige häus-  
liche Schale hat Ansätze, und  
nach der Länge laufende von  
einander entfernte Furchen, die  
in die Quere runzelicht sind.

α alba, fasciis ferrugineis.

α weiß, mit rothbraunen Bändern.

β niuea.

β schneeweiß.

*Aldrov. Test. l. 3. p. 480.*

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 166.*

*Rumph.*



*Rumph. amb. t. 44. f. K.*

*Gualt. Test. t. 71. f. M.*

*Regenf. Samml. I. 8. t. 24. f. 12. t. 77. 78. f.*

*Knor. Vergn. VI. 8. t. 3. f.*

H. Mastra.

H. Die Korbmuschel.

*Linn. Syst. Nat. Gen. 307.*

Testa bivalvis aequi- Die Schale hat zwei  
ualvis. Cardinis dente gleiche Klappen. Der ge-  
medio complicato, cum faltene Mittelzahn des  
adjecta foueola; dentibus Schlosses hat neben sich  
lateralibus remotis inser- ein Grübchen, und etwas  
tis. entfernte einbeißende Sei-  
tenzähne.

H. I. Mastra Spreng-  
leri.

H. I. Die sprengleri-  
sche Korbmuschel.

*Linn. L. N. Sp. 94.*

Testa cordato triangulari, Die herzförmige dreiseitige  
laevi, area complanata, utrin- glatte Schale hat eine flache  
que carinata, an beiden Seiten keilförmige  
Vorderfläche.



Gualt. Test. t. 85. f. F.

Knor. Vergn. VI. 34. t. 1. f.

H. 2. *Mastra glauca.*

H. 2. Die fahle Korb-  
muschel.

Testa subovata umbonata,  
apicibus laevissimis, lateribus  
undique striatis.

Die eysförmige bäuchige  
Schale ist an den Spizen glatt,  
und an den Seiten allenthal-  
ben gestreift.

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa subovata tenuis, convexa,  
apicibus glabris. Area, areolaeque  
indistincta, tenuiter striata. Val-  
vae solitariae dens primarius  
complicatus, laterales elongati.  
Color sordide albidus.

Die eysförmige Schale ist dünn,  
bäuchig, gegen die Spizen zuglatt.  
Die Vorder- und Hinterflächen sind  
undeutlich und gestreift. Der Haupt-  
zahn der einzelnen Klappe ist zusam-  
men gelegt, die Seitenzähne lang  
auslaufend. Die Farbe schmutzig  
weiß.

Valva solitaria.

Eine einzelne Klappe.

I. *Donax.*

I. Die Stumpfmuschel.

Linn. Syst. Nat. Gen. 308.

Testa biualvis, margi-  
ne antico obrufissimo. Den-  
tibus insertis, marginali po-  
stice solitario, subremoto.

Die zweyflappige Scha-  
le hat einen stumpfen  
Vorderrand. Die Zähne  
am Schlosse sind einbeiß-  
end, der hintere Seiten-  
zahn stehet einzeln, und  
entfernet.

I. I.



I. 1. *Donax Scorum*,

I. 1. Das Dreyeck.

*Linn. S. N. Sp.* 102.*Gall. Came coupée. Dav. Angl. The violet and white Chama Hill.*

*Testa cordato triangulari;* Die Schale ist herzförmig,  
*area explanata laevi,* utrin- dreiseitig, die Vorderfläche  
*que carinata, striis transuer-* ausgebreitet und glatt, und an  
*sis alternatim excurrentibus.* beiden Seiten kielförmig. Die  
 Querstriche verlängern sich  
 wechselweise.

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 220.**Argenv. Conch. Pl. 21. f. L.**Petiv. Gaz. t. 19. f. 11.**Hill. Hist of. Animal. Pl. 9.**Müll. Linn. Naturfyst. VI. I. B. 11. t. 5. f.**Mus. Caes. Vindobon.*I. 2. *Donax pubescens.*I. 2. Die stachelichte  
Stumpfmuschel.*Linn. S. N. Sp.* 103.

*Testa cordato triangulari* Die herzförmige dreiseitige  
*decussatim striata,* area ex- Schale ist kreuzweise gestreift,  
*planata utrinque carinata, spi-* die Vorderfläche platt, und  
*nisque canaliculatis armata.* beiderseits kielförmig, mit rin-  
 nenförmigen Stacheln besetzt.



*Mus. Caes. Vindobon.*

I. 3. Donax Trunculus.    I. 3. Das Stümpchen.

*Linn. S. N. Sp. 105.*

*Belg. Stombje. Gall. La Tronquée.*

Testa cuneiformi, antice    Die keilförmige Schale ist  
oblique truncata, laeui, lim-    vorne schief abgestumpft, und  
bo crenato.    glatt, am inneren Rande ge-  
kerbet.

*List. angl. t. 5. f. 35.*

*Bonan. Recr. cl. 2. f. 47.*

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 217.*

*Gualt. Test. t. 88. f. 0.*

*Adans. Seneg. Pl. 10. f. 1.*

*Klein Meth. Ostr. t. 11. f. 61.*

*Knor. Vergn. I. 7. t. 7. f.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

I. 4. Donax denticulata.    I. 4. Die Säge.

*Linn. S. N. Sp. 107.*

*Belg. Zaagertjes. Gall. La Scie. Dav.*

Testa cuneiformi, striata,    Die keilförmige Schale ist  
antice obtusissima, transuerse gestreiset, vorne gerad abge-  
ru-



rugosa , limbo denticulato.

stumpft und nach der Quere  
runzelicht , am inneren Rande  
gezähnt.

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 219.*

*Petiv. Gaz. t. 18. f. 4.*

*Knor. Vergn. II. 23. t. 3, 4, 5. f.*

I. 5. *Donex cuneata.*

I. 5. Der Keil.

*Linn. S. N. Sp. 108.*

Testa cuneiformi compres-  
sa laevi , antice rugosa , mar-  
gine integerrimo.

Die keilsförmige Muschel ist  
platt gedrückt und glatt , am  
Rande ganz.

*Knor. Vergn. V. 7. t. 3. f.*

K. Venus.

K. Die Venusmuschel.

*Linn. Syst. Nat. Gen. 309.*

Testa bivalvis , aequi-  
ualvis , sinu longitudina-  
li ; areola vestigiata. Car-  
dinis dentes tres appro-  
ximati , laterales diuergen-  
tes.

Die Schale , welche  
aus zween gleichen Klapp-  
pen bestehet , hat vorne  
eine längliche Vertiefung,  
und eine eingedrückte Hin-  
terfläche. Am Schlosse  
stehen drey Zähne nahe  
beisammen , deren äussere  
auswärts laufen.

K I.



K. I. Testae subcordatae, antice muricatae.

K. I. Herzförmige vorne rauhe Schalen.

K. I. 1. Venus Dione. K. I. 1. Die ächte Venusmuschel.

Linn. S. N. Sp. 112.

Belg. De rechte Venus-Schulp mit Hair, Rumph. Angl. The Maiden Muscle Pet. Gall. Conque de Venus a pointes Dav.

Testa subcordata, cingulis eleuatis membranaceis, area utrinque spinosa. Die etwas herzförmige Schale hat erhabene blätterige Ränder und eine mit Stacheln besetzte Vorderfläche.

Bonanz. Mus. Kirch. el. 2. f. 121.

List. Hist. Conch. l. 3. f. 140.

Rumph. amb. t. 48. f. 4.

Petiv. Gaz. t. 31. f. 9.

Olear. Mus. p. 29. f. 4.

Gualt. Test. t. 76. f. D.

Argenv. Conch. Pl. 21. f. 7.

Hill. Hist. of. Anim. Pl. 9.

Knor. Vergn. I. 4. t. 3, 4. f.

—— Delic. nat. I. t. B. V. f. 9.

Murray. Fund. Test. t. 2. f. 16. 17.

Müll. Linn. Naturysst. VI. 1. B. 11. t. 6. f.

K I. 2.





K. I. 2. Venus Paphia.

K. I. 2. Das alte Weib.

*Linn. S. N. Sp. 113.*

*Belg.* Gerimpelde, oude Wyfs - schulp. *Rumph.* *Angl.* The old Woman. *Hill. Gall.* La Vieille ridée, *Argenv.*

Testa subcordata, cingulis  
crassis, antice attenuatis.

Die etwas herzformige Schale  
hat dicke Ringe, die sich  
vorne verdünnen.

*Bonan. Recr. cl. 2. f. 75.**Rumph. amb. t. 48. f. 5.**Gualt. Test. t. 85. f. A.**Argenv. Conch. Pl, 21. f. B.**Regenf. Samml. I. 7. t. 11. f.**Hill. Hist. of. Anim. Pl. 9.**Knor. Vergn. II. 28. t. 2. f.*

— — — VI. 6. t. 2. f.

K. I. 3. Venus Marica.

K. I. 3. Die Bastard-  
venus.*Linn. S. N. Sp. 114.**Belg.* De gestreepte Kousdoublet.

Testa rotundata, decussata,  
striis elevatis, antice lamel-  
losis, areola carinata circum-  
scripta,

Die rundliche Schale ist  
mit erhabenen, vorne blätterig-  
gen Streifen durchkreuzt, die  
Hinterfläche ist rielsförmig er-  
haben, und eingefaßt.

*Mus.*



*Mus Caes. Vindobon.*

K. I. 4. Venus Dysera. K. I. 4. Die Dünnschale.

*Linn. S. N. Sp. 114.*

*Gall. La Levantine Argenv.*

Testa subcordata, cingulis Die etwas herzförmige Schale  
remotis membranaceis, lim- le hat dünne erhabene in die  
bo crenulato. Quere laufende Ribben, und  
am inneren Rande kleine Ker-  
ben.

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 114. 115.*

*Petiv. Gaz. t. 24. f. 5.*

*Argenv. Conch. Pl. 21. f. K.*

*Klein. Meth. Ostrac. t. 10. f. 48, 49.*

*Knor. Vergn. II. 28. t. 3. f.*

K. II. Testae subcordatae, antice  
inermes.

K. II. Herzförmige vorne unbe-  
wafnete Schalen.

K. II. 1. Venus verru-  
cosa.

K. Die warzige Venus-  
muschel.

*Linn. S. N. Sp. 116,*

*Gall. Cloniffe. Dav.*

Te-



Testa subcordata umbonata, cingulis arctis membranaceis verrucosis, limbo crenulato.

Die etwas herzförmige häuchige Schale mit blätterigen warzenförmigen Rippen und gedrängt stehenden Keifen besetzt, am inneren Rande mit feinen Kerben versehen.

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 122.*

*Gualt. Test. t. 75. f. H.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

K. II. 2. Venus circinata.

K. II. 2. Die gereifte Venus.

Testa subcordata, membranis transuersis arctis, areola impressa ouata, limbo integro.

Die fast herzförmige Schale ist mit häutigen Querringen umgeben, mit einer eysförmigen eingedrückten Hinterfläche und ganzem Rande.

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa figura V. Dionis subcordata, umbonata transuersis eleuatis imbricatis arctis. Sinus utrinque labiatus, labiis subaequalibus. Areola cordata impressa. Limbus integerimus. Color pallide roseus, radiis obsoletis albis.

Die herzförmige häuchige Schale hat die Gestalt der achten Venusmuschel. Sie ist der Quere nach mit erhabenen ziegelförmiggestellten, hintereinander stehenden Ringen umgürtet. Die vordere Vertiefung ist beiderseits mit einem beinahe gleichgroßen Lefzen versehen. Die hintere Fläche ist eysförmig und vertieft. Der innere Rand ohne allen Einschnitt. Der Farbe nach ist sie blaßroth, mit matten weißen Strahlen.

K. II. 3.



K. II. 3. Venus can-  
cellata.

K. II. 3. Die breite  
blättrige Venusmuschel.

*Linn. S. N. Sp. 118.*

Testa subcordata complana- Die herzförmige plattgedrück-  
ta, cingulis erectis membra- te Schale ist mit erhabenen  
naceis remotis, antice elon- blättrigen Keifen umgeben,  
gatis, patentibus; limbo cre- die sich vorne verlängern, und  
nulato. ausbreiten; der innere Rand  
ist fein gekerbet.

*Gualt. Test. t. 88. f. D.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

K. II. 4. Venus sinua-  
ta.

K. II. 4. Die ausge-  
kehlte Venusmuschel.

Testa subcordata, transuer- Die fast herzförmige Scha-  
se inaequaliter sulcata, sinu le hat ungleiche Quersfurchen,  
antico lato declivi, limbo eine vertiefte Vorderfläche, und  
crenulato. einen innwendig feingekerbten  
Rand.

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 131.*

*Knor. Vergn. V. 14. t. 2. 5. f.*

Testa subcordata complanata gla- Die Schale ist einlgermaßen herz-  
bra, sulcis transversis inaequalibus. förmig, plattgedrückt und glatt,  
Sinus anticus latus iatrorium de- der Quere nach mit ungleichen  
clivus. Arcola plana. Limbus cre- Furchen versehen. Die vordere  
nula





nulatus. Color pallidus fuscone-  
lofus, radiis obsoletis pallidis.

Vertiefung ist breit und einwärts  
abwärts. Die Hinterfläche ist eben.  
Der innere Rand fein gekerbt. Die  
Farbe braun nebelicht, mit matten  
bleichen Strahlen.

K. II. 5. Venus flexuo-  
sa.

K. II. 5. Die schiefe  
Venusmuschel.

Linn. S. N. Sp. 121.

Testa cordato triangula,  
transuersim sulcata, area si-  
nuosa utrinque carinata, areo-  
la plana.

Die herzförmige dreieckige  
in die Quere gefurchte Scha-  
le hat eine ebene Hinterfläche,  
und eine vertiefte Vorder-  
fläche, die beiderseits mit ei-  
ner erhabenen Ecke begränzt  
ist.

Rumph. amb. t. 43. f. O.

Mus. Caes. Vindobon.

K. II. 6. Venus Buc-  
cardium.

K. II. 6. Das unäch-  
te Ochsenherz.

Testa cordata solida laeui,  
areolae excauatae vestigio in-  
distincto, limbo integro.

Die herzförmige dichte glatte  
Muschel ist an der Hinterfläche  
angeshöhlet ohne deutlichen  
Eindruck, und am inneren Rande  
glatt.



*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa cordata solida, laevis, transversim tenuissime striata, undique umbonata; retro apices recurvatos contiguous concava, vestigio nec intruso, nec circumscripto. Dentes generi proprii, crassi.

Die dicke herzförmige glatte nach der Quere sehr fein gestreifte Schale ist allenthalben bündig; hinter den rückwärts gebogenen Spitzen, die einander berühren, ausgehöhlet, ohne deutlichen Eindruck oder Einsassung. Die Zähne sind dick und nach der Art des Geschlechtes beschaffen.

K. II. 7. Venus Chione.

K. II. 7. Die Spielmuschel.

*Linn. S. N. Sp. 125.*

*Belg. De Speel doublet. Gall. Came marquée de verges.*

Testa cordata glabra, transversim obsolete sulcata, pallide radiata, areola plana.

Die herzförmige glatte nach der Quere schwach gefurchte Schale ist mit blassen Strahlen und einer kleinen platten Hinterfläche versehen.

*Guolt. Test. t. 86. f. A.*

*Argenv. Conch. Pl. 21. f. C.*

*Regenf. Samml. I. 4. t. 1. f.*

*Knor. Vergn. II. 4. t. 1. f.*

K. II. 8. Venus maculata.

K. II. 8. Die Algamuschel.

*Linn. S. N. Sp. 126.*

*Belg.*



Belg. D'achaat - gaaper. Angl. The Agate chama. Hill. Gall. Came truitée. Dav.

Testa cordata glabra, maculis dispersis inaequalibus; areolata carinata, circumscripta.

Die herzförmige glatte Schale hat zerstreute ungleiche Streifen, und eine keilförmig eingeklappte Hinterfläche.

List. Hist. Conch. l. 3. f. 106.

Gualt. Test. t. 76. f. 7.

Argenv. Conch. Pl. 21. f. H.

Adans. Seneg. Pl. 17. f. 15.

Regenf. Samml. I. 8. t. 16. f.

Hill. Hist. of. Anim. Pl. 9.

Knor. Vergn. II. 28. t. 5. f.

— — V. 20. t. 4. f.

K. II. 9. Venus Meretricis.

K. II. 9. Die Braunschnecke.

Linn. S. N. Sp. 127.

Gall. La Gourgandine. Argenv. Angl. The Smooth egg, truncated Chama Hill.

Testa cordata laevi, antice complanata fusca, labris hian- tibus,

Die herzförmige glatte Schale ist vorne plattgedrückt braun und mit weit hervorragenden Lippen versehen.



*Argenv. Conch. Pl. 21. f. F.*

*Hill. Hist. of. Anim. Pl. 9.*

*Knor. Vergn. VI. 6. t. 3. f.*

K. II. 10. Venus mac- K. II. 10. Die Korbvenus.  
troides.

*Belg. Gestraalde Kwaker. Gall. Quacre rayonné.*

Testa triangula umbonata Die dreneckige bäuchige glat-  
laevi, utrinque complanata; te Schale ist beiderseits platt-  
cardinis dente laterali remoto. gedrückt, und am Schlosse  
mit einem entfernten Seiten-  
zähne versehen.

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 85.*

*Knor. Vergn. V. 15. t. 2. f.*

— — VI. 10. t. 5. f

Testa, similis Maatrae stultorum  
L; triangula subaequilatera laevis,  
transuersim tenuissime striata, utrin-  
que prope apices complanata, pla-  
nis subaequalibus. Apices incurui.  
Dentes primores tres, structura con-  
generum, quibus accedit postice  
lateralis remotus. Color testae  
extus fulvus, radiis albis; apicem  
violaceus.

Die Schale, welche die Gestalt des  
Strahlkorbes hat, ist dreneckig, beina-  
he gleichseitig und glatt, in die Quere  
fein gestreift, an den Seiten nächst den  
Spitzen mit zweien fast gleich groß-  
en platten Flächen versehen. Die  
Spitzen krümen sich einwärts. Drei  
Mittelzähne sind am Schlosse von  
gewöhnlicher Gestalt, außer wel-  
chen hinten ein entfernter Seiten-  
zahn steht. Die Schale ist außen  
braunroth mit weißen Strahlen,  
an den Spitzen violet.





K. II. 11. Venus pa-  
radoxa.

K. II. 11. Die blau-  
streifige Aftervenus.

Testa triangula , solida,  
utrinque complanata, labris  
prominentibus.

Die dreysseitige dichte beider-  
seits zusammengedrückte Scha-  
le ist mit hervorragenden Lip-  
pen versehen.

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa ponderosa, triangula, laevis,  
utrinque complanata. Labra por-  
recta crassa. Dentes cardinis pri-  
marii duo, lateralis utrinque unus  
brevis solidus. Color testae albus,  
lateribus radiisque latis violaceis.

Die Schale ist schwer, dreyeckig,  
und glatt, an beiden Seiten platt  
gedrückt. Die dicken Lippen ragen  
hervor. Am Schlosse sind zween  
Mittelzähne, und beiderseits ein  
dicker Nebenzahn. Die Schale ist  
weiß, mit breiten Strahlen, die  
Seitenflächen von violetter Farbe.

K. II. 12. Venus ca-  
strensis.

K. II. 12. Die Lager-  
muschel.

*Linn. S. N. Sp. 129.*

*Belg. De griekische A Doublet. Rumph. Angl. The zizzag Chama.*  
*Hill. Gall. L'écriture greque.*

Testa triangulo rotundata,  
umbonata glabra, characteri-  
bus angulatis picta, areola  
circumscripta plana.

Die rundliche, dreyeckige,  
bäuchige glatte Schale ist mit  
eckigen Zierathen bemalt, und  
mit einer platten eingefassten  
Hinterfläche versehen.



*Bonan. Recr. el. 3. f. 376.*

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 98.*

*Rumph. amb. t. 42. f. K.*

*Gualt. Test. t. 82. f. H.*

*Regenf. Samml. I. 1. t. 3. f. 4. t. 41. f.*

*Hill. Hist. of. Anim. Pl. 9.*

*Knor. Vergn. I. 21. t. 4. f.*

—— ——— II. 20. t. 2. f.

—— ——— VI. 6. t. 5, 6. f.

K. II. 13. Venus Me-  
röe.

K. II. 13. Die weitspi-  
gige Venusmuschel.

*Linn. S. N. Sp. 131.*

*Gall. Le Zig - zog. Dav.*

Testa lata subovata com-  
pressa, transversim striata; sinu  
antico dilatato hiantē; limbo  
crenato.

Die breite etwas eiförmige  
flachgedrückte in die Quere ge-  
streifte Schale ist vorne mit ei-  
ner erweiterten klaffenden Ver-  
tiefung versehen, und inwendig  
am Rande mit Kerben besetzt.

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 321.*

*Argenv. Supp. Pl. 3. f. B.*

*Knor. Vergn. VI. 7. t. 2, 4. f.*

K. II. 14. Venus un-  
dulata.

K. II. 14. Die wellen-  
förmige Venus.

Testa



Testa ovali lata, striis transuersis undulatis, planis utrinque lanceolatis.

Die eysförmige breite Schale ist der Quere nach mit rundlichen Streifen, und beiderseits mit lanzetförmigen Flächen versehen.

*Petiv. Gaz. t. 105. f. 2.*

*Knor. Vergn. II. 28. t. 4. f.*

Testa ovalis complanata lata, glabra, striis transuersis undulatis, ad apices utrinque longitudinaliter complanata, planis laeuib. lanceolatis. Dentes cardinis duo bifidi, tertius indiuisus. Color albus, venis angulatis fuluis, planorum venis transuersis undulatis, rubro purpureis.

Die Schale ist plattgedrückt, breit, glatt, mit wellenförmigen nach der Quere laufenden Streifen umgeben, nächst den Spizen beiderseits nach der Länge flach gedrückt, mit glatten lanzetförmigen Flächen. Am Schlosse sind zweien zweispaltige Zähne, der dritte äußere ist spizig und ungetheilt. Die Farbe ist weiß mit braungethen winkelförmigen Adern, über die Quere der Flächen laufen wellenförmige purpurrothe Adern.

K. II. 15. Venus Calipya.

K. II. 15. Die weißbackige Venus.

Testa ouata latiuscula, transuerse inaequaliter striata, lineis picta angulatis, arcuata ovali.

Die eysförmige breite Schale ist der Quere nach mit ungleichen Streifen besetzt, mit winkelförmigen Linien bemalt, und an der Hinterfläche eysförmig.

*Bonan. Recr. cl. 2. f. 62.*

*Mus. Caes. Vindobon.*



Testa ovata latiuscula parumper  
 complanata, striis transuersis inae-  
 qualibus, picta lineis angulatis,  
 fursum convergentibus, fuscis.  
 Areola qualis, impressa, striata.  
 Color lutescens; characteribus an-  
 gulatis fuscis, Umbones niui.

Die herzförmige etwas breite  
 Schale ist einigermaßen flachgedrückt,  
 und in die Quere ungleichförmig  
 gestreift. Die winkelförmigen Li-  
 nien, mit welchen sie bemalt ist,  
 laufen aufwärts zusammen. Die  
 Hinterfläche ist eysförmig, einge-  
 drückt und gestreift. Die Schale  
 gelblich, die Winkelzüge braun,  
 und die Wölbung schneeweiß.

K. II. 16. Venus de-  
 florata.

K. II. 16. Die Blaue  
 Lippe.

Linn. S. N. Sp. 132. ?

Testa lata umbonata ovali,  
 longitudinaliter rugosa, lim-  
 bo antico intus violaceo.

Die breite bäuchige eysförmige  
 Schale ist der Länge nach  
 runzelig, und am innwendigen  
 Vorderrande violett.

*Mus. Caes. Vindobon.*

K. II. 17. Venus fim-  
 briata,

K. II. 17. Die Wafel-  
 muschel.

Linn. S. N. Sp. 133.

Belg. Wafelyser Rumph. Angl. Honeycomb Cockle. Pet. Gall. La  
 Tricotée, Dav.

Testa lata, umbonata ovali,  
 longitudinaliter striata, trans-  
 uerse sulcata, margine cre-  
 nato.

Die breite bäuchige eysförmige  
 Schale ist nach der Längs-  
 richtung gestreift, in die Quere ge-  
 furchet, und am Rande mit  
 Kerben versehen.

Lisz.





*List. Hist. Conch. l. 3. f. 172.*

*Rumph. amb. t. 43. f. F.*

*Petiv. amb. t. 18. f. 8.*

*Gualt. Test. t. 75. f. C.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

K. II. 18. Venus reti-  
culata.

K. II. 18. Die Gitter-  
henus.

*Linn. S. N. Sp. 124.*

*Gall. Le Rézeau blanc. Dav.*

Testa subcordata umbona-  
ta longitudinaliter striata, cin-  
gulis eleuatis membranaceis,  
limbo crenulato.

Die fast herzförmige häuch-  
ge Schale ist der Länge nach  
gestreift, mit erhabenen häu-  
tigen Keifen, und am inneren  
Rande mit Kerben versehen.

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 273.*

*Gualt. Test. t. 77. f. A.*

*Adans. Seneg. Pl. 16. f. 3.*

*Argenv. Conch. Pl. 23. f. F.*

*Klein. Meth. Ostr. 1. 10. f. 12.*

*Knor. Vergn. VI. 10. t. 1. f.*

K. III. Orbiculatae antice inermes. k. III. Scheibenförmige, vorne  
unbewafnete Venusmuscheln.



K. III. 1. Venus tige-  
rina.

K. III. Die Tiegerzunge.

*Linn. S. N. Sp. 136. 141.*

*Belg. De wilde Tyger-tong. Rumph. Angl. Checker-grained  
cokle, Petiv.*

Testa orbiculata decussatim Die scheibenförmige Schale  
striata, areola impressa, corda- ist kreuzweise gestreift, und  
ta, mit einer eingedrückten herz-  
förmigen Hinterfläche versehen.

*Nuca, amo o praesertim postico Weiß, und am inneren Ran-  
roseo. de besonders hinten rosenfärbig.*

*Bonan. Recr. cl. 2. f. 69. .*

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 174.*

*Rumph. amb. t. 43. f. H.*

*Petiv. amboin. t. 18. f. 9.*

*Knor. Vergn. IV. 2. t. 1. f.*

*— — VI. 37. t. 2. f.*

K. III. 2. Venus con-  
centrica.

K. III. 2. Die Gürtel-  
venus.

*Angl. The girdled Heart Cockle. Petiv.*

Testa orbiculata laevi, striis Die scheibenförmige glatte  
transuersis concentricis, areo- Schale ist mit gleichabstehen-  
la impressa cordata. den Zirkelfurchen besetzt, und  
mit einer eingedrückten herz-  
förmigen Hinterfläche versehen.

*List.*



List. Hist. Conch. l. 3. f. 99. 102. 104.

Petiv. Gaz. t. 16. f. 1. t. 93. f. 15. 18.

Mus. Caes. Vindobon.

Testa orbicularis solida, laevis, fulcis transuerfis circularibus concentricis. Apices breues recurui. Areola cordiformis impressa. Lima bus integerrimus. Color testis testae niueus.

Die scheibenförmige dicke glatte Schale, hat concentrische Quersur-chen. Die Spitzen sind kurz und rückwärts gebogen. Die Hinterfläche ist herzförmig und vertieft. Der Rand glatt. Die Farbe der ganzen Schale schneeweiß.

K. III. 3. Venus prostrata.

K. III. 3. Die Zirkelscheibe.

Linn. S. N. Sp. 137.

Testa orbiculata transuerse striata, antice membranaceo scabra, areola ovata impressa.

Die scheibenförmige in die Quere gestreifte Schale ist vorne durch erhabene Häute rauh, an der Hinterfläche eyförmig eingedrückt.

Mus. Caes. Vindobon.

K. III. 4. Venus rivularis.

K. III. 4. Die aderige Venus.

Testa orbiculata, transuerse striata, umbonibus complanatis rugosis, areola plana.

Die scheibenförmige in die Quere gestreifte Schale ist auf den flachgedrückten Wölbungen durch erhabene Adern runzelicht, und mit einer platten Hinterfläche versehen.

Mus.



*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa orbiculata gibba, transuerse  
striata; Umbones complanati, ru-  
gis bifariam diuergentibus obfiti.  
Areola plana laeuis. Color pallide  
luteus, areolae fuscus.

Die Schale ist scheibenrund, höcker-  
rig, in die Quere gestreift. Die  
Wölbungen platt gedrückt, und  
mit Runzeln besetzt, welche nach  
zwoen Seiten auseinander laufen.  
Die Hinterfläche ist eben und glatt;  
Die Farbe bleich gelb, die Hin-  
terfläche braun.

K. III. 5. Venus pen-  
sylvanica.

K. III. 5. Der Abriko-  
sen Stein.

*Linn. S. N. Sp. 138.*

*Gall. La Jamaïque. Argenv.*

Testa rotundata, umbonata,  
membranis eleuatis transuer-  
sis, antice sulco utrinque lon-  
gitudinali arcuato, areola im-  
pressa cordata.

Die runde bäuchige Schale  
ist in die Quere mit erha-  
benen Blättern umgeben, vor-  
ne beiderseits der Länge nach  
mit einer bogenförmigen Fur-  
che bezeichnet, an der Hinter-  
fläche herzförmig eingedrückt.

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 138.*

*Argenv. Conch. Pl. 21. f. N.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

K. III. 6. Venus incru-  
stata.

K. III. 6. Die punktir-  
te Lagervenus.

*Linn. S. N. Sp. 139. ?*

*Belg.*





Belg. Het türkische Leger. Rumph. Angl. The türkische Campe.  
Gall. Le campement turque.

Testa rotundata glabra, striis Die rundliche glänzende  
conuergentibus excauato punc- Schale hat zusammenlaufende  
tatis, areola circumscripta tiefpunktirte Streifen, und  
laeui. eine eingefasste glatte Hinter-  
fläche.

List. Hist. Conch. l. 3. f. 146.

Regenf. Samml. I. I. t. 4. f.

K. III. 7. Venus exo-  
leta.

K. III. 7. Die Strahl-  
scheibe.

Linn. S. N. Sp. 142.

Belg. Slet.

Testa lentiformi, transuer- Die linsenförmige in die Quer-  
sim striata, albida, obsolete re gestreifte weißlichte Schale  
radiata, areola cordata. hat schwache Strahlen und ei-  
ne herzförmige Hinterfläche.

List. Hist. Conch. l. 3. f. 98.

Gualt. Test. t. 75. f. F. G.

Adans. Seneg. Pl. 16. f. 4.

Mus. Caes. Vindobon.

K. III. 8. Venus pecti-  
nata.

K. III. 8. Die Kamm-  
venus.

Linn.



*Linn. S. N. Sp. 144.*

*Belg.* Scherfje. *Rumph. Angl.* Cross Cockle *Petiv. Gall.* L'Amande *Dav.*

Testa rotundata, solida, Die rundliche dichte Schale  
longitudinaliter anticeque ob- le ist der Länge nach, und vor-  
lique costata, costis decussa- ne in die Quere geribbet, über  
tis, limbo crenato. die Ribben gestreift, und am  
inneren Rande gekerbet.

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 148. 149.*

*Rumph. amb. t. 42. f. D.*

*Petiv. amb. t. 13. f. 14.*

*Gualt. Test. t. 72. f. E. F.*

*Argenv. Conch. Pl. 21. f. P.*

*Knor. Vergn. VI. 3. t. 3. f.*

K. IV. Lathe, antice subangulatae, K. IV. Breite, vorne etwas eckig  
inermes. ge, und unbewafnete Venusmuscheln.

K. IV. 1. Venus litte-  
rata,

K. IV. 1. Die ächte  
Echilmuschel.

*Linn. S. N. Sp. 147.*

*Belg.* De longaagtige Letter - Schulp. *Rumph. Angl.* The arabian  
*Shell. Hill. Gall.* L'écriture arabique. *Argenv.*

Testa lata ouata, antice an- Die breite, eysförmige, vorne  
gulata, striis transversis undu- eckige Schale hat wellenförmis-  
latis, ge Querstreifen.

Pista.



*Picta* facpe lineis angulatis.

Defters mit Linienförmigen Win-  
felzügen bemalt.

*Bonan. Recr. cl. 2. f. 67.*

*Rumph. amb. t. 43. f. B.*

*Petiv. amb. t. 18. f. 2.*

*Valent. Abb. 13. t. 6. f. 14. t. 10 — 13. f.*

*Gualt. Test. t. 86. f. E, F.*

*Argenv. Conch. Pl. 21. f. A.*

*Regenf. Samml. I. 4. t. 39. f.*

*Hill. Hist. of. Anim. Pl. 9.*

*Knor. Vergn. I. 6. t. 4. f.*

—— II. 28. t. 4. f.

## L. Spondylus.

## L. Die Klappmuschel.

*Linn. S. N. Gen. 310.*

Testa inaequalis, car-  
dinis dentibus duobus cras-  
sis, cum scrobiculo inter-  
medio.

Die Schale bestehet aus  
ungleichen Klappen, am  
Schloße sind zween dicke  
Zähne, zwischen eine Grube.

L. I. Spondylus Gae-  
deropus.

L. I. Die gezackte Klapp-  
muschel.

*Linn.*



Linn. S. N. 151.

Belg. Getackte Lazarus-Klappen. Angl. The great prickly Oyster  
Hill. Gall. Huitre epineuse.

Testa subaurita spinosa, apic- Die stachelichte Schale ist  
cum altero longiore sesto. einigermaßen mit Ohren, und  
einer längeren abgesägten Spitze  
versehen.

$\alpha$  valvis foliaceo spinosis.

$\alpha$  mit blätterichten und dornigen  
Klappen.

$\beta$  valvis spinosis, spinis elongatis,  $\beta$  mit dornigen Klappen, deren Ohren  
obtusis. net lang und stumpf sind.

Bonan. Recr. cl. 2. f. 20. 21.

Rumph. amb. t. 47. f. E.

Petiv. amb. t. 20. f. 6.

Gualt. Test. t. 100. 101. f. A, B. t. 99. f. F. G.

Argenv. Conch. Pl. 21. f. B. G. I. M.

Klein. Meth. Ostr. t. 9. f. 37.

Hill. Hist. of. Anim. Pl. 9.

Seb. Test. III. t. 88. f. I—II. t. 89. f. 4—8.

Knor. Vergn. V. 9. t. I. f. 13. t. I. f.

—— VI. 9. t. I. f.

—— Delic. nat. I. t. B. IV. I. f.





L. 2. Spondylus plicatus.

L. 2. Die Faltenklappe.

Linn. S. N. Sp. 153.

Testa subspinosa, transuersa plicata.

Die Schale ist einigermaßen dornig, und in die Quere gefalten.

α crocea.

α safranfarbig.

Gualt. Test. t. 99. f. E.

Knor. Vergn. III. 6. t. 1. f.

—— VI. 12. t. 3. f.

β lutea.

β gelb.

Knor. Vergn. I. 6, t. 3. f.

M. Chama.

M. Die Gienmuschel.

Linn. Syst. Nat. Gen. 311.

Testa bivaluis absque labris. Cardinis dens callosus, gibbus, insertus fossulae obliquae.

Eine zweiflappige Schale ohne Lippen. Das Schloß hat einen höckerigen schwielenförmigen Zahn, der sich in ein entgegengesetztes Grübchen versenket.

E

M. I.



M. 1. Chama cor.

M. 1. Die Narren-  
kappe.*Linn. S. N. Sp. 154.**Belg. Zotskap. Gall. Coeur de Boeuf. Dav. Ital. Bucardia. Ginan.*

Testa cordata subglobosa, Die herzförmige, einigermas-  
 laeui, apicibus recurvatis, sen kuglichte glatte Schale, hat  
 rima lanceolata hiant. schnirkelförmig zurückgerollte  
 Spitzen, und eine lanzetförmige  
 klappende Vorderpalte.

*Bonan. Recr. cl. 2. f. 88.**List. Hist. Conch. l. 3. f. III.**Rumph. amb. t. 48. f. 10.**Gualt. Test. t. 71. f. E.**Seb. Thes. III. t. 86. f. I.**Ginan. adr. II. t. 19. f. 129.**Knor. Vergn. VI. 8. t. 1. f.*

M. 2. Chama Gigas, M. 2. Das Waschbecken.

*Linn. S. N. Sp. 155.**Belg. Fonteinbak. Angl. The wife of the Nail - Scalop. Gall.  
 La Fautiere, Argenv.*

Testa



Telata lata, plicata, fornicato squamosa; limbo postico hianate, crenato.

Die breite gefaltene Schale ist mit hohlen Schuppen besetzt, und an der stumpfen Hinterfläche mit einer gekerbten Oefnung versehen.

*Bonap. Recr. cl. 2. f. 83. 84.*

*Rumph. amb. t. 42. f. A. B.*

*Petiv. amb. t. 5. f. 13.*

*Gualt. Test. t. 92. f. A, G. t. 93. f. B.*

*Argenv. Conch. Pl. 23. f. E.*

*Klein Meth. Ostr. t. 1. f. 53.*

*Regenf. Samml. I. 10. t. 48. f.*

*Knor. Vergn. I. 19. t. 3. f.*

— *Delic. nat. I. t. B. III. 1. f.*

*Da Cost. Elem. 7. Pl. 4. f.*

*Murray. Fund. Test. t. 2. f. 19. 20.*

M. 3. Chama Hippopus.

M. 3. Der Pferdefuß.

*Linn. S. N. Sp. 156.*

*Belg. Paardeuoetje. Rumph. Angl. The Horse hoofe. Gall. Feuille de Chou. Argenv.*



*Testa plicata, squamis spinosis muricata, margine postico obtusissimo, clauso, dentato.* Die gefaltene Schale ist mit dornigen Schüppchen besetzt, die stumpfe Hinterfläche ist geschlossen und am Rande gezähnt.

*Bonan. Recr. cl. 2. f. 81. 82.*

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 187. 188.*

*Rumph. amb. t. 42. f. C.*

*Petiv. amb. t. 18. f. 15.*

*Gualt. Test. t. 93. f. A.*

*Regenf. Samml. I. 10. t. 49. f.*

*Knor. Vergn. I. 2. t. 1, 2. f.*

— — — VI. 9. t. 3. f.

*Da Cost. Elem. 7. Pl. 10. f.*

M. 4. *Chama antiquata.* M. 4. Die Seenuß.

*Linn. S. N. Sp. 157.*

*Testa subcordata, sulcis longitudinalibus, striisque transuersis.* Die fast herzförmige Schale ist nach der Länge gefurchet, und in die Quere gestreift.

*Bonan. Recr. cl. 2. f. 98.*

*Gualt. Test. t. 71. f. L.*

*Adans. Seneg. Pl. 16. f. 2.*

*Knor. Vergn. II. 20. t. 3. f.*

M. 5.



M. 5. Chama calycu-  
lata.

M. 5. Die Eichelmu-  
schel.

*Linn. S. N. Sp.* 160.

*Gal. Coeur allongé. Dav.*

Testa lata gibba, subtus  
coarctata, sulcis longitudina-  
libus crenulatis.

Die breite höckerige Scha-  
le ist unten eingebogen, und  
nach der Länge mit gekerbten  
Furchen besetzt.

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 184. 185.*

*Gualt. Test. t. 90. f. F.*

*Adans. Seneg. Pl. 15. f. 8.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

M. 6. Chama phreni-  
tica.

M. 6. Die nierenför-  
mige Siemmuschel.

Testa reniformi, sulcis lon-  
gitudinalibus striisque trans-  
uersis, margine postico ser-  
rato, excurrente.

Die nierenförmige nach der  
Länge gefurchte, und in die  
Quere gestreifte Schale hat  
einen rückwärts hervorragenden  
sägeförmigen Hinterrand.

*Valent. Abb. 16. t. 27. f.*

*Knor. Vergn. II. 23. t. 7. f.*

Testa reniformis, antice lata, ro-  
tundata, postice angustata, supra  
arcuata, infra coarctata; sulci lon-

Die Schale ist nierenförmig, vor-  
ne breit und ründlich, hinten schmal,  
oben bogenförmig erhoben, unten  
gicu-





gitudinales, transversim striis decussati. Areae, areolaeque vestigium nullum. Apices subterminales recurui. Margo anticus complanatus, inferior introsum excavatus, retrorsum in formam lobi excurrens, limbo crenato. Dentes duo crassi, posticus brevis, anticus elongatus curvatus. Ligamentum validum crassum, exviridi flavoque resplendens. Color rufus, postice prope apices albus. Cavitas alba, limbo externo sulco.

eingedrückt. Die nach der Länge laufenden Furchen sind mit Querstrichen durchgezogen. Weder am Vorder- noch am Hinterrande zeigt sich eine merkliche Fläche. Die Spitzen sind rückwärts gekrümmt, und stehen nahe an dem einen Ende. Der Vorderzand ist flach gedrückt, der untere einwärts ausgehöhlet, und verläuft sich rückwärts in einen lappenförmigen Fortsatz. Der innere Rand ist gekerbet. Am Schlosse sind zween starke Zähne, davon der vordere kürzer, der hintere verlängert und gekrümmt ist. Das dicke starke Band hat im Bruche einen grüngelben Glanz. Die Schale ist außen braunroth, hinter den Spitzen weiß. Die Höhlung weiß, am äußeren Rande braun.

M. 7. Chama Lazarus. M. 7. Die Muskatens-  
blüthe.

Linn. S. N. Sp. 164.

Belg. Foelie Bladeren. Gall. Gateau feuilleté.

Testa lamellis patentibus, Die Schale ist mit ausge-  
laceris, apice altero oblique breiteten krausen Blättern be-  
subspirali. setzt, mit einer schiefen und  
fast schnirkelförmigen Spitze.

Rumph. amb. t. 48. f. 3.

Seb. Tbes. III. t. 89. f. 5, 6, 9, II.

Knor. Vergn. I. 8. t. I. f.

Mus. Caes. Vindobon.

M. 7.



M. 8. Chama gryphoides.

M. 8. Die Felsengien-  
muschel

*Linn. S. N. Sp. 165.*

*Belg.* The ockergeele Oester. *Gall.* Huitre écailleuse a feuilles de couleur de citron. *Argenv.*

*Testa orbiculari muricata,* Die scheibenrunde rauhe  
*ualua altera planiore,* altera Schale hat eine flache, und  
*productiore subspirali.* eine beinahe schnirkelförmig ver-  
längerte Schale.

*Bonan. Recr. cl. 2. f. 22.*

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 47. 53.*

*Gualt. Test. t. 101. f. C — I.*

*Adans. Seneg. Pl. 15. f. 1.*

*Regenf. Samml. I. 4. t. 44. f.*

*Knor. Vergn. I. 21. t. 2. f.*

— — — VI. 16. t. 1. f.

M. 9. Chama Arci-  
nella.

M. 9. Der dornige  
Pferdhuf.

*Linn. S. N. Sp. 167.*

*Belg.* Rotz doublet,



Testa spinosa, sulcis longitudinalibus, excauato punctatis; areola postica papillosa, intrusa. Die stachelige Schale ist nach der Länge mit höhlspunktierten Furchen besetzt, und hinten mit einer warzigen eingedrückten Fläche versehen.

Knor. Vergn. IV. 14. t. 1. f.

— — VI. 36. t. 1, 2. f.

## N. Arca.

## Die Arche.

Linn. Syst. Nat. Gen. 312.

Testa bivalvis, cardine articulo, dentibus numerosis, alternatim insertis. Die zweyflappige Schale hat an dem Schlosse eine Reihe vieler wechselweise ineinander passender Zähne.

N. I. Margine integro; apicibus recurvis.

N. I. Mit ganzen Rande und zurückgekrümmten Spitzen.

N. I. 1. Arca tortuosa.

N. I. 1. Die gedrehte Arche.

Linn. S. N. Sp. 168.

Belg. Gedraaide Oester. Rumph. Angl. Twisted Lighter. Petiv. Gall. La Bistourrée. Dav.

Testa inaequivalui, oblique parallelipeda, striata, valvula sinistra carinata, apicibus recurvis, margine integro. Die Schale hat die Gestalt eines gedrehten Parallelepipedums. Die Klappen sind gestreift, davon die linke eine kiel förmige Schneide hat. Die Spitzen sind rückwärts gerollt, der Rand ganz.



*Rumph. amb. t. 47. f. K.*

*Petiv. amb. t. 20. f. 9.*

*Gualt. Test. t. 95. f. B.*

*Klein. Meth. Ostrac. t. 8. f. 16.*

*Knor. Vergn. I. 23. t. 3. f.*

N. II. Margine integro, apicibus inflexis.

N. II. Mit ganzem Rande, und einwärts gekrümmten Spizen.

N. II. I. Arca Noae.

N. II. I. Die Arche Noah.

*Linn. S. N. Sp. 169.*

*Belg. De rechte Noachs - Ark. Rumph. Angl. Noahs - Lighter Petiv. Gall. L'Arche de Noe. Dav.*

Testa transuersa, nauculari, rhombea, striata, antice compressa, retusa, apicibus incuruatis remotissimis, margine integro, subtus hiante.

Die Schale ist gestreckt, hat eine schiefartige rautenförmige Gestalt, ist gestreift, vorne zusammengedrückt und stumpf. Die Spizen sind einwärts gerollet, von einander weit entfernt; der Rand ganz und unten klaffend.

*Aldrov. Test. l. 3. t. 15.*

*Bonan. Reer. cl. 2. f. 32.*

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 208. 209.*

*Petiv. amb. t. 17. f. 10.*





*Rumph. amb. t. 44. f. P.*

*Gualt. Test. t. 87. f. H. H. I.*

*Argenv. Conch. Pl. 23. f. G.*

*Regenf. Samml. I. 12. t. 73. f.*

*Knor. Delic. nat. I. t. B. V, 2. f.*

—— *Vergn. I. 16. t. 1. 2. f.*

*Martin. Berlin. Beschaeft. III. 6. t. 5. f.*

N. II. 2. *Arca barbata.* N. II. 2. Die Bartar-  
che.

*Linn. S. N. Sp. 170.*

*Belg. Arcke Nonchs Soort. Mus. Oud. Angl. The coated Muscle.*  
*Hill. Gall. Amande à cils. Dav. Ital. Cozze, Bonan.*

Testa transuersa, striis bar- Die Schale ist gestreckt, an  
batis, apicibus incuruis ap- den Streifen langharig; die Spi-  
proximatis, margine integro, zen sind einwärts gerollt, und  
subtus hiantes. aneinander genähert, der Rand  
ganz, und unten klappend.

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 65.*

*Bonan. Recr. cl. 2. f. 79.*

*Gualt. Test. t. 91. f. F.*

*Mus. Tessin. t. 6. f. I.*

*Argenv. Conch. Pl. 22. f. M.*

*Ginan, adr. II. t. 23. f. 160.*

*Adans. Seneg. Pl. 18. f. 9.*

*Knor.*





*Knor. Verg. II. 27. t. 7. f.*

*Murr. Fund. Testac. t. 2. f. 22.*

*Mart. Berlin. Beschaeft. III. 6. t. 8. f.*

N. III. Margine crenato, apicibus recurvatis. N. III. Mit gekerbtem Rande, und eingerollten Spizen.

N. III. I. Arca anti-  
quata.

N. III. I. Die Bastart-  
arche.

*Linn. S. N. Sp. 174.*

*Belg. Maagt Bloem. Rumph. Angl. Virgin Ark. Petis. Gall. Coeur en Arche de Noe. Favart.*

Testa oblique cordata, sulcato striata, area cardinis rhomboidali, antrorsum elongata.

Die Schale ist schiefherzförmig, mit gestreiften Furchen besetzt, die Angelfläche rautenförmig, vorne lang zugespitzt.

α Testa transversim striata, antrorsum angulata, compressa, area cardinis plana.

α Die Schale ist über die Quere gestreift, vorne eckig und zusammengedrückt. Die Angelfläche eben.

*Bonon. Recr. cl. 2. f. 73.*

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 70.*

*Gualt. Test. t. 87. f. B.*

*Knor. Vergn. I. 24. t. 3. 4. f.*



- § Testa costis decussatim striatis, antice subexcurrente, rotundata, area introrsum declivi. β Die Ribben sind kreuzweise gestreift, der Vorderrand ist etwas verlängert und rundlicht, die Schloßfläche gegen die Mitte abhängig.

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 65.*

*Rumph. amb. t. 44. f. 7.*

*Petiv. amb. t. 17. f. 8.*

*Gualt. Test. t. 87. f. A. C.*

*Adans. Seneg. Pl. 18. f. 8.*

*Murray. Fund. Testac. t. 2. f. 15.*

*Mart. Berl. Beschäft. III. 6. t. II. f.*

N. III. 2. Arca rhombea.

N. III. 2. Das Raute-  
tenkörbchen.

Testa cordata, multifulcata, costis mediis transversim striatis, apicibus incurvatis in die Quere gestreift, die remotis, area cardinis rhombea. Die herzförmige Schale hat viele Furchen, die Ribben sind in die Quere gestreift, die Spizen einwärts gerollt, und die Angelfläche rautenförmig.

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 75.*

*Knor. Vergn. IV. 14. t. 2. f.*

Testa cordata, aequivalvis, longitudinaliter fulcata, costis 26, inter- Die Schale ist herzförmig, gleichklappig, nach der Länge geschnitten mit 26. Ribben, davon die mittleren in die Quere gestreift sind.  
 ter-



interjecta plana, vere rhombea, lineis incilis rhomborum concentricorum figuram exacte referentibus; ligamentum membranaceum aream obtegens, inciluras lineares ex-plens. Sutura cardinis intus armata dentibus minutis, diagonalem areae majorem constituit.

Die Spitzen sind einwärts gerollt, etwas zurückgekrümmt, und von einander entfernt. Die dazwischen liegende Angelfläche ist genau rauteuförmig, auf welcher gleichfalls rauteuförmige in einander liegende Linien ausgeschnitten sind. Das hautige Band bedeckt die ganze Angelfläche und versenket sich in die ausgeschnittenen Rautenlinien. Die Naht des Angels bildet die größere Diagonallinie, und ist inwendig mit einer Reihe kleiner Zähne besetzt.

N. III. 3. Arca decussata.

N. III. 3. Die gefleckte  
Kuchenschnecke.

Linn. S. N. 177.

Gall. Furie flamboyante; Favart.

Testa orbiculari conuexa, glabra, sulcis longitudinalibus, striisque transversis obsoletis, fusco maculata, apicibus incurvis, limbo acute crenato.

Die Schale ist rund und gewölbt, glänzend, mit schwarzen Furchen der Länge nach, und feinen Streifen über die Quere besetzt; auf der Oberfläche braun gefleckt. Die Spitzen sind einwärts gekrümmt. Der innere Rand hat scharfe Kerben.

Habitus A. pilosae, cujus forte varietas.

Sie hat die Gestalt der Samtenschnecke, davon sie vielleicht eine Abänderung ist.

List. Hist. Conch. 1. 3. f. 82.

Bonan. Rœcr. cl. 2. f. 60.

Knor.



*Knor. Vergn. VI. 14. t. 4. f.*

N. IV. Margine crenato, apicibus N. IV. Mit gekerbten Rande und  
inflexis. einwärts gekrümmten Spizen.

N. IV. 1. Arca Pectun-  
culus.

N. IV. 1. Die gestrahl-  
te Kuchenmuschel.

*Linn. S. N. Sp. 180.*

Belg. Geribde Poffer - doublet. Mus. Leers. Gall. Petoncle sans  
oreilles. Dav. Angl. Spotted Ark.

Testa orbiculari, complana- Die Schale ist rund und  
ta, sulcata, radiata, transuer- etwas platt, mit strahligen  
sim rugosa, apicibus incur- Furchen und nach der Quere  
uis, area declivi lanceolata, laufenden Rünzelstreifen. Die  
limbo plicato. Spizen sind einwärts gekrümmet,  
die Angelfläche schmal,  
gegen die Mitte abhângig; der  
innere Rand gefalten.

*Bonan. Mus. Kirch. cl. 2. f. 129.*

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 73.*

*Knor. Vergn. V. 12. t. 4. f.*

*Mart. Berlin. Beschæft. III. 6. t. 3, 4. f.*

N. IV. 2. Arca pilosa.

N. IV. 2. Die Sammt-  
muschel.

*Linn. S. N. Sp. 182.*

Belg. See Noot. Angl. Cockle with heavy streaks. Petiv. Gall. Noix  
de Mer Argeny. Ital. Musculo hirsuto. Mus. Moscard.

Testa



Testa rotunda, umbonata,  
longitudinaliter tenuissime stria-  
ta, apicibus incuruis, limbo  
crenato.

Die Schale ist rund, bau-  
zig, der Länge nach sehr fein  
gestreift, die Spitzen einwärts  
gekrümmt, der innere Rand  
gekerbet.

α holosericea, fusca.

α mit sammtartigen Ueberzug, von  
brauner Farbe.

β glabra, fulva

β mit glatter gelbbrauner Schale.

Bonap. Recr. cl. 2. f. 80.

Petiv. Gaz. t. 95. f. 7.; t. 79. f. 7.

Gualt. Test. t. 73. f. A.

Knor. Vergn. VI. 12. t. 4. f.

Mart. Berlin. Beschäft. III. 6. t. 1. f.

#### N. IV. 3. Arca scripta.

#### N. IV. 3. Die gezeich- nete Ruchenmuschel.

Testa orbiculari convexa lae-  
vi, lineis angulatis fulvis pi-  
cta, apicibus incuruis, lim-  
bo crenato.

Die Schale ist rund und ge-  
wölbt, von glatter, und mit  
gelbbraunen Winkelförmigen be-  
mahlter Oberfläche. Die Spi-  
zen sind einwärts gekrümmt,  
der innere Rand gekerbet.

List. Hist. Conch. 1. 3. f. 80.

Mus. Caes. Vindobon.

Testa





Testa conuexa laevis, striis longitudinalibus tenuissimis, ut in A. pilosa, cujus forte varietas est. Area decliuus, angustata; Cardo rectus linearis. Dentes intus 20 in arcum digesti, extimi utrinque crassiores. Ambitus orbicularis. Limbus crenatus.

Die Schale ist gewölbt, und der Länge nach wie die Sammtmuschel, davon sie vielleicht eine Abänderung ist, sehr zart gestreift. Die Schloßfläche ist einwärts abhändig, und schmal. Die Schloßlinie gerade. Inner derselben stehen 20 Zähne in bogenförmiger Stellung. Der Umfang ist zirkelrund. Der innere Rand gekerbt.

## O. Ostrea.

## O. Die Auster.

Linn. Syst. Nat. Gen. 313.

Testa bivaluis, subaurita; Cardo edentulus, fossula media excavata ovali, striis lateralibus transversis.

Die zweyflappige Schale ist einigermaßen geköhret. Das Schloß ist ohne Zahn, in der Mitte mit einem ausgehohlten euförmigen Grübchen, an den Seiten mit Querstreifen versehen.

O. I. Pectines auriculis aequalibus.

O. I. Kammuscheln mit gleichseitigen Ohren.

O. I. I. Ostrea maxima.

O. I. I. Die Pilgrims-  
muschel.

Linn. S. N. Sp. 185.

Belg.



*Belg.* St. Jacobs Schulp. *Rumph.* *Angl.* St. James Shell. *Gall.*  
*Conque de St. Jacques bariolée. Argenv. Ital.* Capa santa.

Testa inaequivalui, radiis Die ungleichseitige Schale  
 roduntatis, longitudinaliter hat rundliche nach der Länge  
 striatis, gestreifte Schalen,

*List. angl. t. 5. f. 29.*

— *Hist. Conch. l. 3. f. 163.*

*Gualt. Test. t. 98. f. A. B.*

*Regenf. Samml. I. 2. t. 19. f.*

*Knor. Vergn. I. 14. t. 1, 2. f.*

— — II. 14. t. 1. f

O. I. 2. Ostrea Jaco-  
 baea.

O. I. 2. Die Jakobs-  
 muschel.

*Linn. S. N. Sp. 186.*

*Belg.* Spaansche St. Jacobs doublet. *Gall.* Coquille de St. Jacques  
 d' Espagne.

Testa inaequivalui, radiis Die ungleichklappige Scha-  
 rectangulis, longitudinaliter le hat geradwinklichte, nach  
 sulcatis. der Länge gefurchte Strahlen.

*Bonan. Recr. cl. 2. f. 3, 4.*

*Gualt. Test. t. 99. f. B.*

*Ginan. adr. II. t. 16. f. 123.*



Regenf. Samml. I. 7. t. 3. f.

Knor. Vergn. VI. 38. t. I. f.

O. I. 3. Ostrea Ziczac.

O. I. 3. Die Neptunsdose.

Linn. S. N. Sp. 187.

Belg. Joppe doublet.

Testa inaequali, radiis (18) complanatis, plicis le hat (18) plattgedrückte intus prope limbum duplica- Strahlen, mit gedoppelten Fal- tis. ten am inneren Rand.

Regenf. Samml. I. 11. t. 53. f.

Knor. Vergn. II. 19. t. 3. f. 20. t. I. f.

O. I. 4. Ostrea Pleu-  
ronectes.

O. I. 4. Die Kompass-  
muschel.

Linn. S. N. Sp. 190.

Belg. Kompass-Schulp. Angl. The rhin Scallop. Hill. Gall. L'Euen-  
tail. Dav.

Testa aequali orbiculata Die gleichklappige scheibens-  
laui, radiis internis (24) runde glatte Schale, hat inne-  
geminatis. wendig (24) gepaarte Strah-  
len.

Color operculi rufus, fornicis  
albus.

Der Deckel ist braunroth; die ge-  
wölbte Klappe weiß.

Rumph.



*Rumph. amb. t. 45. f. A. B.*

*Petiv. Gaz. t. 49. f. 13.*

— *amboin. t. 17. f. 14.*

*Gualt. Test. t. 73. f. B.*

*Argenv. Conch. Pl. 24. f. G.*

*Klein. Meth. Ostr. t. 9. f. 30.*

*Hill. Hist. of. Anim. Pl. 9.*

*Knor. Vergn. I. 20. t. 3. 4. f.*

O. I. 5. Ostrea Radula. O. I. 5. Die Sägertasche.

*Linn. S. N. Sp. 191.*

*Belg. Jaegers Weytasch. Angl. Common Amboina Scallop. Petiv. Gall. Gibeciere en Manteau.*

Testa subaequivalui ovali, Die einigermaßen gleichklappige  
radiis (12) convexus decus- enformige Schale hat  
satim striatis, auriculis aequa- (12) erhabene kreuzweis ge-  
libus, streifte Strahlen, und gleiche  
große Ohren.

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 12.*

*Rumph. amb. t. 44. f. A.*

*Petiv. amboin. t. 17. f. 1.*

*Knor. Vergn. V. 9. t. 4. f.*



O. I. 6. Ostrea Plica.

O. I. 6. Der gewölkte Mantel.

Linn. S. N. Sp. 192.

Angl. The little yelow Scallop. Hill.

Testa aequivalui glabra, Die gleichklappige glatte  
radiis (6) conuexis glabris, Schale hat (6) erhabene kreuz-  
decussatim striatis. weis gestreifte Strahlen.

Rumph. amb. t. 44. f. O.

Argenv. Conch. Pl. 24. f. C.

Hill. Hist. of. Anim. Pl. 10.

Knor. Vergn. V. 10. t. 5. 6. f.

O. II. Pectines auriculis inaequa-  
libus, altera excisa, scabra.O. II. Kammuschel mit unglei-  
chen Ohren, deren eines ausge-  
schnitten und rauh ist.

O. II. 1. Ostrea Pallium.

O. II. 1. Der Königs-  
mantel.

Linn. S. N. Sp. 193.

Belg. Königs-Mantel. Angl. The Ducal Mantle Scallop. Gail.  
Manteau ducal.

Testa aequivalui rotundata, Die gleichklappige rundliche  
radiis 12. obtusis striata, squa- Schale hat 12. stumpfe, ge-  
misque imbricata, streifte, und mit ziegelförmig-  
gen Schuppen bedeckte Strah-  
len.

Rumph.





*Rumph. amb. t. 44. f. B. C.*

*Gualt. Test. t. 71. f. F.*

*Argenv. Conch. Pl. 24. f. 7*

*Regenf. Samml. I. 6. t. 59. f.*

*Knor. Vergn. I. 19. t. 2. f.*

—— ——— II. 21. t. 1, 2. f.

—— ——— V. 27. t. 2. f.

*Da Cost. Elem. 6. Pl. 1. f.*

O. II. 2. *Ostrea nodosa.* O. II. 2. Die Korallen-  
muschel.

*Linn. S. N. Sp. 194.*

*Belg. Koraal - doublet. Rumph. Gall. La Coralline. Dav. Angl.*  
*The Coral Scallop. Hill.*

*Testa aequivalui, radiis Die Strahlen der gleichflap-*  
*connexis, sulcatis, nodoso pigen Schale sind erhaben, ge-*  
*articulatis, streifet, und mit knotigen Bu-*  
*ckeln unterbrochen.*

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 24.*

*Bonan. Recr. cl. 2. f. 18.*

*Rumph. amb. t. 48. f. 8.*

*Gualt. Test. t. 91. f. C. D.*

*Argenv. Conch. Pl. 24. f. F.*



Hill. Hist. of. Anim. Pl. 10.

Knor. Vergn. IV. 13. t. 5. f.

Spengl. berlin. Beschaeft. II. 13. t. 12. f.

O. II. 3. *Ostrea elongata*.

O. II. 3. Der lange Mantel.

Testa ovato elongata, longitudinaliter striata, radiis (8) transuersim rugosis, auricula altera minima.

Die eysförmige verlängerte und der Länge nach gestreifte Schale hat (8) in die Quere gerunzelte Strahlen, und ein sehr kleines Ohr.

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa ovata, elongata, planiuscula subpellucida; striae elevatae longitudinales; costae 8. transuersim rugosae. Margo repandus plicatus. Auriculae inaequales supra muricatae, altera minima. Color pallide incarnatus.

Die Schale ist eysförmig, verlängert, flach und halb durchsichtig. Nach der Länge laufen erhabene Streifen. Die acht Rippen sind runzelicht. Der Rand ist ausgeschweift und gefalten. Die ungleichen Ohren, deren eines sehr klein ist, sind oben raub. Von blasser fleischrother Farbe.

O. II. 4. *Ostrea fulcata*.

O. II. 4. Der gefurchte Mantel.

Testa aequivalui rotundata, longitudinaliter striata, radiis

Die gleichklappige rundliche Schale ist nach der Länge ge-



(12), auriculis subaequalibus. streifet, mit (12.) strahligen Ribben und einigermaßen ungleichen Ohren versehen.

$\alpha$  albo fuscoque maculata,

$\alpha$  Weiß und braun gefleckt,

$\beta$  tota flava.

$\beta$  ganz gelb.

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa subpellucida rotundata, convexa, aequivalvis, striis artibus longitudinalibus; Costis duodecim radiatis. Auriculae fere aequales latae.

Die Schale ist rundlich, häuchig und halb durchsichtig; die Klappen von gleicher Größe, mit gedrängten nach der Länge laufenden Streifen besetzt. Die Ohren sind beinahe gleich und breit.

O. II. 5. Ostrea cinbarina.

O. II. 5. Der bandirte Mantel.

Belg. Gebanderde Mantel. Gall. Manteau bandé.

Testa aequivalvi, radiis numerosis inaequalibus, transversim rugulosis.

Die gleichklappige Schale ist mit sehr vielen ungleichen, und in die Quere gestreiften Strahlen versehen.

Gualt. Test. t. 73. f. C.

Regenf. Samml. I. 3. t. 36. f. 4. t. 38. f.

Knor. Vergn. V. 15. t. 1. f.



Testa rotundata, magna, convexiuscula, aequivalvis, longitudinaliter multifulcata; Radii numerosi inaequales, striis transversis undulatis decussati; Auricula altera latior, antice excisa, margine ciliato. Color extus cinnabarinus, cingulis aliquot pallidis.

Die runderliche große, etwas häu-  
chige und gleichklappige Schale ist  
der Länge nach gefurchet. Die häu-  
figen Strahlen sind ungleich, und  
mit wellenförmigen Querstreichen  
durchkreuzet. Ein Ohr ist breiter,  
vorne ausgeschnitten, und am Ran-  
de rauh. Die ganze Schale ist aus-  
wendig zinnoberroth mit blaßen  
Querstreifen.

O. II. 6. *Ostrea miniara.*

O. II. 6. Der men-  
ningrothe Mantel.

Testa inaequivalvi multi-  
striata scabra, auriculis sub-  
aequalibus.

Die ungleichklappige Scha-  
le hat sehr viele rauhe Streife,  
und beinahe gleiche Ohren.

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa rotundata, striis longitu-  
dinalibus numerosis muricatis. Val-  
vae inaequales, altera plana, altera  
convexa, excrecentiis transversis  
lamellosis laceris. Auriculae sub-  
aequales, altera excisa margine ci-  
liato. Color albus maculis con-  
fluentibus miniatis.

Die runderliche Schale ist der Län-  
ge nach mit rauhen Streifen ver-  
sehen. Die Klappen sind ungleich,  
deren eine flach, die andere erhaben,  
und in die Quere mit krausen  
Blättern besetzt ist. Die Ohren  
sind beinahe gleich, eines aus-  
geschnitten, und am Rande rauh.  
Die Farbe ist weiß mit zusam-  
fließenden menningsfarbigen Flecken.

O. II. 7. *Ostrea varia.*

O. II. 7. Der bunte  
Mantel.

*Linn.*



Linn. S. N. Sp. 199.

Belg. Gestippelte Mantel. Gall. Manteau pointillé.

Testa aequilualui, radiis (30) labris, auricula altera minima. Die gleichklappige Schale hat (30) rauhe Strahlen, und ein sehr kleines Ohr.

α cinnabarina, maculis albidis violaceisque. α zinnoberfarbig mit weißen und violeten Flecken.

Knor. Vergn. V. 13. t. 2. f.

β atro violacea.

β schwarz violet.

γ alba nebulis violaceis.

γ weiß mit violeten Flecken.

δ lutescens, fuscoque variis.

δ gelblich, und braun gefleckt.

Gualt. Test. t. 74. f. R.

Knor. Vergn. II. 18. t. 3. f.

—— — V. 11. t. 3. f.

O. II. 8. Ostrea glabra. O. II. 8. Der glatte Mantel.

Linn. S. N. Sp. 201.

Testa aequilualui, radiis (10) laevis planiusculis, striis internis elevatis, duplicatis. Die gleichklappige Schale hat (10) glatte etwas flache Strahlen, und innwändig erhabene gedoppelte Streifen.

F 5

α flava





α flava.

α gelb.

β nigra.

β schwarz.

Gualt. Test. t. 73. f. H.

Regenf. Samml. I. 1. t. 10. f.; 8. t. 15. f.

Knor. Vergn. I. 8. t. 5. f.

O. III. 9. Ostrea maculata.

O. III. 9. Der gefleckte Mantel.

Testa aequivalui, longitudinaliter striata, radiis (10) conuexis.

Die gleichklappige Schale ist nach der Länge gestreift, und mit (10) erhabenen Strahlen versehen.

Regenf. Samml. I. 3. t. 30. 31. f.

Knor. Vergn. II. 18. t. 5. f.

Testa aequivaluis conuexa glabra, longitudinaliter striata; Costae (10) conuexae. Auriculae subaequales. Color supra ex albo fuscoque nebulosus.

Die gleichklappige bänchige glatte Schale ist der Länge nach gestreift. Die (10) Strahlrippen sind erhaben. Die Ohren fast gleich. Die Farbe ist weiß, und braun motticht.

O. II. 10. Ostrea coarctata.

O. II. 10. Das Schüsselfchen.

Testa conuexa glabra, radiis (6) conuexis, margine coarctato.

Die bänchige glatte Schale hat (6) erhabene Strahlen und einen eingesakten Rand.



Valua solitaria.

Eine einzelne Klappe.

Knor. Vergn. II. 21. r. 5. f.

Testa conuexa tenuis glabra, longitudinaliter obsolete striata. Radii (6) conuexi crassi. Margo deorsum flexus undique coarctatus; Limbus crenulatus. Auriculae inaequales; hinc distincta ab O. Plica.

Die häuchige dünne glatte Schale ist der Länge nach mit matten Streifen versehen. Die (6) Strahlen sind erhoben und dick. Der Rand ist mit einer Stulpe eingefast und innwändig gekerbet. Die Ohren sind ungleich, wodurch sich diese Art von dem gewölkten Mantel unterscheidet.

O. II. 11. Ostrea solaris.

O. II. 11. Der goldgelbe Mantel.

Testa rotundata glabra, radiis (20) conuexis, sulcis longitudinaliter striatis.

Die rundliche glatte Schale hat (20) erhabene Strahlen, und nach der Länge gestreifte Zwischenfurchen.

Valua solitaria.

Eine einzelne Klappe.

Mus. Caes. Vindobon.

Valua complanata rotundata, radiis (20) conuexis laevibus, sulcis intermediis obsolete striatis. Auriculae subaequales? Color vividissimus aurantiacus.

Die Klappe ist rund und flach gedrückt, die (20) Strahlen sind erhoben und glatt. Die Zwischenfurchen matt gestreift. Die Ohren etwas ungleich. Die Farbe ist ein lebhaftes goldgelb.

O. II. 12. Ostrea opercularis.

O. II. 12. Die scharfribbige Kammuschel.

Linn.



Linn. S. N. Sp. 136. 202.

Belg. Oranje Mantel. Gall. Manteau d'Orange.

Testa rotundata, radiis (20) Die rundliche Schale hat  
carinatis, decussatim striato (20) kiefelförmige, und durch  
scabra, operculo conuexiore. Querstreife durchkreuzte Strah-  
len; und einen etwas bäuchig-  
gen Deckel.

Knor. Vergn. II. 3. t. 2. 3. f.

Regenf. Samml. I. 2. t. 17. f.

O. II. 13. Ostrea Nu-  
cleus.

O. II. 13. Der Stein-  
fern.

Testa aequivalui, radiis (20) Die gleichklappige, beider-  
conuexis glabris, valua utra- seits bäuchige Schale hat (20)  
que conuexa. erhabene glatte Rippen.

Mus. Caes. Vindobon.

Testa rotunda aequivaluis costis  
elevatis (20), fulcis intermediis  
latis transverse sulcatis. Auriculae  
subaequales. Valua utraque umbo-  
nata, albo fuscoque nebulosa.

Die rundliche gleichklappige Schale hat (20) erhabene Strahlrippen-  
und breite nach der Quere gestreifte  
Zwischenfurchen. Die Ohren sind  
beinahe gleich. Beide Klappen  
bäuchig, von weiß und braun ge-  
mischter Farbe.

O. II. 14.



O. II. 14. *Ostrea gibba*. O. II. Die gewölbte Dose.

*Linn. S. N. Sp. 203.*

*Belg. Adama Doublet.*

Testa aequivalui, radiis (24) subangulatis, sulcis intermediis decussatim striatis, valua utraque conuexa. Die gleichklappige, beiderseits bänchige Schale hat (24) einigermaßen eckige Strahlen, die mit Quersstreifen durchkreuzet sind.

*Brown. Hist. of. Jam. t. 40. f. 10.*

*Regenf. Samml. I. 2. t. 16. f.*

*Knor. Vergn. I. 18. t. 2. f.*

— — — II. 5. t. 4. f.

O. II. 15. *Ostrea pyxidata*. O. II. 15. Die gesurchte Dose.

Testa inaequivalui, radiis (32) conuexis laevis. Valua altera plana. Die Schale, welche aus einer bänchigen, und einer flachen Klappe besteht, hat (32) erhabene glatte Strahlen.

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa rotundata, radiis (32) conuexis laevis. Valua una plana, altera conuexa, prope auriculam excisam ciliata. Color albus, fusco carneoque variegatus. Die rundliche Schale hat (32) erhabene glatte Strahlen. Eine Klappe ist flach, die andere bänchig und nächst dem ausgeschnittenen Ohre rauh. Weiß mit fleischrothen Flecken.





O. II. 16. Ostrea undata.

O. II. 16. Die wellenförmige Tasche.

Testa aequivalui ovata, radiis (18) conuexis, sulcis transversim striatis.

Die gleichklappige Schale hat (18) erhabene Strahlen, mit nach der Quere gestreiften Zwischenfurchen.

*Knor. Vergn. II. 4. t. 2. 3. f.*

Valvae solitariae ovatae, radiis (18-20) conuexis glabris, striis transversis intercostalibus. Color albus, maculis transversis undatis sulcis.

Die einzelnen Klappen haben (18-20) erhabene Strahlen, und in die Quere gestreifte Zwischenfurchen. Die Farbe ist weiß mit wellenförmigen braunen Querstreifen.

O. III. Pectines cardine subobliquo, auricularis brevibus, acutis.

O. III. Kammuscheln mit etwas schiefen Schloße, und kurzen spitzigen Ohren.

O. III. 1. Ostrea fasciata.

O. III. 1. Die Eismuschel.

*Linn. S. N. Sp. 204.*

Testa aequivalui gibba, radiis (20) tenuibus scabris, cardine obliquo, auriculis acutis.

Die gleichklappige höckerige Schale hat (20) dünne rauhe Strahlen, ein schiefes Schloß, und spitzige Ohren.

*Gualt.*





Gualt. Test. t. 74. f. E. E. ?

Mus. Caes. Vindobon.

O. III. 2. Ostrea Lima. O. III. 2. Die Zeile.

Linn. S. N. 206.

Belg. Rasp. Doubler. Rumph. Angl. Grazer Scallop. Petiv. Gall. Ratifsoir. Argenv.

Testa aequivalui, antice com- Die gleichklappige vorne  
planata, radiis (22) forni- flachgedrückte Schale hat (22)  
cato squamosis, cardine ob- mit rinnenförmigen Schuppen  
liquo, auriculis inaequalibus. besetzte Strahlen, ein schiefes  
Schloß, und ungleiche Ohren.

List. Hist. Conch. t. 3. f. 14.

Rumph. amb. t. 44. f. D.

Petiv. amb. t. 8. f. 4.

Argenv. Conch. Pl. 24. f. E.

Knor. Vergn. VI. 34. t. 3. f.

O. III. 3. Ostrea bul- O. III. 3. Die Bla-  
lata, sentasche.

Testa ovata aequivalui um- Die gleichklappige enförmig  
bonata, sulcis longitudinali- ge bäuchige Schale hat (22)  
bus (32); cardine transuer- nach der Länge laufende Furs-  
so, auriculis aequalibus, chen, einen schiefen Rand, und  
gleiche Ohren.

Mus.



*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa oblongo ouata, tumida, fulcis (32) longitudinalibus. Umbones attenuati in apices breves recuruos. Cardo transversus. Latus media lata. Auriculae utrinque acutae aequales. Color albus.

Die eiförmig längliche aufgeblasene Schale hat (32) nach der Länge laufende Furchen. Die Wölbungen verdünnen sich in kurze, rückwärts gekrümmte Spitzen. Das Schloß steht schief. Die Höhlung in der Mitte derselben ist breit. Die Ohren sind spitzig, und einander gleich. Von weißer Farbe.

O. III. 4. *Ostra scabra.*

O. III. 4. Die rauhe Tasche.

Testa ouata complanata, striis longitudinalibus deorsum scabris, auriculis inaequalibus, altera emarginata.

Die eiförmige, zusammenge-drückte Schale hat nach der Länge laufende abwärts rauhe Strahlen, und ungleiche Ohren, deren eines eingesäumt ist.

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 13.*

*Knor. Vergn. VI. 38. t. 5. f.*

Testa ouata compressa; striae longitudinales numerosae, deorsum ad tactum scabrae. Cardo subobliquus. Auriculae inaequales, minore emarginata, inter quas testae hiatus. Color cinereus.

Die eiförmige zusammenge-drückte Schale ist nach der Länge mit sehr vielen Runzeln besetzt, und hinabwärts rauh anzufühlen. Das Schloß steht etwas schief. Die Ohren sind ungleich, deren kleineres eingesäumt ist, zwischen welchen die Schale klappt. Von schneeweißer Farbe.

O. IV.



O. IV. Rudes. Ostreae,

O. IV. Raube, eigentliche Raube.

O. IV. 1. Ostrea Mal-  
leus.O. IV. 1. Der pointe  
sche Hammer.*Linn. S. N. Sp. 207.**Belg. Mes hamer. Rumph. Angl. The Hammer - Oyster. Hill. Gall. Le Mart au. Dav.*

Testa rudi flexuosa trilo- Die rauhe gedrehte Schal-  
ba, lobis transuersis opposi- besteht aus drey Lappen, des-  
tis, ren zween einander entgegen  
gesetzt sind.

*Lisb. Hist. Conch. l. 3. f. 54.**Rumph. amb. t. 47. f. A.**Petiv. amb. t. 20. f. 10.**Gualt. Test. t. 96. f. D. E.**Klein. Meth. Ostrac. t. 8. f. 14.**Seb. Thes. III. t. 91. f. 4. 5. t. 93. f. 12.**Hill. Hist. of. Anim. Pl. 9.**Argenv. Conch. Pl. 19. f. H.**Knor. Vergn. III. 4. t. 1. f.**Müll. Linn. Naturfyst. VI. 1. B. 2. t. 2. f.*O. IV. 2. Ostrea Fo-  
lium.O. IV. Das Lorbeer-  
blatt.*Linn. S. N. Sp. 209.**Belg. Laurier - blad. Angl. The tree Oyster. Hill. Gall. La Feuille  
du Laurier.*



Testa ouata, margine obtuse plicato, valvae planioris rachi spinosa amplexicauli.

Die eyrunde am Rande stumpf gefaltene Schale hat an der flächeren Klappe eine flachlichte klauenförmige Mittelribbe.

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 32.*

*Rumph. amb. t. 47. f. A.*

*Petiv. amb. t. 20. f. 1.*

*Klein. Meth. Ostrac. t. 8. f. 22.*

*Knor. Vergn. I. 23. t. 2. f.*

O. IV. 3. Ostrea cristata.

O. IV. 3. Die Kamm-auster.

Testa rotundata, lamellis imbricatis, margine obtuse plicato, dentato, apice altero porrecto.

Die rundliche Schale ist mit Blättchen ziegelförmig besetzt, am Rande stumpf, und zahnförmig gefalten. Eine Schlossspize raget hervor.

*Gualt. Test. t. 104. f. F.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa inaequivalvis membranis imbricatis rugosis. Margo repandus, obtuse plicato dentatus. Apex valvae alterius paraliticae longior, prominens. Cardinis tendo medius latus conicus. Color albus, maculae dispersis nigris.

Die Schale welche aus ungleichen Klappen besteht, ist mit rundlichen Blättern ziegelförmig besetzt. Der Rand ausgeschweifet, mit stumpfen zahnförmigen ineinander beißenden Falten. Die Spitze der aufstehenden Schale ist verlängert, und in die Höhe gestreckt. In der Mitte des Schlosses ist ein breiter kegelförmiger Knorpel. Die Farbe ist weiß mit zerstreuten schwarzen Flecken.

O. IV. 4.





O. IV. 4. *Ostrea edulis*. O. IV. 4. Die gemeine Auster.

*Linn. S. N. Sp.* 211.

*Belg.* Oester. *Angl.* Oyster. *Gall.* Huitre. *Ital.* Ostrea. *Gin.*

*Testa* subrotunda complanata, *membranis undulatis imbricata*, *valuula altera plana integerrima*. Die rundliche plattgedrückte Schale ist mit runzelichten Blättern ziegelförmig bedeckt; mit ganzem Rande an der flachen Klappe.

*List. angl. t. 4. f. 21.*

*Bonan. Recr. cl. 2. f. 70.*

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 195. 196.*

*Gualt. Test. t. 102. f. B.*

*Klein. Meth. Ostrac. t. 8. f. 21.*

*Ginan. adr. II. t. 18. f. 127.*

*Bast. subs. I. t. 8. f. 12.*

*Knor. Vergn. III. 24. t. 2. f. 25. t. 2. f.*

O. IV. 5. *Ostrea denticulata*. O. IV. 5. Die gezähnelte Auster.

*Testa* rotundata foliacea, *valua altera plana parasitica*, *cardine utrinque denticulato*. Die rundliche blätterige Schale hat eine flache aufstehende Klappe, und an beiden Seiten des Schloßes kleine Zähnen.





*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa inaequivaluis, valua altera conuexa subouata glabra, altera explanata, rotunda, maiore, parasitica. Cartilago latissimus nitidus, Latera postica utrinque acute denticulata, inserenda foueolis testae oppositae.

Die Klappen der Schale sind ungleich, deren eine etwas bäuchig eiförmig und glatt, die andere aber, welche aufsteht, ist flachgedrückt, rundlich und größer. Der Knorpel ist sehr breit und glänzend. An den Seiten des Schloßes ist beiderseits eine Reihe kleiner spiziger Zähne, die in die Grübchen der entgegen gesetzten Schale einbeissen.

O. IV. 6. Ostrea cucullata.

O. IV. 6. Die Runzelschappe.

Testa inaequivalui plicato rugosa, margine dentato, intus striato; valua maiore cucullata.

Die ungleiche Schale ist gefaltet, und runzlicht, der Rand gezähnt, und inwändig gestreift, die größere Klappe fappenförmig.

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa solida ponderosa, plicis longitudinalibus, rugisque transversis inaequalis. Valuae inaequales; altera cucullata, rudi, apice porrecto, postice longitudinaliter securo; altera minore plana. Margo utriusque obtuse dentatus. Limbus striis distantibus eleuatis geminis. Color extus atro-violaceus.

Die dicke schwere Schale ist der Länge nach mit breiten Falten, und in die Quere mit Runzeln besetzt. Die Klappen sind ungleich, die eine fappenförmig, rauch, mit hervorstechender stumpfen Spitze, die hinten flach abgeschnitten ist; die andere ist kleiner und flach. Der Rand beider Klappen hat stumpfe Zähne. Am Innerrande sind erhabene paarweis stehende Streifen. Die Farbe ist auswändig dunkelviolett.

O. IV.



O. IV. 7. Ostrea Ephem-  
pium.

Ö. IV. 7. Der polni-  
sche Sattel.

*Linn. S. N. Sp.* 215.

*Belg.* Poolische Zadel. *Angl.* Flat Pearl Oyster. *Petiv.* Gall, Selle  
de Pologne.

Testa aequivalui rotundata  
compresso membranacea, car-  
dine transuersim sulcata.

Die rundliche glatt gedrück-  
te häutige Schale hat gleiche  
Klappen, und ein in die Quere  
gefurchtes Schloß.

*List. Hist. Conch. l.* 3. f. 62.

*Rumph. amb. t.* 47. f. B.

*Petiv. amb. t.* 20. f. 4.

*Seb. Thes. t.* 90. f. 10.

*Knor. Vergn. VI.* 21. t. I. f.

*Da Cost. Elem. Pl.* 6. f. 6.

*Müll. Linn. Naturyst. VI.* I. B. 13. t. I. f.

*Mart. Berl. Beschaeft. III.* 7. t. 22. f.

P. Anomia.

P. Die Bastardmu-  
schel.

*Linn. Syst. Nat. Gen.* 314.



Testa inaequivaluis, val-  
ua altera planiuscula, car-  
dinis cicatricula lineari.

Die Schale hat unglei-  
che Klappen, deren eine  
etwas flach ist, und eine  
kleine linienförmige Narbe  
am Schlosse.

P. 1. Anomia Ehip-  
pium.

Linn. S. N. Sp. 218.

Gall. Pelure d'oignon. Argenv.

Testa suborbiculata rugoso  
plicata, valua planiore per-  
forata.

Die rundliche mit Runzeln  
und Falten besetzte Schale hat  
eine flache durchbohrte Klappe.

List. Hist. Conch. l. 3. f. 38.

Argenv. Conch. Pl. 19. f. C.

Ginan. adr. II. t. 27. f. 172.

Müll. Linn. Naturf. VI. 1. B. 12. t. 3. f.

P. 2. Anomia Cepa.

P. 2. Die Zwibelschale.

Linn. S. N. Sp. 219.

Belg. Paarische Bernstein Oester. Gall. Huitre électrique.

Testa subrotunda amethy-  
stina, valua superiore conue-  
xa, inferiore perforata.

Die rundliche Schale ist  
amethystfärbig, ihre obere Klap-  
pe bäuchig, die untere durch-  
bohret.

Knor. Vergn. VI. 9. t. 5. f.

P. 3.

P. 3. *Anomia electrica.*P. 3. Die Bernstein-  
auster.*Linn. S. N. Sp. 220.**Belg.* Bernstein - Oester.  
*Huitre d'ambre jaune.**Angl.* Small Amber Oyster. *Petiv. Gall.*

*Testa subrotunda laevi fla-* Die rundliche glatte gelbe  
*ua, valua altera conuexa* Schale hat eine bänchige hö-  
*gibbosa.* ckerige Klappe.

*Rumph. amb. t. 47. f. L.**Knor. Vergn. V. 25. t. 6. f.*P. 4. *Anomia truncata.*P. 4. Die gestumpfte  
Bastardmuschel.*Linn. S. N. Sp. 229.*

*Testa suborbiculata, obsole-* Die rundliche feingestreifte  
*te striata, cardine truncato,* Schale ist am Schloße abge-  
*limbo denticulato.* stümpft, am inneren Rande  
 aber gezähnt.

*List. angl. l. 9. f. 50.**Mus. Caes. Vindobon.*P. 5. *Anomia caput*  
*serpentis.*P. 5. Der Schlangens-  
kopf.*Linn. S. N. Sp. 236.**Gall. Le scarabée Dar.*





Testa ovata striata, valvae alterius apice longiore perforato, margine crenulato. Die eysförmige gestreifte Schale hat an der einen Klappe eine längere durchbohrte Spitze, und am Rande feine Kerben.

*Colum. purp. p. 22. f. 2.*

*Gualt. Test. t. 96. f. E.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

P. 6. Anomia vitrea.

P. 6. Die Glasbohrmuschel.

*Gall. La Poullete. Dav.*

Testa ovata convexa laevi, valvae alterius apice incurvato pertuso, margine integerrimo. Die eysförmige bäuchige glatte Schale ist an der schnabelförmigen Spitze der einen Klappe durchbohret, und am Rande ganz.

Ob plicarum defectum à Terebratula Linnaei distinguenda.

Sie muß wegen ihrer ungefalteten Oberfläche von der Bohrmuschel des Linne unterschieden werden.

*Argenv. Conch. Suppl. Pl. 3. f. E.*

*Knor. Vergn. IV. 30. t. 4. f.*

*Da Cost. Elem. 6. Pl. 3. f.*





Testa ovata laevis tenuissima, in-  
tar membranac pellucida. Valvae  
convexa convexae absque striis, aut  
plicis. Valva superior ovata, po-  
stice in apicem incurvata promi-  
nentem & pertusum; Foramen  
repletum ligamento filiformi. Val-  
va inferior rotunda, pollice gerens  
callos. Margo tenuis, clausus, in-  
tegerrimus, anticus retusus. Co-  
lor albus.

Die Schale ist eiförmig glatt,  
von der Dünne einer feinen Haut,  
und durchsichtig. Beide Klappen  
sind bündig, ohne Streifen und  
Falten. Die obere ist eiförmig,  
und verlängert sich in eine gekrümm-  
te oder schnabelförmige hervorra-  
gende durchbohrte Spitze, in deren  
Öfnung sich ein fadenförmiges  
Band befindet. Die untere Klappe  
ist rund, und hinten mit zweien  
Schwüllen versehen. Der Rand ist  
dünn, geschlossen, ganz, und vor-  
ne stumpf. Die ganze Schale weiß.

P. 7. Anomia Placenta.

P. 7. Die Fensterscheibe.

Linn. S. N. Sp. 241.

Belg. Transparent. Angl. The chinese pellucid Oyster. Da Cost.  
Gall. Vitre chinoise. Dav.

Testa orbiculata complana-  
ta foliacea, cardinum callis  
linearibus adnatis.

Die scheibenrunde plattge-  
drückte schieferige Schale hat  
am Schlosse zwei wulstartige  
angewachsene Erhöhungen.

„ valvis planis.

„ mit flachen Klappen.

Gualt. Test. t. 104. f. B.

Seb. Thes. t. 90. f. 8, 9.

Knor. Vergn. II. 24. t. I. f.

Da Cost. Elem. 7. Pl. 13. F.



β valuis flexuoso bilobis.

β mit lappenförmig gefaltene  
Klappen.

*Mus. Caes. Vindobon.*

Q. Mytilus.

Q. Die Mießmuschel.

*Linn. Syst. Nat. Gen.* 315.

Testa bivaluis, cardi- Die zweiflappige Scha-  
nis linea excavata, longi- le hat am Schlosse einen  
rudinali, edentula. vertieften langen Streif  
ohne Zahn.

Q. I. Parasitici, unguibus affixi.

Q. I. Ungewachsene mittelstet-  
nes klauenförmigen Fortsatzes.

Q. I. 1. Mytilus Crista  
Galli.

Q. I. 1. Der Hahnen-  
kamm.

*Linn. S. N. Sp.* 243.

Belg. Haanekam. Rumph. Angl. Curry Comb Oyster Pet. Gall.  
Oreille de Cochon. Dan.

Testa angulato plicata, dor- Die eckiggefaltene Schale  
fo limboque punctato scabris, ist auf dem Rücken und an  
valua spinosa parasitica. dem inneren Rande mit erha-  
benen Punkten besetzt, und an  
einer Klappe stachelig und an-  
gewachsen.

Rumph.



*Rumph. amb. t. 47. f. D.*

*Petiv. amb. t. 20. f. 2.*

*Argenv. Conch. Pl. 20. f. D.*

*Gualt. Test. t. 104. f. C.*

*Knor. Verg. IV. 10. t. 3, 5. f.*

—— ——— *V. 16. t. 1. f.*

—— *Delic. nat. I. t. B. IV. f. 8.*

Q. I. 2. *Mytilus Hyotis.*

Q. I. 2. Der Blätter-  
famm.

*Linn. S. N. Sp. 244.*

*Belg. Getakte Haane Kam. Rumph. Angl. Great Finger Oyster.*  
*Pet. Gall Crete de Coq. Dav.*

Testa plicata, transverse rugosa, valvis fornicato spinosis, limbo laevi.

Die gefaltene und der Que-  
re nach runzelichte Schale ist  
auf beiden Klappen mit rin-  
nenförmigen Stacheln besetzt,  
und am inneren Rande glatt.

*Rumph. amb. t. 47. f. C.*

*Petiv. Gaz. t. 20. f. 5.*

*Argenv. Conch. Pl. 20. f. H.*

*Gualt. Test. t. 103.*

*Knor. Vergn. I. 29. t. 2. f.*

Q. I. 3.



Q. I. 3. *Mytilus Frons.*      Q. I. 3. Das Kamm-  
blatt.

*Linn. S. N. Sp. 245,*

*Belg. Gekamd Lauriesblad, Angl. The Hogs Ear Oyster. Hill.*  
*Gall. La Feuille. Dav.*

*Testa angulato plicata, val-* Die eckig gefaltene in die  
*vis transversim rugosis, lim-* Quere gerunzelte Schale ist  
*bo alterius punctato scabro.* am inneren Rande mit erha-  
benen Punkten versehen.

*Argenv. Conch. t. 19. f. D. ?*

*Gualt. Test. t. 104. f. D.*

*Hill. Hist. of. Anim. Pl. 9.*

*Knor. Vergn. IV. 8. t. 3. f.*

Q. II. *Plani subauriti.*

Q. II. Platte, mit unvollkom-  
menen Ohren.

Q. II. 1. *Mytilus mar-*      Q. II. 1. Die Perlmutter-  
*garitiferus.*      ter.

*Linn. S. N. Sp. 246.*

*Belg. Perle moer - Schulp. Rumph. Angl. Pearl Oyster. Pet. Gall.*  
*Mere Perle Dav.*

*Testa compressa rotunda-* Die plattgedrückte rundliche  
*ta subaurita, tunicis membra-* und einigermaßen mit Ohren  
*naceis imbricata, cardine* versehene Schale ist mit ziegel-  
*transversim elongato.* förmigen Blättern bedeckt,  
und mit einem in die Quere  
verlängerten Schloße versehen.





Color tunicarum sordide viridescens, radiis latis albis. Specimen unius valua ponderosa crassa, spithamam diametro excedens, margaritam fouens adnatam praegrandem.

Die Farbe der Blätter ist schmutzgrün, mit breiten weißen Strahlen. Die Klappe eines Stückes ist schwer, dick, im Durchmesser mehr denn eine Spanne lang und enthält eine sehr große angewachsene Perle.

*Bonan. Recr. cl. 2. f. 1.*

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 56, 57, 58.*

*Rumph. amb.. t. 47. f. F.*

*Gualt. Test. t. 84. f. E. F. G.*

*Argenv. Conch. Pl. 20. f. A.*

*Knor. Vergn. II. 25. t. 1. f.*

*Müll. linn. Naturf. VI. 1. B. 13. t. 2, 3. f.*

Q. III. Ventricosusculi.

Q. III. Etwas bäuchige.

Q. III. 1. *Mytilus lithophagus.*

Q. III. 1. Die Steinhornschnecke.

*Linn. S. N. Sp. 248.*

*Belg. Steen Mossel. Angl. Stone Peircer. Pet. Gall. La Datte. Dav.*

Testa subcilindrica, extremitatibus rotundatis, apicibus recuruis.

Die einigermaßen walzenförmige Schale hat rundliche Seitenende, und zurückgebogene Endspitzen.

Epidermis decidua, castanea, saepe transuersim striata.

Die Oberhaut fällt ab, ist von kastaniendrauner Farbe, und öfters in die Quere gestreift.

*List.*





*List. angl. t. 8. f. 37.*

*Bonan. Recr. cl. 2. f. 28.*

*Rumph. amb. t. 46. f. F.*

*Petiv. amb. t. 19. f. 13.*

*Gualt. Test. t. 90. f. D.*

*Argenv. Conch. Pl. 27. f. L.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

Q. III. 2. *Mytilus exustus.*

Q. III. 2. Die geferbte  
Mießmuschel.

*Linn. S. N. Sp. 251.*

Testa ovata, elongata, decussatim striata, limbo crenulato.

Die eysförmige verlängerte Schale ist in die Quere gestreift, und am Rande mit feinen Kerben versehen.

Color extus roseus.

Von rosenfarber Oberflache:

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 206.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

Q. III. 3. *Mytilus edulis.*

Q. III. 3. Die gemeine  
Mießmuschel.

*Linn. S. N. Sp. 253.*

*Belg. Mossel. Gall. Moule. Ital. Muscolo. Gin.*

Testa



Testa ovato trilatera laeui  
violacea, antice carinata,  
apicibus acuminatis, terminali-  
bus bidentatis.

Die eysförmige dreysseitige  
glatte Schale ist von viole-  
ter Farbe, vorne mit ei-  
ner kielförmigen Schneide, und  
an den Endspitzen mit zween  
Zähnen versehen.

α violacea, unicolor.

α violet, einfarbig.

β violacea, radiis rubris.

β violet, mit rothen Strahlen.

*List. angl. l. 4. f. 28.*

— *Hist. Conch. l. 3. f. 200.*

*Bonan. Recr. cl. 2. f. 30.*

*Gualt. Test. t. 91. f. E.*

*Ginan. adr. II. t. 23. f. 168.*

*Memoir. de Paris. 1711. t. 3. f. 4, 5.*

*Bast. Subs. t. 11. f. 11.*

*Regenf. Samml. I. 12. t. 71. 72. f.*

*Knor. Vergn. IV. 15. t. 1. f.*

Q. III. 4. *Mytilus pi-*  
*ctus.*

Q. III. 4. Die gefärbte  
Mießmuschel.

*Gall. Moule arborifée. Dav.*

Testa ovata trilatera, grisea,  
laeui, antice carinata, apici-  
bus acuminatis terminalibus,  
bidentatis.

Die eysförmige, dreysseitige,  
lichtgraue glatte Schale ist vor-  
ne mit einem kielförmigen Ran-  
de, und an den Endspitzen mit  
zween Zähnen versehen.

α grisea



α grisea, unicolor.

α lichtgrau, einfärbig.

*Mus. Caes. Vindobon.*

β grisea, lineis angulatis rufis.

β lichtgrau, mit rothbraunen Winkelzügen.

*Mus. Caes. Vindobon.*

γ ex luteo virens, maculis laete viridibus, lineis angulatis rufis.

γ gelblich grün, mit hellgrünen Flecken, und rothbraunen Winkelzügen.

*Knor. Vergn. IV. 15. 1. 5. f.*

Testa ovato elongata laevis, antice carinata, postice complanata hians, ideoque trilatera, Apices terminales acuminati, dentibus duobus acutis validis, mutuo insertis, extus conspicuis. Cavitas variegante nitore replendens. Priori similis, qua tamen gracilior, colore insuper dentiumque structura praecipue distinguitur.

Die eiförmige verlängerte glatte Schale ist vorne keilförmig erhoben, hinten flachgedrückt klappend, und daher dreiseitig. Die Spitzen stehen an einem verdünnten Ende, wo sich zwei starke spitzige von außen sichtbare Zähne befinden. Die Höhlung hat einen bunten Glanz. Diese Art ist der vorigen ähnlich, aber schwächer, und weicht davon durch die Verschiedenheit der Farbe und der Zähne vorzüglich ab.

Q. III. 5. *Mytilus unguicularis*.

Q. III. 5. Die Klauenmuschel.

*Linn. S. N. Sp. 254.*

Belg.



Belg. De breede purpuragtige Mossel.

Testa ouato elongata laevi, valuis conuexis postice incuruatis, extremitatibus attenuatis, denticulatis. Die eysförmige verlängerte glatte Schale hat bäuchige hinten eingebogene Klappen; und zugespitzte gezähnelte Ende.

List. Hist. Conch. l. 3. f. 201.

Gualt. Test. t. 91. f. E.

Regenf. Samml. I. 4. t. 47. f.

Q. III. 6. Mytilus bidens.

Q. III. 6. Die geribbte Miesmuschel.

Linn. S. N. Sp. 255.

Angl. Deep furrowed Cape Muscle, Petiv. Gall. Gueule de Souris. Dav.

Testa ouato elongata, longitudinaliter sulcata, apicibus terminalibus dentatis. Die eysförmige verlängerte nach der Länge gefurchte Schale hat gezähnelte Endespitzen.

Petiv. Gaz. t. 57. f. 9.

Knor. Vergn. IV. 30. t. 3. f.

Q. III. 7. Mytilus Modiolus.

Q. III. 7. Die Papusmuschel.

Linn. S. N. Sp. 256.



*Belg.* Zand Mossel. *Angl.* The Caroline Muscle *Hill.* Gall. Moule de la terre des Papous. *Dav.*

Testa ovato elongata lacui, Die eyrunde verlängerte pollice coarctata, hiantē, apiglabte Schale ist hinten eingedrück und klafend, mit zurückgebogenen nahe am Ende stehenden Spizen. *cibus recurvis, subterminalibus.*

*α* margine cardinali obtuso.

*α* mit stumpfem Schloßrande.

*β* margine cardinali excurrente, seu *β* mit auslaufendem, oder, vorne antrorsum angulato. zu, eckigem Schloßrande.

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 198.*

*Petiv. Gaz. t. 71. f. 11.*

— *amboin. t. 19. f. 16.*

*Rumph. amb. t. 46. f. B.*

*Gualt. Test. t. 91. f. H.*

*Argenv. Conch. Pl. 22. f. C.*

*Hill. Hist. of. Anim. Pl. 9.*

*Adans. Seneg. Pl. 15. f. 1.*

*Knor. Vergn. IV. 15. t. 3. f.*

Q. III. 8. *Mytilus Hirundo.*

Q. III. 8. Die Vogel-  
muschel.

*Linn. S. N. Sp. 261.*

*Belg.* Vogelcje. *Angl.* Flying Muscle. *Petiv. Gall.* L'hirondelle. *Dav.*

Testa





Testa complanata laeui, Die plattgedrückte glatte  
 valuis basi transuersa bilobis, Schale ist an dem nach der  
 lobo altero elongato, Quere stehenden Schloßrande  
 mit zween Flügeln versehen,  
 deren einer verlängert ist.

« callanea, fuscoque radiata,

« kastanienfärbig, mit braunen  
 Strahlen.

β viridis, radiis obsoletis ferrugi- β grün, mit matten eisenrothigen  
 neis. Strahlen.

*Bonan. Recr. cl. 2. f. 58.*

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 55.*

*Rumph. amb. t. 46. f. G.*

*Petiv. amb. t. 19. f. 9.*

*Argenv. Conch. Pl. 19. f. B.*

*Gualt. Test. t. 94. f. A. B.*

*Knor. Vergn. IV. 8. t. 5. f.*

—— ——— *V. 10. t. 1, 2. f.*

—— ——— *Del. nat. I. t. B. IV. f. 7.*

R. Pinna.

R. Die Steckmuschel.

*Linn. Syst. Nat. Gen. 316.*

Testa bivaluis, valuis Die Schale hat zwei  
 coalitis, cardine edentu- aneinander verwachsene  
 lo. Klappen, und am Schloß  
 se keine Zähne.



R. 1. *Pinna pectinata*. R. 1. Der geräucherte  
Schinken.

*Linn. S. N. Sp. 264.*

Testa fastigiata grisea gla- Die graue Schale ist zus-  
bra, obtuse sulcata, squamis gespitzt, glatt, mit stumpfen  
fornicatis cylindricis. Furchen, und hohlen zylindris-  
schen Schuppen besetzt.

*Gualt. Test. t. 79. f. A.*

*Seb. Thes. III. t. 91. f. 3.*

*Knor. Vergn. II. 26. t. 1. f.*

— *Delic. nat. I. t. B. V. f. 3.*

R. 2. *Pinna nobilis*. R. 2. Der edle Schin-  
ken.

*Linn. S. N. Sp. 265.*

Testa fastigiata sulcata ru- Die zugespitzte gefurchte röth-  
bicunda, squamis canalicula- liche Schale hat hohle rinnens-  
to tubulosis. artige Schuppen.

*Bonan. Recr. cl. 2. f. 24.*

*Argenv. Conch. Pl. 21. f. B.*

*Adans. Seneg. Pl. 15. f. 5.*

*Knor. Vergn. II. 26. t. 2. f.*

R. 3.



R. 3. Pinna muricata. R. 3. Die gedornete  
Stechmuschel.

*Linn. S. N. Sp.* 266.

*Belg.* Gedoord Hammetje. *Angl.* Prickley Ham Muscle *Petr.* Gall.  
*Jamboneau* épineux.

Testa striata albida, squa- Die gefurchte weißliche Scha-  
mis fornicatis, approximatis, le hat hohle, dünne, gedrängt  
acutis. stehende Schüppchen.

*List. Hist. Conch. l. 3. f.* 215.

*Rumph. amb. t. 46. f. M.*

*Petr. amb. t. 19. f. 14.*

*Gualt. Test. t. 79. f. D.*

*Knor. Vergn. VI. 20. t. I. f.*

R. 4. Pinna incurvata. R. 4. Der lange Schin-  
fen.

Testa fastigiata, ovata, squa- Die eysförmige zugespizte  
mis fornicatis breuibus, ex- Schale ist mit kurzen hohlen  
tremite altera rotundata. Schuppen besetzt, und an ei-  
nem Ende rundlich.

*Seb. Thes. t. 91. f. I.*

*Gualt. Test. t. 80.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa ovata elongata grandis, ex- Die Schale ist eysförmig verlän-  
tremite una attenuata, altera gert, an einem Ende zugespizet, am  
rotundata, Valvae convexae super- andern rundlich, von beträchtlicher  
ficies externa vix manifeste striata, Größe. Die Klappen sind gewölbet  
testa squamulis fornicatis breuibus die äußere Oberfläche kaum merk-  
approximatis. Color praesertim ca- lich gestreift, und mit gedrängten  
H 2



nitatis carneus, Apices intus saepe margaritacei.

kurzen hohlen Schälppchen besetzt. Die Farbe besonders der Höhlung ist fleischroth. Die Spitzen haben inwendig oft einen Perlmutterglanz.

### R. 5. Pinna Vexillum.

### R. 5. Die Fahne.


Testa fastigiato triangulaeui, margine postico excurrente lobiformi.

Die zugespitzte dreneckige glatte Schale hat einen lappenförmig ausgebreiteten Vorder- und.

### *Mus. Caes. Vindobon.*

Testa fastigiata, convexa, crassa, laevis. Valvae triangulae, extremitate una attenuata, opposita obtusa, lata; Margo posticus curvilineus, supra excurrente lobiformis. Color fuscus.

Die Schale ist zugespitzt, bündig, dick und glatt. Die Klappen sind dreneckig, das eine End zugespitzt, das andre stumpf und breit. Der Hinterand ist krummlinig, und oben zu lappenförmig ausgebreitet. Von brauner Farbe.





# Ordo tertius. Dritte Ordnung.

## Univaluia.

## Einschalige.

### A. Argonauta.

### A. Der Segler.

*Linn. Syst. Nat. Gen. 317.*

Testa unilocularis, cymbiformis, membranacea, spira inuoluta.

Die einkammerige, nachschalenförmige, dünne Schale hat einen eingerollten Schürkel.

### A. 1. Argonauta Argo.

### A. 1. Der papierne Segler.

*Linn. S. N. Sp. 271.*

*Belg. Docke huitien. Rumph. Angl. The paper Nautilus. Hill. Gall. Nautila papyracé. Argenv. Ital. Polpo Moscardino.*

Testa compressa, carina nodulosa.

Die zusammengedrückte Schale hat einen knotigen Kiel.

α carina tenui, testae rugis bifurcatis.

α mit schmalem Kieler und gabelförmigen Runzeln.

*Belg. Docke - huisje Rumph. Angl. The great brittle Saylor, Petiv. Gall. Nautila papyracé à carene retrecie Ital. Moscarolo. Bonan. Germ. Der schmalstielige Seegler.*





- List. Hist. Conch. l. 4. s. 4. f. 7.*  
*Rumph. amb. t. 18. f. A.*  
*Petiv. amb. t. 10. f. 1.*  
*Gualt. Test. t. 11. f. A. B. t. 12. f. A.*  
*Klein. Meth. Ostr. t. 1. f. 3.*  
*Seb. Tbes. III. t. 84. f. 5, 7.*  
*Gev. Belust. 2. t. 4, 5. f.*  
*Argenv. Conch. Pl. 5. f. A.*  
 ——— Zoom. Pl. 2. f. 2.  
*Hill. Hist. of. Anim. 7. Pl.*  
*Knor. Vergn. I. 2. t. 1. f.*  
 ——— ——— VI. 31. t.  
 ——— Delic. nat. I. t. B. I. f. 3.  
*Mart. Konch. Kab. I. 17. t. 157 f.*  
*Da Cost. Elem. Pl. 3. f. 6.*

2 carina lata, obtuse serrata, cos-  $\beta$  mit breitem Riele und von eins  
 tis rarioribus. ander entfernten Ribben.

2 Belg. Breedkielde papiere Nautilus. Angl. The Course brittle Saye-  
 lor. Petiv. Gall. Nautilie papyracé a large carene.

- List. Hist. Conch. l. 4. f. s. 4. f. 6.*  
*Rumph. amb. t. 18. f. B.*  
*Petiv. amb. t. 10. f. 2. t. 22. f. 10.*  
*Gualt. Test. t. 12. f. C.*  
*Gev. Belust. 2. t. 6, 7. f.*



*Argenv. Conch. Pl. 5. f. B.*

*Seb. Thes. III. t. 84. f. 9 — 12.*

*Knor. Vergn. I. 2. t. 2. f.*

— *Del. nat. I. t. B. 1. f. 4.*

*Mart. Konch. Kab. I. 17. t. 158, 159. f.*

*Murray. Fund. Testac. t. 1. f. 8.*

## B. Nautilus.

## B. Die Kammer Schnecke.

*Linn. Syst. Nat. Gen. 318.*

Testa polythalamia, dissepimentis siphone communicante perforatis.

Die Scheidewände der vielkammerigen Schale sind mit einer gemeinschaftlichen Röhre durchbohret.

B. 1. Nautilus Pompi-  
lius.

B. 1. Der dicke Schif-  
boot.

*Linn. S. N. Sp. 273.*

*Belg. Parl - Slakke ; Rumph. Angl. Thick Sail - Shell. Gall. Nau-  
tile à cloisons. Argenv.*

Testa subrotunda compressa, apertura cordata, anfractibus obtectis, inuolutis, laevis.

Die rundliche zusammenge-  
drückte Schale hat eine herz-  
förmige Mündung und verbor-  
gene, eingerollte, glatte Win-  
dungen.



*Bonan. Recr. cl. 1. f. 1, 2.*

*List. Hist. Conch. l. 4. s. 4. f. 3, 4.*

*Rumph. amb. t. 17. f. A.*

*Valent. Abb. 1. t. 4. f.*

*Petiv. Gaz. t. 99. f. 9.*

— amb. t. 3. f. 7.

*Gualt. Test. t. 17. f. A, B.*

*Argenv. Conch. Pl. 5. f. E.*

*Klein. Meth. Ostr. t. 1. f. 1, 2.*

*Knor. Vergn. I. 1. t. 1. f. 2. t. 3. f.*

*Mart. Konch. Kab. I. 18. t. 164. f.*

— — — — 19. t. 165, 166, 167. f.

*Da Cost. Elem. Pl. 2. f. 16.*

B. 2. Nautilus Spirula.

B. 2. Das Posthorn.

*Linn. S. N. Sp. 279.*

*Belg. Posthoortje Rumph, Angl. The Rams Horn. Da Cost. Gall*  
*Corne d'Ammon.*

Testa inuoluta, tereti, an- Die eingerollte walzenförmige  
fractibus conspicuis, apertu- Schale hat sichtbare Win-  
ra orbiculari. dungen, und eine runde Mün-  
dung.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 4. f. 2.*

*Bonan. Mus. Kirch. cl. 1. f. 39.*

*Rumph.*



*Rumph. amb. t. 20. f. 1.*

*Petiv. amb. t. 22. f. 4.*

*Gualt. Test. t. 19. f. E.*

*Spannerd. Bibl. nat. I, 7. t. 7. 8. f.*

*Gev. Belust. 3. t. 8. f. a. b.*

*Knor. Vergn. I, 2. t. 6. f.*

*Mart. Konch. Kab. I. 20. t. 184. 185. f.*

*Da Cost. Elem. Pl. 2. f. 19.*

## C. Conus.

## C. Die Tutschnecke.

*Linn. Syst. Nat. Gen. 319.*

Testa conuoluta turbinata; apertura longitudinalis edentula; columella laevis.

Die zusammengerollte tutenförmige Schale hat eine nach der Länge herablaufende Mündung, ohne Zähne, und eine glatte Spindel.

C. I. Spira planiuscula.

C. I. Mit einem flachen Wirbel.

C. I. 1. Conus marmoreus.

C. I. 1. Die Herztute.

*Linn. S. N. Sp. 290.*

Testa



Testa conica, maculis sub-  
cordatis albis; spirae anfra-  
ctibus canaliculatis.

Die kegelförmige Schale hat  
herzförmige weiße flecken, und  
rinnenförmig ausgekehrte Wir-  
belgewinde.

$\alpha$  nigrescens, maculis aggregatis.

$\alpha$  schwärzlich, mit nahe aneinander  
stehenden Flecken,

Belg. Hart-Toot. Rumph. Angl. Tyger-Shell Hill. Gall. Tigre  
noir. Argenv.

List. Hist. Conch. l. 4. s. 10. p. 2. f. 39.

Rumph. amb. t. 32. f. N.

Petiv. Gaz. t. 47. f. 11.

Valent. Abb. t. 3. f. 25. t. 7. f. 65. A.

Gualt. Test. t. 22. f. D.

Seb. Thes. III. t. 46. f. 1 — 4. 13 — 19.  
— — — t. 47. f. 1. t. 55. f. 23.

Adans. Seneg. Pl. 6. f. 1.

Hill. Hist. of. Anim. Pl. 7.

Regenf. Samml. I. 5. t. 53. f.

Mart. Konch. Kab. II. 62. t. 685. f.

$\beta$  testa rufa, maculis aggregatis.

$\beta$  rothbraun, mit nahe aneinander  
stehenden Flecken.

Belg. Root-Hart-Toot. Gall. Leopard rouge. Argenv.

Bonan. Recr. cl. 3. f. 123.

Rumph. amb. t. 32. f. 1.

Valent.





*Valent. Abb. t. 5. f. 43.*

*Seb. Thes. III. t. 42. f. 2. 4.*

*Argenv. Conch. Pl. 12. f. 0.*

*Knor. Vergn. I. 15. t. 2. f.*

—— ——— IV. 17. I. f.

*Mart. Konch. Kab. II. 62. t. 686. f.*

✓ testa nigra , maculis rarioribus.    ✓ schwarz , mit etwas zerstreuten  
Flecken.

*Belg. Schout by Nagt. Gall. Contre Ammiral*

*Valent. Abb. t. 2. f. 10. t. 5. f. 44.*

*Seb. Thes. III. t. 46. f. 5 — 12. t. 47. f. 5. 6.*

*Knor. Vergn. I. 7. t. 4. f.*

*Mart. Konch. Kab. II. 62. t. 687. 688. f.*

C. I. 2. *Conus imperialis.*

C. I. 2. Die Kroutute.

*Linn. S. N. Sp. 291.*

*Belg. Kroon - Horn. Rumph. Angl. Crown - Stamper. Petiv. Gall.  
Couronne imperiale Argenv.*

Testa conica alba , fasciis  
ochraceis , lineisque articula-  
tis transuersis,

Die kegelförmige weiße  
Schale hat ochergelbe Bänder,  
und liniensförmige unterbroche-  
ne Quergürteln.

Spi-



*Spirae anfractus coronati.*

Die Wirbelgewinde sind mit Knoten gefrbnet.

*Rumph. amb. t. 34. f. II.*

*Petiv. amb. t. 7. f. 6.*

*Gualt. Test. t. 22. f. A.*

*Seb. Thes. III. t. 47. f. 18 — 20.*

*Argenv. Conch. Pl. II. f. F.*

*Knor. Vergn. II. II. t. 2. f.*

*Mart. Konch. Kab. II. 62. t. 690. 691. f.*

C. I. 3. *Conus fusca-*  
*tus,*

C. I. 3. Die schwarz-  
braune Kroutute.

*Belg. Tuccete Kron-hoorn. Angl. Blaauw's Stamper. Pet.*

*Testa alba fusco maculata,* Die weiße und braungestect.  
*lineis transversis obscurioribus* te Schale hat linienförmige  
*interruptis.* unterbrochene schwarzbraune  
Gürteln.

*Rumph. amb. t. 34. f. 7.*

*Petiv. amb. t. 15. f. 17.*

*Klein Meth. Ostr. t. 4. f. 84.*

*Seb. Thes. III. t. 3. f. 35.*

*Argenv. Conch. Pl. 12. f. E.*

*Regenf. Samml. I. 3. t. 35. f.*

*Mart. Konch. Kab. II. 62. t. 692. 693. f.*



Testa obuerse conica fusca, maculis longitudinalibus confluentibus albis. Cingula tenuia transversa, atrofusca, interdum albo articulata. Spira planiuscula. Antractus dentibus coronati. Mucro centralis prominulus.

Die Schale ist verkehrt kegelförmig, von brauner Farbe. Nach ihrer Länge herab, laufen zusammenfließende weiße Flecken. Die linienförmigen schwarzbraunen Gürteln sind manchmal weiß gegliedert. Der Wirbel ist etwas flach. Die Gewinde sind mit knotigen Kronen besetzt. Die Wirbelspitze ragt in der Mitte hervor.

C. I. 4. Conus litteratus.

C. I. 4. Die Tigertute.

Linn. S. N. Sp. 292.

Belg. Letter-Hoorn. Rumph. Angl. Horn - Book - Stamper. Pet. Gall. Damier. Dav.

Testa conica alba, maculis quadratis, seriatim digestis.

Die kegelförmige weiße Schale ist mit würflichten Flecken reiheweise besetzt.

Bonan. Recr. el. 3. f. 363.

List. Hist. Conch. l. 4. 5. 10. p. 2. f. 20.

Rumph. amb. t. 31. f. D.

Petiv. Gaz. t. 41. f. D.

— amb. t. 2. f. 5.

Gualt. Test. t. 21. f. O.

Argenv. Conch. Pl. 12. f. 1.



*Seb. Tbes. III. t. 45. f. 1. — 5.*

*Regenf. I. 3. t. 29. f.*

*Knor. Vergn. I. 16. t. 3. f.*

—— ——— *III. 3. t. 2. f.*

—— ——— *IV. 26. t. 1. f.*

—— *Delic nat. I. t. B. III. 4. f.*

*Mart. Konch. Kab. II. 60. t. 666 — 669. f.*

*Da Cost. Elem. Pl. 5. f. 9.*

α punctis fuscis subaequalibus; absque fascia transuersa.

α mit beinahe gleichgroßen braunen Punkten, ohne Querband.

β punctis fuscis subaequalibus, absque fascia transuersa, spira nodoso coronata.

β mit beinahe gleichgroßen braunen Punkten ohne Querband, und gekrönter Wirbelspitze,

γ punctis fuscis confertis, fascia gemina flaua.

γ mit gedrängt stehenden braunen Punkten und gedoppelten gelben Bänder.

δ punctis fuscis distinctis. fasciis tribus flauescentibus.

δ mit zerstreuten braunen Punkten, und drey gelblichen Bändern.

ε maculis quadratis fuscis, fasciisque tribus transuersis latis.

ε mit würflichten braunen Flecken, und drey breiten Querbändern.

ζ maculis punctisque confluentibus fulvis.

ζ mit zusammenfließenden rothgelben Flecken, und Punkten.

C. I. 5. *Conus generalis*.C. I. 5. Das Klöppel-  
füßen.*Linn. S. N. Sp.* 293.*Belg.* Speeldewerk Kuffen. *Rumph.* *Angl.* Net-listed - Stamper  
*Petiv.* Gall, La Flamboyante *Argenv.**Testa conica ferruginea, fasciis tribus interruptis albis, anfractibus canaliculatis.*Die kegelförmige rostfar-  
bige Schale hat drey weiße un-  
terbrochene Bänder, und aus-  
gekehlte Wirbelgewinde.*List.* *Hist. Conch.* l. 4. s. 10. p. 2. f. 34.*Petiv.* *Gaz.* I, t. 27. f. 11.— *amb.* t. 3. f. 9.*Rumph.* *amb.* t. 33. f. 1.*Gualt.* *Fest.* t. 20. f. G.*Seb.* *Tbes.* III. t. 54. f. 11 — 13.*Argenv.* *Conch. Pl.* 12. f. T.*Regenf.* *Samml.* I. 6. t. 65. f.*Knor.* *Vergn.* III. 17. t. 4, 5. f. 18. t. 3, 4. f.*Mart.* *Konch. Kab.* II. 58. t. 648 — 652. f.*Da Cost.* *Elem.* Pl. 5. F. 8. $\alpha$  fasciis fuscis. $\alpha$  mit braunen Bändern. $\beta$  fasciis fulvis. $\beta$  mit rothgelben Bändern.





C. I. 6. *Conus candi-*  
dus.

C. I. 6. Die weiße Kron-  
tute.

Testa conica glabra alba,  
spirae anfractibus coronatis,

Die kegelförmige glatte weiß-  
se Schale hat gekrönte Wirbel-  
gewinde.

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa conica solida niua; Ven-  
ter convexiusculus; Apex centra-  
lis prominulus, decorticatus, ame-  
thylinus.

Die kegelförmige dicke Schale  
ist weiß, einigermassen bündig. Die  
abgenützte in der Mitte hervor-  
ragende Wirbelspitze ist amethystfarbig.

C. I. 7. *Conus Virgo.*

C. I. 7. Die Mennoni-  
tentute.

*Linn. S. N. Sp. 294.*

*Belg. Mennonist Toot. Rumph. Angl. Wax - Ramper. Petiv. Gall.*  
*Bout de Chandelle. Dav.*

Testa conica pallida, trans-  
versim rugoso striata, basi  
violacea.

Die kegelförmige weißliche,  
der Quere nach runzelicht ge-  
streifte Schale hat eine violette  
Grundspitze.

*List. Hist. Conch. l. 4. s. 10. p. 2. f. 3.*

*Rumph. amb. t. 31. f. E.*

*Petiv. amb. t. 8. f. 9.*

*Gualt. Test. t. 20. f. B.*

*Seb.*



*Seb. Tbes. III. t. 47. f. 8, 9.*

*Knor. Vergn. III. 22. t. 1. f.*

*Mart. Konch. Konch II. 53. t. 585. f.*

C. I. 8. *Conus tessulatus.* C. I. 8. Der Estrich.

*Belg. Italienische Vloerken. Angl. The italien Parement. Gall. Nappe d'Italie.*

Testa conica alba, maculis oblongis cinnabarinis; basi sulcata, amethystina.

Die kegelförmige weiße Schale hat langwürflichte zinnoberrothe Flecken und eine gefurchte amethystfarbige Grundspitze,

*List. Hist. Conch. l. 4. s. 10. p. 2. f. 17.*

*Valent. Abh. 6. t. 52. f.*

*Gualt. Test. t. 21. f. H.*

*Seb. Tbes. III. t. 55. f. 4 — 9.*

*Regenf. Samml. I. 8. t. 19. f.*

*Knor. Vergn. II. 12. t. 3. f.*

*Mart. Konch. Kab. II. 59. t. 653. f.*

An præcedentis varietas?

Vielleicht eine Abänderung des vorhergehenden Art.

C. I. 9. *Conus Capita- neus.* C. I. 9. Die Käsetute.

*Linn. S. N. Sp. 295.*

I 2

*Belg.*



Belg. Groene Kaas Rumph. Angl. Green Stamper. Pet. Gall. L'Hermine Dav.

Testa conica glabra, fasciis      Die kegelförmige glatte  
duabus albis fusco maculatis.      Schale hat zwey braun gefleckte Querbänder.

List. Hist. Conch. l. 4. s. 10. p. 2. f. 27.

Rumph. amb. t. 33. f. X.

Petiv. amb. t. 9. f. 11.

Gualt. Test. t. 22. f. M.

Seb. Thes. III. t. 22. f. 26, 27, 30, 31, 33.

Argenv. Conch. Pl. 12. f. K.

Regenf. Samml. I. 7. t. 7. f.

Knor. Verg. I. 15. t. 3. f.

—— — V. 16. t. 2. f.

Mart. Konch. Kab. II. 59. t. 660-662. f.

α olivacea.

α olivengrün.

β rufa.

β rothbraun.

C. I. 10. Conus miles.      C. I. 10. Die Zwirntute.

Linn. S. N. Sp. 296.

Belg. Arakans - Garen. Rumph. Angl. Garter Stamper. Petiv. Gall. Le Nauet. Argenv.

Testa conica albida, fasciis      Die kegelförmige weiße  
duabus transuersis fuscis.      Schale hat zwey braune Querbänder.

List.



*List. Hist. Conch. l. 4. s. 10. p. 2. f. 34.*

*Rumph. amb. t. 33. f. W.*

*Petiv. amb. t. 8. f. 1.*

*Gualt. Test. t. 20. f. N.*

*Seb. Thes. III. t. 42. f. 23, 25.*

*Argenv. Conch. Pl. 12. f. L.*

*Knor. Vergn. I. 15. t. 4. f.*

—— ——— III. I. t. 2. f.

*Mart. Konch. Kab. II. 59. t. 663. 664. f.*

## C. I. II. Conus Centurio.

## C. I. II. Der Orangen- Fegel.

Testa conica, basi attenuata transuersim fulcata, anfractibus canaliculatis.

Die Fegelförmige Schale ist au dem zugespitzten Grunde in die Quere gefurchet, und an den Gewinden ausgekehlet.

## Mus. Caes. Vindobon.

Testa conica, laevis; Basis attenuata, fulcis transuersis. Spira planiuscula. Anfractus contigui, canaliculati. Vertex obtusus centralis. Color aurantius. Fasciae duae transuersae albae, lineis aurantiis angulatis oblique transcurrentibus.

Die Schale ist Fegelförmig und glatt. Der Grund zugespitzt, und in die Quere gefurchet. Der Schnitzel flach. Die Gewinde berühren einander, und sind rinnenförmig ausgekehlet. Der stumpfe Wirbel steht in der Mitte. Die Farbe ist orangengelb. Zwey breite Querbänder sind mit schiefen orangenfarbigen eckigen Linien durchzogen.



C. II. Spira pyramidata.

C II. Mit einem pyramidenförmigen Wirbel.

C. II. 1. Conus Princeps.

C. II. 1. Die Bastardbauernmusik.

Linn. S. N. Sp. 297.

Belg. Bastert Tygers Katje. Gall. La fausse Hebraïque. Dav.

Testa turbinata fusco nigra, Die spizwirblige Schale ist  
lineis longitudinalibus, fle- braunschwarz, und mit blassen  
xuosis, pallidis. gekrümmten Strichen nach der  
Länge herab besetzt.

List. Hist. Conch. l. 4. s. 10. p. 2. f. 26.

Valent. Abb. II. t. 94. f.

Gualt. Test. t. 25. f. Q.

Argenv. Conch. Pl. 12. f. B.

Seb. Thes. III. t. 47. f. 30, 31.

Knor. Vergn. III. 4. t. 2. f.

Mart. Konch. Kab. II. 63. t. 699. 700. f.

C. II. 2. Conus Ammiralis.

C. II. 2. Die Admiraltute.

Linn. S. N. Sp. 298.

Belg. Opper-Admiral. Angl. Burg's-stamper. Petiv. Gall. Le grand Admiral. Argenv.

Testa





Testa fulva, maculis dispersis albis, fasciisque transuersis reticulatis,

Die rothbraune Schale ist mit zerstreuten Flecken besetzt, und mit nezförmigen Querbändern umgeben.

α fasciis transuersis tribus, secunda cingulo articulado bifariam diuisa.

α mit drey Querbändern, davon das zweyte durch einen gegliederten Gürtel abgetheilet ist.

Rumph. amb. t. 34. f. B.

Petiv. amb. t. 14. f. 18.

Argenv. Conch Pl. 12. f. N.

Adans. Seneg. Pl. 6. f. 4.

Seb. Thes. III. t. 48. f. 5, 6.

Knor. Vergn. I. 8. t. 2. f.

— Delic. nat. I. t. B. V. f. 6.

β fasciis quatuor, secunda obsoleta tenui, tertia cingulo articulado bifariam diuisa.

β mit vier Bändern, davon das zweyte unvollkommen und schmal, das dritte durch einen gegliederten Gürtel abgetheilet wird.

γ fasciis quatuor, secunda obsoleta tenui, tertia lata, cingulis articulatis duobus trifariam partita.

γ mit vier Bändern, davon das zweyte unvollkommen und schmal ist, das dritte breite oder durch zwey gegliederte Gürteln dreymal abgetheilet wird.

Petiv. amb. t. 15. f. II.

Argenv. Suppl. Pl. I. f. P.

Seb. Thes. III. t. 48. f. 4, 6.

Mus. Caes. Vindobon.



C. II. 3. *Conus Senator*.

C. II. 3. Die Schild-  
krötentute.

*Linn. S. N. Sp. 300?*

*Belg. Schildpad - Toot. Gall. Ecaile de tortue.*

*Testa ovata nebulosa laevi,* Die eysförmige nebelichte  
*transuersum articulato striata,* glatte Schale ist mit unterbro-  
chenen Querstreifen umgeben.

*Seb. Thes. III. t. 43. f. 29, 36.*

*Knor. Vergn. VI. I. t. 5. f.*

*Mart. Konch. Kab. II. 55. t. 609 — 611. f.*

C. II. 4. *Conus genuanus.*

C. II. 4. Die guineische  
Tute.

*Linn. S. N. Sp. 302.*

*Belg. Geneefche Toot. Gall. Aile de papillon. Argeny.*

*Testa pallido rubra, cingu-* Die blaßrothe Schale ist  
*lis albo fuscoque articulatis.* mit weiß und braun unterbro-  
chenen Bändern umgeben.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 337.*

*List. Hist. Conch. v. 4. s. 10. p. 2. f. 16.*

*Rumph. amb. t. 34. f. G.*

*Argeny.*



*Argenv. Conch. Pl. 12. f. V.*

*Seb. Thes. III. t. 48. f. 1 — 3.*

*Knor. Vergn. III. 1. t. 1. f.*

*Mart. Konch. Kab. II. 56. t. 623 — 625.*

C. II. 5. Conus Mo-      C. II. 5. Der Mönch.  
nachus.

*Linn. S. N. Sp. 304.*

*Belg. Graeuve Munniker. Rumph. Angl. Gray Monk. Petiv.*

Testa laeui fusca, albo &      Die glatte braune, weiß  
coerulefcente nebulata, basi und hellblau wolfigte Schale  
transuerse sulcata.      hat eine in die Quere gefurchte  
Grundspize.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 126.*

*Rumph. amb. t. 33. f. CC.*

*Petiv. amb. t. 15. f. 7.*

*Valent. Abb. 9. t. 74. f.*

*Seb. Thes. III. t. 48. f. 45.*

*Regenf. Samml. I. 12. t. 68. f.*

*Knor. Vergn. III. 16. t. 2. f.*

— — — V. 18. t. 4. f.

*Mart. Konch. Kab. II. 55. t. 614. f.*



C. II. 6. *Conus minimus*.

C. II. 6. Der graue  
Mönch.

*Linn. S. N. Sp. 305.*

*Gall. La minime, Dav.*

Testa ovato oblonga, glauco albidoque nebulosa, lineis fuscis interruptis cincta. Die eysförmige längliche blau-licht graue Schale hat weisse Wolken und braune unterbrochene Querstreife.

Variat etiam spira coronata.

Es giebt auch eine Abänderung mit gekröntem Wirbel.

*Valent. Abb. 3. t. 24. f.*

*Argenv. Conch. Pl. 12. f. A.*

*Knor. Vergn. III. 27. t. 2. f.*

C. II. 7. *Conus Mercator*.

C. II. 7. Die bandirte  
Netztute.

*Linn. S. N. Sp. 307.*

*Belg. Net - Tootje.*

Testa ovata alba, fasciis latis reticulatis fulvis.

Die eysförmige weisse Schale hat breite eysförmige rothgelbe Bänder.

*List. Hist. Conch. l. 4. s. 10. p. 2. f. 41.*

*Valent. Abb. 7. t. 65. B. f.*

*Argenv.*



*Argenv. Conch. Pl. 12, f. P.*

*Adans. Seneg. t. 6, f. 3.*

*Knor. Vergn. II. 1. t. 4. f.*

*Mart. Konch. Kab. II. 56, t. 620, f.*

C. II. 8. *Conus reticulatus.*

C. II. 8. Das Fische-  
netz.

*Gall. Drap à réseau.*

Testa ovato oblonga niuea,  
undique fulvo reticulata.

Die eysförmige längliche  
weiße Schale ist allenthalben  
mit einem rothbraunen Netze  
überzogen.

*Mart. Konch. Kab. II. 56, t. 621, f.*

Testa ovata, pyriformis, gla-  
berrima niuea, filis reticulatis ful-  
vis intertexta, areolis lanceolatis,  
transuersis. Basis attenuata trans-  
uersim sulcata. Spira pyramidata  
laevis, anfractibus contiguus. Ver-  
tex centralis acuminatus.

Die enlange birnförmige Schale  
ist glatt, schneeweiß, mit roth-  
braunen netzförmigen Fäden bema-  
let, deren Zwischenflächen länglich,  
und in die Quere gestellet sind.  
Der Schnirkel ist pyramidenförmig  
und glatt, die Gewinde aneinander  
verwachsen. Der Wirbel raget aus  
der Mitte spizig hervor.

An prioris Varietas?

Etwan eine Abänderung der vo-  
rigen Art?

C. II. 9. *Conus betuli-  
nus.*

C. II. 9. Die gelbe But-  
terwecke.

*Linn.*





*Linn. S. N. Sp. 308.*

*Belg.* Boterweg. *Rumph. Angl.* Great yellow Leopard Stamper.  
*Pet. Gall.* Pelote de beurre. *Dav.*

Testa turbinata laeui, maculis fuscis per series cincta, basi rugosa.

Die spizwirblige glatte Schale ist mit braunen Flecken reiheweise umgeben, und an der Grundspize runzelicht.

*List. Hist. Conch. l. 4. s. 10. p. 2. f. 11.*

*Rumph. amb. t. 31. f. C.*

*Petiv. amb. t. 15. f. 2.*

*Gualt. Test. t. 21. f. B.*

*Seb. Thes. III. t. 44. f. 1 — 4.*

*Knor. Vergn. II. 11. t. 3. f.*

*Da Cost. Elem. Pl. 5. f. 3.*

*Mart. Konch. Kab. II. 60 t. 665. f.*

C. II. 10. Conus figurinus.

C. II. 10. Die Eichenholzstute.

*Linn. S. N. Sp. 309.*

*Belg.* Eckenhouts-Toot. *Rumph. Angl.* The Oacken-wood Stamper.  
*Gall.* Le bois de Chene.

Testa turbinata laeui, lineis transversis fuscescentibus.

Die spizwirblige glatte Schale ist mit braunlichen Quersstrichen umgeben.

*List.*



*List. Hist. Conch. t. 4. s. 10. p. 2. f. 28.*

*Rumph. amb. t. 31. f. V.*

*Gualt. Test. t. 20. f. E.*

*Argenv. Conch. Pl. 12. f. A.*

*Regenf. Samml. I. 10. t. 47. f.*

*Knor. Vergn. III. 1. t. 23. f.*

—— ——— *V. 25. t. 2. f.*

*Mart. Konch. Kab. II. 59. t. 656, 657. f.*

C. II. 11. *Conus ermineus.*

C. II. 11. *Der Hermelinschwanz.*

*Belg. Hermelin Staart. Gall. Queue d'Hermine. Dav.*

Testa pyriformi fulva basi striis punctatis scabra, fasciis transuersis niueis,

Die birnförmige rothgelbe Schale hat am Grunde erhabene punktirte Streife, und schneeweiße Querbänder.

*Valent. Abb. 5. t. 47. f.*

*Gualt. Test. t. 20. f. Q.*

*Seb. Thes. III. t. 42. f. 31 — 40.*

*Mart. Kouch. Kab. II. 57. t. 631. f.*

Testa pyriformis glabra, basi transuersim striata, striis eleuatis punctatiscabris. Spira conica. Anfractus glabri planiusculi. Color fulvus; spira albo maculata; ventris

Die Schale ist birnförmig, und glatt, am Grunde in die Quere gestreift, und auf den erhabenen Streifen mit Körnern besetzt. Der Schnitzel ist kegelförmig. Die



singula duo interrupta alba. Puncta eleuata alba.

Gewinde glatt und etwas flach. Die Farbe rothgelb an dem Schnitzel weißgestreift, und um den Leib mit zweyen unterbrochenen Querbändern umgeben. Die erhabenen Punkte, oder Adrener sind weiß.

C. II. 12. Conus Hebraeus.

C. II. 12. Die Bauernmusik.

Linn. S. N. Sp. 310.

Belg. Böeren - mysyk, Rumph. Angl. Black Diamond Stamper  
Pet. L'Hebraique. Dav.

Testa ouata, maculis oblongis per series transuersim cinerea.

Die eysförmige Schale ist mit länglichen Flecken der Quere nach reiheweise umgeben.

α maculis fuscis

α mit braunen Flecken.

β maculis rufis.

β mit rothgelben Flecken.

Bonan. Recr. cl. 3. f. 122.

List. Hist. Conch. l. 4. s. 10. p. 2. f. 25.

Rumph. amb. t. 33. f. BB.

Petiv. amb. t. 9. f. 12.

— Gaz. t. 99. f. 12.

Gualt. Test. t. 2. f. T.

Argenv. Conch. Pl. 12. f. G.

Adans. Seneg. t. 6. f. 5.



*Seb. Thes. III. t. 47. f. 28 — 29.*

*Knor. Vergn. III. 6. t. 2. f.*

*Mart. Konch. Kab. II. 56. t. 617. f.*

**C. II. 13. Conus Stercus muscarum.**

**C. II. 13. Die Sande tute.**

*Linn. S. N. Sp. 311.*

*Belg. Vliegge - Schettje. Rumph. Angl. Sand - Stamper. Pet. Gall. Piquere de mouche.*

*Testa oblonga punctis pictis* Die längliche Schale ist  
*adsperfa ; anfractibus canali-* mit gefärbten Punkten bestreuet,  
*culatis.* und an den Gewinden ausge-  
 fehlet.

*α elongata, spirae anfractibus ae-* α länglich, mit glatten Wirbelge-  
*qualibus.* winden.

*Liszt. Hist. Conch. l. 4. s. 10. p. 2. f. 9.*

*Petiv. Gaz. t. 75. f. 1.*

— *amb. t. 15. f. 21.*

*Rumph. amb. t. 33. f. 2.*

*Gualt. Test. t. 25. f. N. O.*

*Argenv. Conch. Pl. 13. f. E.*

*Seb. Thes. III. t. 55. f. 1.*

*Regenf. Samml. I. 7. t. 2. f.*

*Knor. Vergn. I. 7. t. 5. f.*

— *Del. nat. I. t. B. 5. f. 7.*

*Mart. Konch. Kab. II. 64. t. 711 — 713. f.*



♂ *ventricosa*, spirae anfractibus co- ♂ bäuchig, mit gekrönten Wirbel-  
ronatis. gewinden.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 10. p. 2. f. 10.*

*Argenv. Conch. Pl. 12. f. S.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

C. II. 14. *Conus va-*  
*rius.*

C. II. 14. Die Löwentu-  
te.

*Linn. S. N. Sp. 312.*

*Belg. Westindische Landcharten. Gall. Peau de chagrin. Argenv.*

*Testa elongata, punctis ele-*  
*uatis cincta, spirae anfracti-*  
*bus coronatis.*

Die längliche Schale ist mit  
erhabenen Punkten umgeben,  
und an den Gewinden gekrönt.

α *fusca, maculis confluentibus ra-*  
*mosis.*

α *braun, mit weißen zusammenfließenden*  
*Flecken.*

β *lutea, maculis albis dispersis so-*  
*litariis.*

β *gelb, mit weißen zerstreuten ein-*  
*zelnen Flecken.*

*Gualt. Test. t. 20. f. T.*

*Argenv. Conch. Pl. 12. f. R.*

*Seb. Thes. III. t. 44. f. 20 — 22.*

*Knor. Vergn. I. 24. t. 5. f.*

— — II. 1. t. 5. f.

— — VI. 1. t. 2. f.

*Mart. Konch. Kab. II. 6. I. t. 678. 679. f.*





C. III. Elongati.

C. III. Lange Tuten.

C. III. 1. Conus Nussatella.

C. III. 1. Der punktirte Bohrer.

*Linna. S. N. Sp.* 314.*Belg.* Gegränuleerde Kuipers - Boor. *Rumph. Angl.* Grain girdled Stamper. *Petiv. Gall.* Tarriere chagrinee.

Testa subcylindrica, striis transuersis eleuatis punctato maculatis.

Die fast walzenförmige Schale ist der Quere nach mit erhabenen Streifen umgeben, und mit gesteckten Punkten besetzt.

*List. Hist. Conch.* l. 4. f. 10. p. 1. f. 35.*Rumph. amb. t.* 33. f. EE.*Petiv. amb. t.* 15. f. 13.*Gualt. Test.* t. 25. f. L.*Argen. Conch. Pl.* 13. f. P.*Knor. Vergn.* II. 4. t. 7. f.

— — — III. 19. t. 4. f.

*Mart. Conch. Kab.* II. 51. t. 567. f.

C. III. 2. Conus Terebra.

C. III. 2. Der Zirkelbohrer.

*Belg.* Witte geveerde Kuypers - Boor. *Gall.* Tarriere blanche & verclée.



Testa oblonga albida, striis Die längliche weiße Schale  
elevatis transuersis parallelis. ist mit erhabenen parallelen  
Querstreifen umgeben.

*Mart. Konch. Kab. II. 52. t. 577. f.*

Testa oblonga crassa, transuer-  
sim striata; striis elevatis paralle-  
lis. Spira conica; anfractus decli-  
ves, striati, contigui. Color ru-  
bellus, fasciis duabus transuersis  
obsoletis albis. Vertex, & basis  
spoliata, amethystina.

Die Schale ist länglich, und dicht,  
in die Quere gestreift. Die Strei-  
fen erhaben, und gleichweit von  
einander entfernt. Der Wirbel  
kegelförmig, die Gewinde ab-  
hängig, gestreift, und aneinander  
gewachsen. Die Farbe blaßroth mit  
zweyen matten weißen Querbändern;  
der Wirbel, und die Grundspitze  
haben, wenn sie abgezogen sind,  
eine Amethystfarbe.

C. III. 3. Conus gra-  
nulatus.

C. III. 3. Der gefurch-  
te Bohrer.

*Linn. Syst. Nat. Gen. 315.*

*Belg.* Bastert Orangie Admiraal. *Angl.* Small chain Stamper. *Petiv.*  
*Gall.* Faux Amiral orangé.

Testa oblonga transuersim  
fulcata, fasciis albis fusco  
maculatis.

Die längliche in die Quere  
gefurchte Schale ist mit weiß-  
sen braungefleckten Querbän-  
dern umgeben.

*Rumph. amb. t. 32. f. T.*

*Petiv. amb. t. 15. f. 1.*

*Gualt.*



*Gualt. Test. t. 25. f. H.*

*Seb. Tbes. III. t. 48. f. 26.*

*Knor. Vergn. III. 6. t. 5. f.*

— — — *V. 24. t. 2. f.*

C. III. 4. *Conus circum-*  
*cifus.*

C. III. 4. Der Drantien-  
bohrer.

Testa subcylindrica fusco-  
que maculata, striis incisis  
transuersis.

Die fast walzenförmige  
Schale ist braungefleckt, und  
mit eingeschnittenen Querstri-  
chen umgeben.

*Valent. Abb. t. 2. f. II.*

*Mart. Konch. Kab. II. 52. t. 571. f.*

Testa subcylindrica laevis striis  
transuersis incisis parallelis. Spira  
planiuscula. Vertex prominens, acu-  
tus centralis. Color ex flavescenti  
rubescens, fasciis transuersis-obso-  
letis albis, punctis dispersis rubris.

Die walzenförmige Schale ist  
in die Quere mit eingeschnittenen,  
parallelen Strichen umgeben. Der  
Schnirkel ist flach. Der spizige  
Wirbel ragt aus der Mitte hervor.  
Die Farbe ist gelblich roth, mit  
matten weißen Querbändern, und  
zerstreuten rothen Punkten.

C. III. 5. *Conus planor-*  
*bis.*

C. III. 5. Der Platt-  
wirbel.



Testa conico ventricosa sul-  
ua, basi transuersim striato  
punctata; spira plana canali-  
culata.

Die kegelförmige rothgelbe  
Schale ist am Grunde mit  
punktirten Streifen umgeben,  
und auf dem flachen Schnirfel  
ausgekehlet.

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa conica ventricosiuscula,  
prope basin transuersim striata, striis  
elevatis, punctato scabris. Spira  
plana. Anfractus canali ulati, mar-  
gine extimo acuto. Color ventris  
fuluus, spirae albo fuluoque ma-  
culatus. Basis intus amethystina.

Die kegelförmige etwas bäuchige  
Schale ist am Grunde in die Quere  
gestreift, die Streifen erhaben,  
und mit Körnern besetzt. Der Schnir-  
fel flach. Die Gewinde ausgekehlet,  
am äußersten Rande scharf. Die  
Schale ist rothgelb, der Schnirfel  
weiß gestreift. Der Grund inwän-  
dig amethystfärbig.

C. III. 6. Conus Magus.

C. III. 6. Das gefleck-  
te Käzchen.

*Linn. S. N. Sp. 317.*

*Belg.* Geplekte Katje. *Rumph.* *Angl.* Tabby Stamper. *Petiv. Gall.*  
*Is.* Picotée. *Argenv.*

Testa subcylindrica, fasciis  
longitudinalibus albo puncta-  
tis.

Die fast walzenförmige  
Schale hat nach der Länge  
laufende punktirte Bänder.

*Rumph. amb. t. 32. f. Q.*

*Petiv. amb. t. 5. f. 10.*

*Argenv. Suppl. Pl. 2. f. G?*

*Gualt.*



*Gualt. Test. t. 20. f. F.*

*Seb. Thes. III. t. 44. f. 27.*

*Knor. Vergn. VI. 16. t. 5. f.*

*Mart. Konch. Kab. II. 58. t. 641. f.*

C. III. 7. *Conus striatus*,

C. II. 7. Die Wellenrolle.

*Linn. S. N. Sp. 318.*

*Belg. De Wolkhoorn. Rumph. Angl. Tyger Stamper. Petiv. Gall. l'Ecorchée. Argenv.*

Testa ovato oblonga nebulae, lineis parallelis transversim picta.

Die eiförmig längliche wellenfichte Schale ist mit gleichweit entfernten Linien bemalt.

*List. Hist. Conch. l. 4. s. 10. p. 2. f. 6.*

*Valent. Abb. 7. t. 60. 61. f.*

*Rumph. amb. t. 31. f. F.*

*Petiv. amb. t. 15. f. 4.*

— *Gaz. t. 98. f. 9.*

*Gualt. Test. t. 26. f. D.*

*Argenv. Conch. Pl. 13. f. C.*

*Seb. Thes. III. t. 42. f. 5, 10.*

*Regenf. Samml. I. 8. t. 13. f.*





*Knor. Vergn.* I. 18. t. I. f.

—— ——— III. 12. t. 5. f; 21. t. I. f.

*Mart. Konch. Kab.* II. 64. t. 714 — 716. f.

C. III. 8. Conus Tex-  
tile.

C. III. 8. Die Spitzen-  
rolle.

*Linn. S. N. Sp.* 319.

*Belg. Gouldlaken. Rumph. Angl. Goldbrocade Schell. Hill. Gall.*  
*Le Drap d'or. Dav,*

Testa ouato oblonga, venis  
reticulatis fuscis, maculis lu-  
teis fuscisque.

Die eysförmige, längliche  
gelb, und braun gefleckte Schae-  
le ist mit netzförmigen braunen  
Adern bemalet.

*Bonan. Recr. cl.* 3. f. 135.

*List. Hist. Conch. l.* 4. f. 10. p. 2. f. 43.

*Rumph. amb. t.* 32. f. O. P.

*Petiv. amb. t.* 15. f. 9.

*Gualt. Test. t.* 25. f. X.

*Argenv. Conch. Pl.* 13. f. F. I.

*Adans. Seneg. Pl.* 6. f. 7.

*Seb. Tbes. III. t.* 43. f. 6 — 12. t. 47. f. 13 — 17.

*Regenf. Samml. I.* 6. t. 62. f.

*Knor. Vergn. I.* 18. t. 6. f.

————— II. 8. t. 3. f.

*Mart.*



*Mart. Konch. Kab. II. 54. t. 598 — 600.*

C. III. 9. *Conus aulicus*. C. III. 9. Die Brunette.

*Linn. S. N. Sp. 320.*

*Belg. Bruinet - Toot Rumph. Angl. The Porphyry Shell. Hill. Gall. La Brunette. Dav.*

*Testa subcylindrica, maculis dispersis inaequalibus trigonis.* Die beinahe walzenförmige Schale ist mit zerstreuten ungleichen dreieckigen Flecken bezeichnet.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 133.*

*Rumph. amb. t. 33. f. 3.*

*Argenv. Conch. Pl. 13. f. G.*

*Seb. Thes. t. 43. f. 1, 2, 4, 5; t. 47 f. 13 — 15.*

*Regenf. Samml. I. 8. t. 25. f.*

*Hill. Hist. of. Anim. Pl. 8.*

*Knor. Vergn. II. 5. t. 3. f.*

— — — III. 19. t. 1. f.

*Mart. Konch. Kab. II. 53. t. 592. f.*

C. III. 10. *Conus pen-nacæus*. C. III. 10. Die Feder-tute.



Belg. De Zilver Lakén Rumph. Gall. Volute pannacchée.

Testa conica cinnamomea, Die kegelförmige zimmtfar-  
lineis punctatis transversis, & bige Schale ist mit punktirten  
maculis pennatis dispersis pal- Querlinien, und zerstreuten  
lidis picta. weißlichen federförmigen Fle-  
cken bemalt.

Mart. Konch. Kab. II. 54. t. 596. f.

Mus. Caes. Vindobon.

Testa conica crassa glaberrima. Die Schale ist kegelförmig, dicht  
Spira obtusa anfractibus infimis pla- und glatt, der Schnirkel stumpf,  
nis, supremis eleuatis in ver- die unteren Gewinde flach, die obo-  
ticem centalem pyramidatum ob- ren in der Mitte pyramidenförmig  
tusum. Color cinnamomeus. Li- erhoben, und zugespitzt, zinno-  
neae pictae transversae ex seriebus berfarbig mit rothbraunen aus  
punctorum ruforum. Maculae di- Punkten zusammengesetzten Quer-  
persae, albiae, aut pallide vio- linien. Die zerstreuten weißen, oder  
laceae, pennatae. weißblauen Flecken, sind federfö-  
rmig.

C. IV. Laxi, ventricosi.

C. IV. Weitbäuchige Tuten.

C. IV. I. Conus Spe-  
ctrum.

C. IV. I. Das Gespenst.

[ Linn. S. N. Sp. 321.

Belg. Spookje. Rumph. Angl. Fairy - Stamper Petiv. Gall. Le Spec-  
tre.

Testa oblonga gibba, fas- Die längliche höckerige  
ciis longitudinalibus undula- Schale hat nach ihrer Länge  
tis. wellenförmige Bänder.

Rumph.



*Rumph. amb. t. 32. f. S.*

*Petiv. amb. t. 15. f. 5.*

*Valent. Abb. 5. t. 39. f.*

*Gualt. Test. t. 25. f. S.*

*Seb. Thes. III. t. 47. f. 24.*

*Knor. Vergn. II, 8. t. 4. f.*

*Mart. Konch. Kab. II, 53. t. 581, 583.*

C. IV. 2. *Conus bullatus.* C. IV. 2. Die Wolkensacke.

*Linn. S. N. Sp. 322.*

Belg. Wolkbakje.

*Testa oblonga, nebulosa* Die länglichte neblichte  
*columella flexuosa, emarginata.* Schale hat eine gedrehte einge-  
säumte Spindel.

*List. Hist. Conch. l. 4. s. 10. p. 1. f. 43.*

*Gualt. Test. t. 26. f. C.*

*Adans. Seneg. Pl. 5. f. 1.*

*Knor. Vergn. V. 8. t. 2. 3. f.*

*Mart. Konch. Kab. II. 65. t. 726. 727. f.*

C. IV. 3. *Conus Tulipa.* C. IV. 3. Die Tulpe.

*Linn. S. N. Sp. 323.*



Belg. Achaat toot. Angl. The Tulip - Shell Hill. Gall. La Tulipe.  
Argenv.

Testa oblonga laeui, aper- Die längliche glatte Schale  
tura patente, anfractibus su- hat eine weite Mündung, und  
premis coronatis. die obersten Gewinde gekrönt.

List. Hist. Conch. l. 4. f. 10. p. 2. f. 7.

Rumph. amb. t. 34. f. K.

Petiv. amb. t. 4. f. 14.

Argenv. Conch. Pl. 16. f. B.

Seb. Thes. III. t. 42. f. 16, 20. t. 43. f. 20 - 22.

Hill. Hist. of. Anim. Pl. 8.

Regenf. Samml. I. 2. t. 20. f.

Knor. Vergn. V. 20. t. 1, 2. f.

Mart. Konch. Kab. II. 64. t. 718, 719.

C. IV. 4. Conus Geo-  
graphus.

C. IV. 4. Die Kronen-  
hülle.

Linn. S. N. Sp. 324.

Belg. Wolkje. Rumph. Angl. Cloudy - Stamper Petiv. Gall. Brocard  
de Soie. Argenv.

Testa oblonga, spira corona-  
ta, apertura patente.

Die längliche Schale hat  
gekrönte Gewinde, und eine  
weite Mündung.

Bonan.





*Bonan. Recr. cl. 3. f. 319.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 10. p. 1. f. 41.*

*Petiv. Gaz. t. 98. f. 8.*

— amb. t. 15. f. 3. A.

*Rumph. amb. t. 31. f. G.*

*Gualt. Test. t. 26. f. E.*

*Argenv. Conch. Pl. 13. f. A.*

*Adans. Seneg. t. 6. f. 8.*

*Seb. Thes. III. t. 42. f. 1—4.*

*Knor. Vergn. III. 21. t. 2. f.*

— — VI. 17. t. 3. f.

*Mart. Konch. Kab. II. 64. t. 717. f.*

## D. Cypraea.

## D. Die Porzellanschnecke.

*Linn. S. N. Gen. 320.*

Testa conuoluta, sub-  
ouata, apertura longitudi-  
nali, utrinque denticulata,  
extremitatibus effusis.

Die Schale ist zusam-  
mengerollet, einigermaßen  
eyförmig, ihre Mündung,  
welche der Länge nach her-  
abläuft, ist beiderseits ge-  
zähnelte, und an den En-  
den ausgeschnitten.



D. I. Mucronatae.

D. I. Spizwirblige,

D. I. 1. Cypraea Exan-  
thema.D. I. 1. Der Bastard  
Argus.*Linn. S. N. Sp. 325.**Belg.* Balfert Argus. *Angl.* Great hebrew Gowry. *Petiv. Gall.*  
*Le faux Argus. Dav.*Testa turbinata, pallide  
maculata, characteribus in-  
scripta, linea longitudinali  
subramosa.Die spizwirblige Schale  
ist weißgefleckt, mit buch-  
stabenähnlichen Strichen bema-  
let, und nach der Länge des  
Rückens mit einer geschlängel-  
ten Linie versehen.*List. Hist. Conch. l. 4. f. 9. f. 45, 46.**Petiv. Gaz. t. 96. f. 6.**Seb. Thes. III. t. 76. f. 16, 18.**Regeuf. Samml. I. 10. t. 38. f.**Knor. Vergn. I. 5. t. 3, 4. f.*

—— ——— II. 24. t. 2. f.

*Mart. Konch. Kab. I. 28. t. 289. f. 29. t. 298. f.*

D. I. 2. Cypraea Mappa,

D. I. 2. Die Landkarte.

*Linn. S. N. Sp. 326.**Belg.* Kaaphoorn. *Angl.* The Map - Shell. *Hill. Gall.* La Carte  
geographique. *Dav.*

Testa



Testa turbinata, characteribus inscripta, linea longitudinali ramosa.

Die spizwirblige Schale ist mit buchstabenähnlichen Zügen bemalt, und mit einer ästigten Linie nach der Länge des Rückens durchzogen.

*Rumph. amb. t. 38. f. B.*

*Petiv. amb. t. 16. f. 2.*

*Argenv. Conch. Pl. 18. f. B.*

*Seb. Thes. III. t. 76. f. 3, 13, 17.*

*Knor. Vergn. I. 26. t. 3. f.*

—— *Delic. nat. I. t. B. IV. 5. f.*

*Mart. Konch. Kab. I. 25. t. 245. f.*

D. I. 3. *Cypraea arabica.*

D. I. 3. Die arabische Buchstaben = Porzellane.

*Linn. S. N. Sp. 327.*

*Belg. Arabische Letters Hoorn. Gall. La fausse Arlequine. Dav.*

Testa turbinata, pallide maculata, characteribus inscripta, linea longitudinali simpliciter.

Die spizwirblige Schale ist blaßgesteckt mit arabischen Buchstaben ähnlichen Zügen und einer einfachen Linie nach der Länge des Rückens bemalt.

« maculis inter characteres irregularibus.

« mit unregelmäßigen Flecken zwischen den Zügen.

List.



*List. Hist. Conch. l. 4. f. 9. f. 3.*

*Rumph. amb. t. 38. f. M.*

*Gualt. Test. t. 16. f. V.*

*Knor. Vergn. III. 12. t. 2. f.*

— — — VI. 20. t. 2. f.

*Mart. Konch. Kab. I. 31. t. 328. f.*

*Da Cost. Elem. Pl. 3. f. 1.*

β maculis rotundis inter characteres obsoletos. β mit runden matten Flecken zwischen den Zügen.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 9. f. 51.*

*Argenv. Conch. Suppl. t. 2. f. 7.*

*Mart. Konch. Kab. I. 31. t. 331. f.*

D. I. 4. *Cypraea Argus.* D. I. 4. Der doppelte Argus.

*Linn. S. N. Sp. 328.*

*Belg. De dubbelde Argus. Angl. The Argus Shell. Hill. Gall. Le grand Atgus. Dav.*

Testa turbinata, subcylindrica, supra adpersa ocellis, walzenförmig, oben mit aus subtus maculis quatuor fuscis. gendähnlichen Ringen, und unten mit vier braunen Flecken bezeichnet.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 9. f. 54.*

*Bonanz. Recr. cl. 3. f. 263.*

*Petiv.*



*Petiv. Gaz. t. 97. f. 6.*

*Rumph. amb. t. 38. f. D.*

*Gualt. Test. t. 16. f. F.*

*Argenv. Conch. Pl. 18. f. D.*

*Hill. Hist. of. Anim. Pl. 8.*

*Regenf. Samml. I. 5. t. 57. f.*

*Knor. Vergn. III. 11. t. 5. f.*

*Mart. Konch. Kab. I. 28. t. 285. 286. f.*

D. I. 5. *Cypraea testudinaria.*

D. I. 5. Die Schildkrötenporzellane.

*Linn. Syst. N. Sp. 329.*

*Belg. Schilpad - hoorn. Angl. Great tourtle Gowry. Petiv Gall. Le Lièvre. Dav.*

*Testa subcylindrica, pallida fuscomaculata, extremitatibus depressis.*

Die einigermaßen walzenförmige Schale ist weißlich, und braungefleckt, an den Enden plattgedrückt.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 9. f. 36.*

*Rumph. amb. t. 38. f. C.*

*Petiv. amb. t. 8. f. 7.*

*Knor. Vergn. IV. 27. t. 2. f.*

*Mart. Konch. Kab. I. 27. t. 271. 272. f.*

D. I.





D. I. 6. *Cypraea sterco-*  
*raria.*

D. I. 6. Das Weitz-  
aug.

*Linn. S. N. Sp. 320.*

*Belg. Wyd - Oog.*

Testa subturbinata, livido Die einigermaßen spitzwirts-  
testaceoque maculata, utrin- lige Schale ist blaulich grau,  
que marginata, subtus plana. mit ziegelfarbigen Flecken beiz-  
derseits eingesäumt, und unten  
flach.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 9. f. 34.*

*Gualt. Test. t. 15. f. S. T.*

*Adans. Seneg. Pl. 5. f. 1. A.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

α pallida griseoque maculata, tu-  
berculo laterali mammillari.

α blaß und grau gefleckt, mit einer  
warzenförmigen Erhöhung an  
einer Seite.

β glauco griseoque maculata;

β sahl und grau gefleckt.

γ cerea unicolor, tuberculo laterali  
mammillari.

γ wachsaelf, einfarbig, mit einer  
warzenförmigen Erhöhung an ei-  
ner Seite.

D. I. 7. *Cypraea Car-*  
*neola.*

D. I. 7. Der Fuchs.

*Linn. S. N. Sp. 331.*

*Belg.*



Belg. De roode Mol. Angl. Buff Gowry. Petiv. Gall. Taupe rouffe.

Testa subturbinata pallida, Die blaße Schale hat eine  
fasciis incarnatis. etwas hervortretende Wirbel-  
spitze, und fleischfarbige Quer-  
bänder.

$\alpha$  ore violaceo,

$\alpha$  mit violetter Mündung.

$\beta$  ore albido, labio externo vix  $\beta$  mit weißer Mündung, und un-  
dentato, deutlich gezählter Zähne.

Rumph. amb. t. 38. f. K.

Petiv. Gaz. t. 80. f. 8.

Knor. Vergn. VI. 17. t. 4. f.

Mart. Konch. Kab. I. 28. t. 287. 288. f.

Mus. Caes. Vindobon.

D. I. 8. Cypraea Zebra. D. I. 8. Der graue Maul-  
wurf.

Linn. S. N. Sp. 332.

Belg. De grave Mol.

Testa turbinata cinerea, Die bleifarbigte Schale hat  
fasciis latis griseis, aperturae eine hervorragende Spitze, brei-  
denticulis fuscis. te graue Querbänder, und an  
der Mündung braune Zähne.

L

Bonn.



- Bonan. Recr. cl. 3. f. 266.*  
*List. Hist. Conch. l. 4. f. 9. f. 15.*  
*Seb. Thes. III. t. 76. f. 5, 15.*  
*Argenv. Conch. Pl. 18. f. G.*  
*Knor. Vergn. II. 24. t. 3. f.*  
*Mart. Konch. Kab. I. 26. t. 256 f.*  
*Mus. Caes. Vindobon.*

D. I. 9. *Cypraea Talpa.*      D. I. 9. Der Maulwurf.

*Linn. S. N. Sp. 333.*

*Belg. Mel. Angl. The yellow zoned Porcellane Hill. Gall. La Taupe. Dav.*

*Testa turbinata subcylindrica testacea, fasciis albidis, basi incrassata atro fusca.*      Die braunlichgelbe walzenförmige Schale hat eine hervorstehende Wirbelspize, blaße Querbänder, und einen aufgeschwollenen schwarzbraunen Boden.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 9. f. 14.*

*Rumph. amb. t. 38. f. 7.*

*Petiv. amb. t. 16. f. 1.*

*Gualt. Test. t. 16. f. N.*

*Argenv. Conch. Pl. 18. f. H.*

*Regenf. Samml. I. 10. t. 37. f.*

*Hill. Hist. of. Anim. Pl. 8.*

*Knor.*



*Knor. Verg. I. 27. t. 2. f.*

*Mart. Konch. Kab. I. 27. t. 273, 274. f.*

D. I. 10. *Cypraea luda*.  
rida.

D. I. 10. Die Maus.

*Linn. S. N. Sp. 335.*

*Belg. De Muis. Gall. La Souris. Dav.*

Testa turbinata, obsolete  
fasciata, extremitatibus nigro  
bimaculatis, basi alba.

Die spizwirblige Schale  
hat matte Querbänder, an den  
Enden zwei schwarze Flecken  
und einen weißen Boden.

*List. Hist. Conch. t. 4. f. 9. f. 17.*

*Gualt. Test. t. 13. f. E. I.*

*Argenv. Conch. Pl. 18. f. C.*

*Adans. Seneg. t. 5. f. D.*

*Mart. Konch. Kab. I. 30. t. 315. f.*

D. I. 11. *Cypraea lota*.

D. I. 11. Die Milch-  
porzellane.

*Linn. S. N. Sp. 337.*

Testa subturbinata, utrin-  
que marginata, denticulis aper-  
turae acutis.

Die einigermaßen spizwirb-  
lige Schale ist beiderseits ein-  
gesäumt, und an der Mün-  
dung mit spizen Zähnen versehen.



*Mart. Konch. Kab. I. 30. t. 322. f.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

D. I. 12. *Cypraea fragilis.*

D. I. 12. Die Dün-  
schale.

*Linn. S. N. Sp. 338.*

*Belg. Turke Papier Porcelain - Hoorn. Gall. Porcellaine marbrée.*

Testa turbinata, ouata, glauca, picta maculis angulatis pal-  
lidis.

Die spizwirlige enförmige  
fahle Schale ist mit blasen ec-  
gen Flecken bezeichnet.

*List. Hist. Conch. I. 4. f. 9. f. 6.*

*Gualt. Test. t. 16. f. 2.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

D. II. Otrusae, seu absque Spira  
manifesta.

D. II. Stumpfwirblige, oder mit  
undeutlicher Wirbelspiße.

D. II. 1. *Cypraea Caput serpentis.*

D. II. 1. Der Moh-  
renbauch.

*Linn. S. N. Sp. 339.*

*Belg. Klene Slang Kop. Angl. Smal Snake Gowry. Pet. Gall. La  
petite tete de Serpent.*

Testa obtusa, triquetra gib-  
ba, dorso albo maculato, la-  
bris albis.

Die stumpfwirblige dreys-  
seitig höckerige Schale ist auf  
dem Rücken weißgesteckt, an  
den Lippen ganz weiß.

*List.*





*List. Hist. Conch. l. 4. f. 9. f. 50.*

*Rumph. amb. t. 38. f. F.*

*Petiv. amb. t. 16. f. 7.*

— *Gaz. t. 96. f. 9.*

*Gualt. Test. t. 15. f. 0.*

*Adans. Seneg. Pl. 5. f. G.*

*Knor. Vergn. IV. 9. t. 3. f.*

*Mart. Conch. Kab. I. 30. t. 316. f.*

D. II. 2. *Cypraea mauritiana.*

D. II. 2. Der große  
Schlangenkopf.

*Linn. S. N. Sp. 340.*

*Belg. Slang Kop Rumph. Angl. Great turtle Leopard. Pet. Gall. Tete de Serpent. Dav.*

Testa obtusa plano conue-  
xa, dorso gibbo pallide ma-  
culato, basi nigricante.

Die stumpfwirblige, unten  
flache, oben erhabene Schale  
hat einen höckerigen blaß ge-  
fleckten Rücken, und schwarz-  
lichen Boden.

α dorso fusco pallide maculato ;  
lateribus fuscis.

α mit braunen blaßgefleckten Rü-  
cken, und braunen Seiten.

β dorso griseo albido maculato,  
lateribus lividis.

β mit lichtgrauen weißgefleckten  
Rücken, und blaulich grauen Sei-  
ten.



*List. Hist. Conch. l. 4. f. 9. f. 52.*

*Petiv. Gaz. I. t. 96. f. 8.*

*Rumph. amb. t. 38. f. E.*

*Knor. Vergn. I. 13. t. 1, 2. f.*

—— — II. 27. t. 5. f.

*Mart. Konch. Kab. I. 30. t. 317. f.*

D. II. 3. *Cypraea Vitellus.*

D. II. 3. Die Salzkorn  
Porzellane.

*Linn. S. N. Sp. 341.*

*Belg. Zout - Koreltje ; Angl. Salt - speckled Gowry Petiv. Gall. La Grelée.*

Testa obtusa, livida, albido  
maculata,

Die stumpfwirblige Schale  
ist blaulichgrau, mit weißen Fle-  
cken.

*Bonan. Recr. el. 3. f. 254.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 9. f. 23.*

*Petiv. Gaz. I. t. 80. f. 2.*

*Rumph. amb. t. 38. f. L.*

*Knor. Vergn. VI. 20. t. 3. f.*

*Mart. Konch. Kab. I. 23. t. 238. f.*

D. II. 4. *Cypraea Mus.*

D. II. 4. Die Kröte.

*Linn. S. N. Sp. 342*

*Belg.*



Belg. Cartageense Wit-rugge. Angl. Carthagea Cowry Petiv.  
Gall. Le Crapaud Dav.

Testa obtusa, gibba, cinerea, Die stumpfwirblige höckeri-  
fascia longitudinali nigro ma- ge Schale ist von aschengrauer  
culata. Farbe, mit einem nach der  
Länge laufenden schwarzgesteck-  
ten Bande.

List. Hist. Conch. l. 4. f. 9. f. 2.

Rumph. amb. t. 39. f. S.

Petiv. amb. t. 16. f. 4.

Argenv. Conch. Pl. 18. f. E.

Seb. Thes. III. t. 76. f. 33, 34.

Knor. Vergn. III. 12. t. 3. f.

Mart. Konch. Kab. I. 23. t. 222. 223. f.

D. II. 5. Cypraea Ti- D. II. 5. Die Tigere-  
gris. porzellane.

Linn. S. N. Sp. 343.

Belg. Getygerde Kliphoorn. Angl. The great Leopard Pet. Gall.  
La Peau de Tigre. Dav.

Testa obtusa, antice rotun- Die stumpfwirblige vorne  
data, dorso maculato, basi rundliche Schale ist auf dem  
nivea. Rücken gesteckt, am Boden  
schneeweiß.

a linea longitudinali nulla.

a ohne Linie über die Länge des  
Rückens.



β linea longitudinali dorsali flavo rubente,

β mit einer nach der Länge des Rückens laufenden gelbrothen Linie.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 9. f. 29.*

*Rumph. amb. t. 38. f. A.*

*Petiv. Gaz. t. 96. f. 7.*

*Gualt. Test. t. 14. f. G, H, I, L.*

*Knor. Vergn. VI. 21. t. 4, 5. f.*

*Mart. Konch. Kab. I. 24. t. 232. 236. f.*

D. II. 6. *Cypraea Lynx.* D. II. 6. Die Masern-  
Porzellane.

*Linn. S. N. Sp. 344.*

*Belg. Mazelen. Rumph. Angl. Thick Saffron - tooth' dGowry. Pet. Gall. La Truitée. Dav.*

Testa obtusa maculis fuscis, Die stumpfwirblige braune  
linea longitudinali fulva, ore gefleckte Schale hat nach der  
ruffo. Länge des Rückens einen roth-  
gelben Streich, und eine braune  
rothe Mündung.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 9. f. 24.*

*Rumph. amb. t. 38. f. O, P.*

*Petiv. Gaz. t. 97. f. 17.*

*Gualt. Test. t. 14. f. C, D.*

*Knor. Vergn. VI. 23. t. 6, 7. f.*

*Mart. Konch. Kab. 29. t. 303, 304. f.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

D. II. 7.



D. II. 7. *Cypraea Isabella*.

D. II. 7. Die Isabelle.

*Linn. S. N. Sp. 293.*

*Belg. Isabelle, Rumph. Angl. Isabella Gowry Pet. Gall. L' Isabelle, Dav.*

Testa obtusa subcylindrica,  
extremitatibus croceis.

Die stumpfwirblige einigermassen walzenförmige Schale hat safranrothe Endspitzen.

*List, Hist. Conch. l. 4. f. 9. f. 4.*

*Rumph. amb. t. 39. f. G.*

*Petiv. Gaz. t. 97. f. 16.*

— amb. t. 16. f. 16.

*Argenv. Conch. Pl. 18. f. P.*

*Knor, Vergn. IV. 9. t. 5. f.*

*Mart. Konch. Kab. I. 27. t. 275. f.*

D. II. 8. *Cypraea cylindrica*.

D. H. 8. Die Walzenporzellane.

Testa obtusa cylindrica, vertice complanato, extremitatibus fusco bimaculatis.

Die stumpfwirblige walzenförmige Schale ist an dem Wirbel plattgedrückt, an den Endspitzen mit zweien braunen Flecken gezeichnet.

*Mus. Caes. Vindobon.*





Testa cylindrica, spira complanata. Dorsum pallide amethystinum; Latera maculis raris fulvis. Extremitates utrinque marginatae bima-  
culatae. Rima inaequalis. Dentes labii extimi remotiores. Basis niuea.

Die Schale ist walzenförmig. Die Wirbelspitze plattgedrückt. Der Rücken von bläßer Amethystfarbe. Die Seiten sind beiderseits eingesäumt, und mit braunlichen zerstreuten Flecken, die Endspitzen aber mit zweien braunen Flecken gezeichnet. Die Spalte der Mündung ist ungleich. Die Zähne der äußeren Lefze stehen etwas mehr von einander entfernt. Der Grund ist schneeweiß.

D. III. Umbilicatae.

D. III. Mit nabelförmig eingedrücktem Wirbel.

D. III. 1. Cypraea Hirundo.

D. III. 1. Die Schwalbe.

Linn. S. N. Sp. 350.

Belg. Het blaeuve Katje.

Testa umbilicata subcylindrica, extremitatibus fusco bima-  
culatis.

Die nabelförmig eingedrückte walzenförmige Schale hat an den Enden zweien braune Flecken.

List. Hist. Conch. l. 4. f. 9. f. 20.

Petiv. Gaz. t. 30. f. 3.

Mus. Caes. Vindobon.

D. III. 2. Cypraea Asellus.

D. III. 2. Das Eselchen.

Linn. S. N. Sp. 351.

Belg.



*Belg.* Ezeltje. *Rumph.* *Angl.* Ass Gowry. *Pet.* *Gall.* Le petit Anc.  
*Argenv.*

Testa umbilicata albida, Die nabelförmig eingedrückt-  
fasciis dorsalibus tribus fuscis, te weißliche Schale hat drey  
braune Querbänder.

*List.* *Hist. Conch.* l. 4. f. 9. f. 21.

*Rumph.* *amb.* t. 39. f. M.

*Petiv.* *Gaz.* t. 97. f. 11.

— *amb.* t. 16. f. 18.

*Argenv.* *Conch.* Pl. 18. f. T.

*Adans.* *Seneg.* Pl. 5. f. H.

*Hill.* *Hist. of. Anim.* Pl. 8.

*Knor.* *Vergn.* IV. 25. t. 3. f.

*Mart.* *Konch.* *Kab.* I. 27. t. 280 f.

D. III. 3. *Cypraea Er-*  
*rones.*

D. III. 3. Das Ba-  
starddrachenhörschen.

*Linn.* S. N. Sp. 352.

*Belg.* Poolische Muts. *Angl.* Freckled Olive Gowry *Petiv.* *Gall.*  
Le Bonnet polonois.

Testa umbilicata oblonga, Die nabelförmig eingedrückt-  
fauce violacea, macula dor- te längliche nebelichte Schale  
sali testacea. hat einen violeten Mund, und  
einen braun grauen Fleck auf  
dem Rücken.

*Petiv.*



*Pesiv. Gáz. t. 97. f. 21.*

*Mart. Konch. Kab. I. 28. t. 294. 295. f.*

D. IV. Marginatae.

D. IV. Eingefäumte.

D. IV. 1. *Cypraea cri-*  
*braria.*

D. IV. 1. Das Argus  
Weibchen.

*Linn. S. N. Sp. 353.*

*Belg. Het Klene Wyfje van den Argus. Angl. The little Wife of the Argus. Gall. Le petit Argus Argenv.*

Testa umbilicata oblonga  
lutea, maculis rotundatis al-  
bis, basi emarginata alba.

Die nabelsförmig eingedrück-  
te, längliche, gelbliche Scha-  
le, ist mit rundlichen Flecken  
besetzt, und mit einem einges-  
äumten Boden versehen.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 9. f. 42.*

*Pesiv. Gáz. t. 8. f. 3.*

*Rumph. amb. t. 39. f. R.*

*Argenv. Test. t. 18. f. X.*

*Regenf. Samml. I. 12. t. 74. f.*

*Mart. Konch. Kab. I. 31. t. 336. f.*

D. IV. 2. *Cypraea*  
*Moneta.*

D. IV. 2. Die guineis-  
sche Münze.

*Linn.*



*Linn. S. N. Sp. 354.*

*Belg. Gemeene geele Kauris. Angl. Black moors Thooth. Petiv. Gall. Monnoye de Guinée.*

Testa marginata albida, lateribus nodosis. Die eingesäumte weißliche Schale hat knotige Seitenränder.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 233.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 9. f. 59.*

*Rumph amb. t. 39. f. C.*

*Petiv. amb. t. 16. f. 14.*

— *Gaz. t. 97. f. 8.*

*Gualt. Test. t. 14. f. 4. 5.*

*Argenv. Conch. Pl. 18. f. K.*

*Knor. Vergn. IV. 24. t. 4. f.*

*Mart. Konch. Kab. I. 31. t. 337. 338. f.*

D. IV. 3. *Cypraea Annulus.* D. IV. 3. Der Ring.

*Linn. S. N. Sp. 355.*

*Belg. Blauwe Kauris. Gall. La Colique. Dav.*

Testa marginata, annulo flavo discum dorsi ambiente. Der Mittelrücken der eingesäumten Schale ist mit einem gelben Ringe eingefasst.

*Petiv.*



*Rumph. amb. t. 39. f. D.*

*Petiv. Gaz. t. 6. f. 8.*

*Knor. Vergn. II. 9. t. 4. f.; 16. t. 4. f.*

*Murr. Fund. Test. t. 1. f. 11.*

*Mart. Konch. Konch I, 24. t. 239. 240. f.*

D. IV. 4. *Cypraea caurica.*

D. IV. 4. Die gefleckte Cauris.

*Linn. S. N. Sp. 356.*

*Belg. Pockjes. Rumph. Angl. Long Massle Gowry. Petiv. Gall. La peau d'Ane. Dav.*

Testa dorso luteo alboque nebuloso, margine inaequali albido, fusco punctato. Der Rücken ist gelb und weiß nebelicht, der Rand ungleich, weißlich mit braunen Punkten.

*Rumph. amb. 38. f. P.*

*Petiv. amb. t. 16. f. 8.*

*Gualt. Test. t. 15. f. X.*

*Murr. Fund. Test. t. 1. f. 13.*

*Mart. Konch. Kab, I, 29. t. 301. 302. f.*

C. IV. 5. *Cypraea Draena.*

D. IV. 5. Das Drachenhaupt.

*Belg.*





Belg. Draackje. Angl. Dragon Gowry. Pet. Gall. Tets de Dragon.

Testa derofo marginata, lateribus albis fusco maculatis, dorso luteo nebuloso, macula media testacea. Die Schale hat einen gleichsam zernagten Saum, die weissen Seiten sind braun gefleckt, der Rücken gelb, neblig, mit einem braunen grauen Flecke in der Mitte.

Petiv. amb. t. 16. f. 10.

Mart. Konch. Kab. I. 28. t. 292. 293. f. ?

Mus. Caes. Vindobon.

Testa oblongo ovata. Vertex umbilicatus retulus. Dorsum carinis duabus transversis obsoletis. Latera emarginata, margine incrassato eroto. Dentes latitudinem labii extremi occupantes. Color dorſi luteo nebulosus; Latera alba punctis fuscis dispersis maculata. Basis alba. Die Schale ist länglicht eysförmig. Der Wirbel ist mit einem stumpfen nabelsförmigen Eindruck, der Rücken mit zweien stumpfen Schneiden der Quere nach besetzt. Die Seiten sind eingesäumt, der Saum aufgeworfen, und gleichsam zernagt. Die Zähne erstrecken sich über die ganze Breite der äußeren Besze. Der Rücken ist von gelber neblichter Farbe. Die Seiten sind weiß, mit zerstreuten braunen Punkten. Der Boden ganz weiß.

D. IV. 6. Cypraea erosa.

D. IV. 6. Das Weißaug.

Linn. S. N. Sp. 357.

Belg. Witoogje. Rumph. Angl. Whit-eyed Gowry Petiv. Gall. Pointillage blanc.

Testa



Testa crenato marginata, Die weiß punktirte Schale  
 albo punctata, lateribus ma- hat einen geferbten Saum, und  
 cula fuscente. an jeder Seite einen braunli-  
 chen Flecken.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 9. f. 39.*

*Petiv. Gaz. I. t. 97. f. 19.*

— amb. t. 16. f. 12.

*Rumph. amb. t. 39. f. A.*

*Gualt. Test. t. 15. f. H.*

*Knorr. Vergn. VI. 20. t. 4. f.*

*Mart. Konch. Kab. I. 30. t. 320, 321. f.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

D. IV. 7. *Cypraea fla-*  
*ueola.*

D. IV. 7. Der Brand-  
 fleck.

*Linn. S. N. Sp. 358.*

Belg. Brand - vlakje.

Testa derosa, lutea albo- Die gelb und weiß neblichte  
 que nebulosa, lateribus ful- Schale hat einen zernagten  
 vis. Rand, und braunrothe Seiten.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 9. f. 12.*

*Gualt. Test. t. 14. f. E.*

*Mart. Konch. Kab. I. 26. t. 267, 268. f.*

D. IV. 8.



D. IV. 8. *Cypraea spur-*  
ca.

D. IV. 8. Der Gelb-  
schmuz.

*Linn. S. N. Sp. 359.*

*Belg. Geelsmetje.*

Testa subemarginata, spira  
plana orbiculari, labio exter-  
no vix dentato.

Die etwas eingesäumte Scha-  
le hat einen flachen runden Wir-  
bel, und an dem äußeren Rande  
de kaum deutliche Zähnechen.

*Mus. Caes. Vindobon.*

D. IV. 9. *Cypraea sto-*  
lida.

D. IV. 9. Das Rost-  
fleckchen.

*Linn. S. N. Sp. 360.*

*Belg. Het Soottolakje. Angl. The Beetle Porcellane. Hill.*

Testa marginata pallida, ma-  
culis quadrangularibus testa-  
ceis.

Die eingesäumte weißliche  
Schale ist mit rostfarbigen vier-  
eckigen Flecken bemalt.

*Petiv. Gaz. t. 97. f. 18.*

*Argenv. Conch. Pl. 18. f. r.*

*Hill. Hist. of. Anim. Pl. 8.*

*Mart. Konch. Kab. I. 29. t. 305. f.*

*Mus. Caes. Vindobon.*



D. IV. 10. *Cypraea* D. IV. 10. Die Stern-  
heluola. porzellane.

*Linn. S. N. Sp. 361.*

Belg. Sterretje. Angl. Star Gowry Petiv. Gall. Porcellaine e toi-  
lée. Dav.

Testa crenato marginata, Die höckerige weißpunktirte  
gibba, albo punctata, sub- und unten rothbraune Schale,  
tus ruffa. hat einen zernagten Saum.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 9. f. 38.*

*Rumph. amb. t. 39. f. B.*

*Petiv. amb. t. 16. f. 17.*

*Mart. Konch. Kab. I. 30. t. 326. 327. f.*

D. IV. 11. *Cypraea* D. IV. 11. Das Schwarz-  
ocellata. aug.

*Linn. S. N. Sp. 362.*

Testa subemarginata, ocellis Die einigermaßen eingesäum-  
nigris inter annulos pallidos. te Schale hat schwarze mit blaß-  
gelben Ringen eingefasste Augen.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 9. f. 43.*

*Petiv. Gaz. t. 9. f. 7.*

*Mart. Konch. Kab. I. 31. t. 333. 334. f.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

D. IV. 12.



D. IV. 12. *Cypraea*  
poraria.

D. IV. 12. Die Fries-  
selporzellane.

*Linn. S. N. Sp. 363.*

Testa marginata, ocellis  
albis, annulo fusco cinctis;  
basi amethystina.

Die eingesäumte Schale hat  
weiße mit Ringen eingefasste  
Augen, und einen amethyst-  
farbigen Boden.

*Mart. Conch. Kab. I. 30. t. 324. 325.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

D. IV. 13. *Cypraea* Pe-  
diculus.

D. IV. 13. Die Laus.

*Linn. S. N. Sp. 364.*

*Belg. Zee Vloog Rumph. Angl. Louise Gowry Petiv. Gall. Pou-  
de Mer. Argenv.*

Testa marginata subglobosa,  
striis elevatis transuersis, in  
rimam usque protensis.

Die eingesäumte fast kugel-  
förmige Schale ist mit erhabenen  
Duerstreifen besetzt, die  
sich bis zur Spalte erstrecken.

\* sulco dorsi longitudinali.

\* mit einer Furche nach der Länge  
des Rückens.

β sulco dorsi longitudinali nullo.

β ohne Furche nach der Länge des  
Rückens.

*List. angl. t. 3. f. 17.*

— *Hist. Conch. l. 4. f. 9. f. 56, 57.*





*Rumph. amb. t. 39. f. P.*

*Petiv. amb. t. 16. f. 22.*

*Gualt. Test. t. 14. f. P. t. 15. f. P, R.*

*Argenv. Conch. Pl. 18. f. L.*

*Adans. Seneg. Pl. 5. f. 3.*

*Knor. Vergn. VI. 17. t. 6. f.*

*Mart. Konch. Kab. I. 29. t. 310, 311. f.*

D. IV. 14. *Cypraea*  
Nucleus.

D. IV. 14. Die Reis-  
kornporzellane.

*Linn. S. N. Sp. 365.*

*Belg. De Rys Korrel. Angl. The Rice Gowry Petiv. Gall. La petite Verole. Dav.*

Testa utrinque marginata, Die beiderseits eingesäumte  
fulcis tuberculisque exasperata, Schale ist mit Furchen, und  
Körnchen besetzt.

α alba (major) subrostrata.

α weiß (und größer) mit schnau-  
zenförmigen Endspitzen.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 9. f. 58.*

*Petiv. Gaz. t. 97. f. 12.*

— amb. t. 16. f. 11.

*Rumph. amb. t. 39. f. 7.*

*Gualt. Test. t. 14. f. S.*

*Argenv.*



*Argenv. Conch. Pl. 18. f. V.*

*Seb. Thes. III. t. 55. f. 22.*

*Knor. Vergn. IV. 17. t. 7. f.*

*Mart. Konch. Kab. I. 29. t. 312. f.*

β utrinque obtusa, punctis eleuatis annulo ferrugineo cinctis (minor). β an beiden Enden stumpf (und kleiner) die erhabenen Ränder sind mit rostfarbigen Ringen eingefasst.

*Mus. Caes. Vindobon.*

D. IV. 15. Cypraea      D. IV. 15. Die Affel.  
staphylaea.

*Linn. S. N. Sp. 366.*

*Belg. Pisseped. Gall La Cloporte. Argenv.*

Testa punctis eleuatis, sine striis, extremitatibus luteis. Die Schale ist mit erhabenen Körnern besetzt, ohne Streifen, und an den Endspitzen gelb.

*Gualt. Test. t. 14. f. T.*

*Argenv. Conch. Pl. 18. f. S.*

*Knor. Vergn. IV. 16. t. 2. f.*

*Mart. Konch. Kab. I. t. 29. f. 313. 314. f.*

*Mus. Caes. Vindobon.*



D. IV. 16. *Cypraea*  
*Cicercula*.

D. IV. 16. Das Horn-  
Knöpfchen.

*Linn. S. N. Sp. 367.*

*Belg. Korelye Knoopje. Rumph. Angl. Wart Gowry. Petiv.*

Testa utrinque rostrata, ad-  
spersa punctis eleuatis.

Die an beiden Enden schnau-  
zenförmige Schale ist mit er-  
habenen Punkten besetzt.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 9. f. 62.*

*Rumph. amb. t. 39. f. K.*

*Petiv. amb. t. 16. f. 21.*

*Mart. Konch. Kab. I. 24. t. 243. 244. f.*

D. IV. 17. *Cypraea*  
*Globulus*.

D. IV. 17. Das glatte  
Knöpfchen.

*Linn. S. N. Sp. 368.*

*Belg. Paerltje. Rumph. Angl. Pearl Gowry. Petiv.*

Testa laeui, utrinque rostra-  
ta.

Die Schale ist glatt und an  
beiden Enden schnauzenförmig.

*Petiv. Gaz. t. 97. f. 4.*

— *amb. t. 16. f. 19.*

*Rumph.*



*Rumph. amb. t. 39. f. L, N.*

*Gualt. Test. t. 14. f. M.*

*Knor. Vergn. VI. 21. t. 7. f.*

*Mart. Konch. Kab. I. 24. t. 242. f.*

*Murray. Fund. Test. t. 1. f. 12.*

## E. Bulla.

## E. Die Blasenschnecke.

*Linn. S. N. Gen. 322.*

Testa conuoluta laevis; Die Schale ist zusammen-  
Apertura subcoarctata ob- gerollet und glatt; ihre  
longa; Columella obli- Mündung, welche der Län-  
qua edulenta. ge nach herabläuft, mei-  
stens nur an einem Ende  
ausgeschnitten; die Spin-  
del schief und ohne Zähne.

## E. 1. Bulla Ouum.

## E. 1. Das Ey.

*Linn. S. N. Sp. 369.*

*Belg. Porselein - hoorn. Rumph. Angl. White Egg - Gowry. Petiv. Gall. L'oeuf. Dav.*

Testa ouata, obtuse biro- Die eysförmige Schale ist  
stri, labro exteriori dentato. an beiden Enden mit einer  
stumpfen Schnauze versehen,  
an der äußeren Kesse gezähnt.



*Bonan. Recr. cl. 3. f. 252.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 9. f. 68.*

*Rumph. amb. 1. 38. f. 2.*

*Petiv. amb. t. 8. f. 6.*

— *Gaz. t. 97. f. 7.*

*Gualt. Test. t. 15. f. A.*

*Argenv. Conch. Pl. 18. f. A.*

*Seb. Tbes. III. t. 76. f. 6, 10.*

*Knor. Vergn. VI. 33. t. 1. f.*

*Mart. Konch. Kab. I. 22. t. 205. 206. f.*

E. 2. *Bulla birostris.*

E. 2. Der kleine We-  
berspuhl.

*Linn. Syst. N. Sp. 371.*

*Belg. Bastert Wewers - Spoeltje. Gall. Petite Navette.*

Testa oblonga, margine in-  
crassato, angulato, rostris elon-  
gatis laevibus.

Die längliche Schale hat  
einen aufgeschwollen eckigen  
Rand, und glatte schnabelför-  
mige Endespitzen.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 9. f. 66.*

*Knor. Vergn. VI. 20. t. 5. f.*

*Mart. Konch. Kab. I. 23. t. 217. f.*

E. 3. *Bulla Spelta.*

E. 3. Das Joch.

*Linn. S. N. Sp. 372.*

*Belg.*





Belg. Jockje. Angl. Smal Leghorn Gowrikin. Pet.

Testa oblonga utrinque ob- Die längliche Schale hat  
tusculosa, labro arcuato in- etwas stumpfe Endspitzen, und  
crassato. eine gebogene verdickte Kante.

List. Hist. Conch. l. 4. f. 9. f. 68.

Petiv. Gaz. t. 66. f. 2, 3.

Gualt. Test. t. 15. f. 4.

Ginan. adv. II. t. 13. f. 95.

Mart. Konch. Kab. I. 23. t. 215. 216. f.

E. 4. Bulla verrucosa. E. 4. Der Hochrücken.

Linn. S. N. Sp. 373.

Belg. Witte Jamboeze; Rumph. Angl. White Nipple Gowry-Kin.  
Petiv. Gall. La Boslue. Dav.

Testa gibbosa transversim Die höckerige Schale hat  
carinata, extremitatibus gra- einen eckigen Quervulst, und  
no rotundo adnato, an jedem Ende ein rundes an-  
gewachsenes Knöpfchen.

List. Hist. Conch. l. 4. f. 9. f. 67.

Petiv. Gaz. t. 97. f. 22.

— amb. t. 16. f. 23.

Rumph. amb. t. 38. f. H.

Gualt. Test. t. 16. f. F.



*Argenv. Conch. Pl. 18. f. M.*

*Seb. Thes. III. t. 55. f. 17.*

*Knor. Vergn. IV. 26. t. 7. f.*

*Mart. Konch. Kab. I. 23. t. 220, 221.*

E. 5. *Bulla gibbosa.*

E. 5. Der Wulst.

*Linn. S. N. Sp. 374.*

*Belg. Hoogruggetje. Gall. La petite bouche.*

Testa subcylindrica, angulo dorsali eleuato transuerso. Die einigermaßen walzenförmige Schale führt auf den Rücken einen in die Quere liegenden erhabenen Gürtel.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 249. 339.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 9. f. 64.*

*Petiv. Gaz. t. 15. f. 5.*

*Gualt. Test. t. 15. f. 3.*

*Argenv. Conch. Pl. 18. f. Q.*

*Seb. Thes. III. t. 55. f. 18.*

*Knor. Vergn. I. 14. t. 3, 4. f.*

—— ——— VI. 32. t. 4. f.

*Mart. Konch. Kab. I. 22. t. 211. 212. f.*

E. 6. *Bulla Naucum.*

E. 6. Das Taubeney.

*Linn. S. N. Sp. 375.*

*Belg.*



Belg. Witte Kievits - Ey. Valent. Gall. La Bulle d'eau. Dav.

Testa rotundata subpellucida, transuersim striata, utrinque umbilicata, Die rundliche halbdurchsichtige Schale ist in die Quere gestreift, und an beiden Enden mit einem Nabelloche versehen.

Bonap. Recr. cl. 3. f. 4.

List. Hist. Conch. l. 4. f. 9. f. 73.

Rumph. amb. t. 27. f. H.

Gualt. Test. t. 13. f. G. G.

Argenv. Conch. Pl. 17. f. Q.

Seb. Thes. III. t. 38. f. 45.

Knor. Vergn. VI. 38. t. 2, 3. f.

Mart. Conch. Kab. I. 22. t. 200. f.

E. 7. Bulla aperta.

E. 7. Die offene Blase.

Linn. S. N. Sp. 376.

Testa subrotunda pellucida, apertura patentissima, Die rundliche durchsichtige Schale hat eine ganz erweiterte offene Mündung.

Gualt. Test. t. 13. f. EE.

Mus. Caes. Vindobon.

E. 8. Bulla Ampulla.

E. 8. Das Kriebitzen.

Linn. S. N. Sp. 378.

Belg.



Belg. Kievits - Ey. Angl. The Indian Dipper. Pet. Gall. La Muscade Dav.

Testa rotundata opaca, vertice umbilicato.

Die rundliche undurchsichtige Schale hat einen nabelförmig eingedrückten Wirbel.

Bonan. Recr. cl. 3. f. 3.

List. Hist. Conch. l. 4. f. 9. f. 12.

Petiv. Gaz. t. 50. f. 13. t. 99. f. 14.

Rumph. amb. t. 27. f. G.

Gualt. Test. t. 12. f. E — F.

Adans. Seneg. Pl. 1. f. 2.

Seb. Thes. III. t. 38. f. 34 — 44.

Regenf. Samml. I. 5. t. 58. f. 8. t. 21. f.

Knor. Vergn. II. 8. t. 1. f.

—— — V. 17. t. 6. f.

Mart. Konch. Kab. I. 21. t. 188. f. 22. t. 202-204f.

Da Cost. Elem. Pl. 3. f. 4, 5.

E. 9. Bulla lignaria.

E. 9. Die Papierrolle.

Linn. S. N. Sp. 379.

Belg. Opgerolde Papier. Gall. l' Oublie. Dav.

Testa obouato oblonga transuersim striata, vertice umbilicato.

Die verkehrt eiförmige längliche Schale ist in die Quere gestreift, und mit einem gezackten Wirbel versehen.

List.



*List. Hist. Conch. l. 4. f. 9. f. 71.*

*Knor. Vergn. VI. 37. t. 4, 5. f.*

*Mart. Konch. Kab. I. 21. t. 194 195. f.*

E. 10. *Bulla Physis.*

E. 10. Die Staats-  
fahne.

*Linn. S. N. Sp. 380.*

*Belg. Staate Vlaggetje. Valent. Gall. Gondole rayée. Argenv.*

Testa ovato oblonga, picta  
lineis transuersis undulatis,  
spira horizontali.

Die ensförmige längliche  
Schale ist in die Quere mit  
wellenförmigen Linien bemalet,  
und mit einem wagrechten  
Schnirkel versehen.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 9. f. 75.*

*Bonan. Mus. Kircb. cl. 3. f. 403.*

*Valent. Abb. t. 2. f. 19.*

*Gualt. Test. t. 13. f. F. F.*

*Argenv. Conch. Pl. 17. f. 7.*

*Seb. Thes. III. t. 38. f. 46 — 50.*

*Murray. Fund. Test. t. 1. f. 9.*

*Mart. Konch. Kab. I. 21. t. 196. 197. f.*

E. 11. *Bulla Amplu-  
stre.*

E. 11. Das rothe Band.

*Linn.*





Linn. S. N. Sp. 381.

Belg. Rood - bandje.

Testa subglobosa albida, Die einigermassen kugelförmige  
cingulis transuersis fuscis, mige weißliche Schale hat braune  
spira obtusa. ne Quergürteln, und einen  
stumpfen Schnirkel.

Mart. Konch. Kab. I. 21. t. 198. f.

Mus. Caes. Vindobon.

E. 12. Bulla Ficus.

E. 12. Die Feige.

Linn. S. N. Sp. 382.

Belg. Spaanse Vyg. Rumph. Angl. Fig - whelk. Pet. Gall, La  
Figure.

Testa obouato clauata, re- Die verkehrt kegelförmige,  
ticulato striata, rostro exser- kaülähnliche und nezförmig ge-  
to, spira oblitterata. streifte Schale hat einen ver-  
längerten Schnabel, und un-  
deutlichen Schnirkel.

Bonan. Recr. cl. 3. f. 15.

List. Hist. Conch. l. 4. f. 10. f. 46.

Rumph. amb. t. 27. f. K.

Petiv. amb. t. 6. f. 9.

Gualt. Test. t. 26. f. J. M.

Argenv.



*Argenv. Conch. Pl. 17. f. O.*

*Klein. Meth., Ostr. t. 5. f. 93.*

*Seb. Thes. III. t. 68. f. 1.*

*Knor. Vergn. I. 19. t. 4. f.*

—— III. 23. t. 1. f.

—— *Delic. nat. I. t. B. II. f. 7.*

*Mart. Konch. Kab. III. 66. t. 734. f.*

E. 13. *Bulla Rapa.*

E. 13. *Die Rübe.*

*nn. S. N. Sp. 383.*

*Rad. Knollhoorn. Rumph. Angl. Round Partridge. Petiv Gall.*  
*Le Radix. Dav. Ital. Il Radiccio.*

Testa rotundato turbinata, Die runde birnförmige Scha-  
spira exserta, rostro incurva- le hat einen hervorragenden  
to. Schnirkel, und umgedrehten  
Schnabel.

*Rumph. amb. t. 27. f. F.*

*Petiv amb. t. 9. f. 8.*

*Valent. Abb. 9. t. 82. f.*

*Gualt. Test. t. 26. f. H.*

*Argenv. Conch Pl. 17. f. K.*

*Klein. Meth. Ostrac. t. 4. f. 80.*

*Seb. Thes. t. 38. f. 13 - 16. 18 - 20, 22, 23,*

—— t. 68. f. 7, 8.

*Knor.*



*Knor. Vergn. I. 19. t. 5. f.*

— *Del. nat. I. t. B. II f. 8.*

*Mart. Konch. Kab. III. 68. t. 747-749. f.*

**E. 14. Bulla Terebellum.**

**E. 14. Der glatte Böttchenbohrer.**

*Linn. S. N. Sp. 388.*

*Belg. Kuipers - Boor. Rumph. Angl. The speckled Augur - Peg. Petiv. Gall. La Tarriere. Dav.*

*Testa cylindrica, spira subulata, basi truncata.*

Die walzenförmige Schale hat einen zugespizten Schnirkel, und eine abgestumpfte Grundspize.

$\alpha$  alba, punctis dispersis minutissimis.

$\alpha$  weiß, mit sehr kleinen zerstreuten Punkten.

$\beta$  pallida, punctis maculisque nebulosis.

$\beta$  blaß, mit nebelichten Punkten und Flecken.

$\gamma$  pallida, lineis punctatis.

$\gamma$  blaß, mit punktirten Linien.

$\delta$  pallida, lineis obliquis angularis.

$\delta$  blaß mit schiefen Winkelzügen.

*Bonap. Recr. cl. 3. f. 57.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 10. f. I.*

*Rumph. amb. t. 30. f. S.*

*Petiv.*



*Petiv. amb. t. 13. f. 24.*

*Argenv. Conch. Pl. 11. f. G.*

*Hill. Hist. of. Anim. Pl. 9.*

*Knor. Vergn. II. 4. t. 4. 5. f.*

*Mart. Konch. Kab, II. 51. t. 568. 569. f.*

E. 15. *Bulla Cypraea.* E. 15. Die Porzellan-  
blase.

*Linn. S. N. Sp. 389.*

*Belg. Bruin gebandeerd Bakje; Gall. Baquet bandé.*

Testa ouato oblonga, spi- Die eiförmige längliche  
rae apice prominulo, colu- Schale hat eine hervorragende  
mella torta. Wirbelspize, und eine gewun-  
dene Spindel.

*Knor. Vergn. VI. 4. t. 5. f.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

E. 16. *Bulla virginea.* E. 16. Die Prinzen-  
fahne.

*Linn. S. N. Sp. 390.*

*Belg. Prince Vlag. Gall. Le Ruban. Dav,*

Testa subturrita erecta, co- Die einigermaßen gethürm-  
lumellae basi truncata, cin- te und aufrechte Schale ist an  
gulis coloratis transuersis. dem Grunde der Spindel ab-  
gestumpft, und mit gefärbten  
Querbändern bemalt.

N

„ fasciis



- α fasciis miniatis flavisque, lineis roseis & purpurascensibus. mit meningrothen und gelben Bändern; wie auch rosenrothen und purpurfarbigen Linien.
- β fasciis flavis & viridibus, lineis purpureis & violaceis. mit gelben und grünen Bändern; wie auch purpurrothen und violetten Linien.
- γ lineis fulvis, cum fasciis interruptis, solum in anfractibus supremis alternantibus. mit rothgelben Linien, die mit unterbrochenen Bändern auf den oberen Gewinden allein abwechseln.
- δ tota alba, lineis miniatis prope futuras. ganz weiß, mit meningfarbigen Linien an den Näthen.
- ε fusca, anfractuum fascia media & utrinque faturali alba. braun, deren jedes Gewind in seiner Mitte, wie auch beiderseits an der Naht eine weiße Binde trägt.
- η alba, fasciis parallelis fuscis. weiß, mit gleichweit abstehenden braunen Bändern.

Bonanz. Recr. cl. 3. f. 66.

Petiv. Gaz. t. 22. f. II. t. 151. f. I.

Gualt. Test. t. 6. f. A. C.

Argenv. Conch. Pl. II. f. N. M.

Klein. Meth. Osir. t. 7. f. 116.

Seb. Thes. III. t. 39. f. 62-74. t. 40. f. 38. 39.

Regenf. Samml. I. 10. t. 46. f.

Knor. Vergn. I. 30. t. 7. f.

— — — V. 25. t. 4. f.

— — — Del. nat. I. t. B. II. f. 6.



E. 17. *Bulla achatina.*E. 17. Die französische  
Schellenschnecke.*Linn. S. N. Sp. 391.**Belg. Fransche Belhoorn.**Testa ouato oblonga, columellae basi truncata.*Die eiförmige längliche  
Schale hat eine am Grunde  
abgestumpfte Spindel. $\alpha$  fasciis longitudinalibus undulatis  
latis, columella rubra, $\alpha$  mit nach der Länge laufenden  
breiten Wellen, und rother Spin-  
del.*Bonan. Recr. cl. 3. f. 192.**List. Hist. Conch. l. 4. f. 3. f. 34.**Petiv. Gaz. t. 44. f. 7.**Gualt. Test. t. 45. f. B.**Klein. Meth. Ostr. t. 3. f. 60.**Seb. Thes. III. t. 71. f. 1 — 3.**Knor. Vergn. IV. 24. t. 1. f.*—— *Del. nat. I. t. B. V. f. 1.* $\beta$  fasciis longitudinalibus undulatis  
tenuibus, columella alba. $\beta$  mit nach der Länge laufenden  
schmalen Wellen, und weißer  
Spindel.*Seb. Thes. III. t. 71. f. 4, 5.**Knor. Verg. V. 12. t. 2. f.**Mus. Caes. Vindobon.* $\gamma$  ponderosa, alba unicolor. $\gamma$  schwer, weiß, einfarbig.*Mus. Caes. Vindobon.*F. *Voluta.*

F. Die Faltenschnecke.

*Linn. Syst. Nat. Gen. 322.*

N 2

Testa



Testa convoluta, columella transuersa plicata. Die zusammen gerollte Schale ist an ihrer Spindel mit Quersalten versehen.

F. I. Apertura coarctata.

F. I. Mit eingesetzter Mündung.

F. I. 1. Voluta Auris Midae.

F. I. 1. Das Midasohr.

Linn. S. N. Sp. 392.

Belg. Midas - Oor. Rumph. Angl. Midas - Ear. Petiv. Gall. Oreille de Midas. Argenv.

Testa ovali oblonga, spirabatique rugulosa, columella bidentata. Die eiförmige längliche Schale, ist an dem Wirbel und Grunde gerunzelt, an der Spindel mit zwei Falten versehen.

α nivea (major.)

α schneeweiß (größer.)

β fusca (minor.)

β braun (kleiner.)

Bonan. Mus. Kirch. cl. 3. f. 412.

Rumph. amb. t. 33. f. H.H.

Petiv. amb. t. 8. f. 2.

Gualt. Test. t. 55. f. G.

Argenv. Conch. Pl. 10. f. G.

Klein. Meth. Ostr. t. 7. f. 122.

Seb. Thes. III. t. 71. f. 21. 22.

Knor. Vergn. VI. 25. t. 1. f.

Mart. Konch. Kab. II. 43. t. 436 — 438. f.

Testa



F. I. 2. *Voluta Auris Sileni.*

Testa ovali gibba umbilicata, columellae plica unica crassa flexuosa.

F. I. 2. Das Langohr.

Die eysförmige höckerige Schale hat an der Spindel eine dicke gedrehte Falte.

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa ovata gibba, laevis, longitudinaliter obsolete striata. Spira obtusa, ex anfractibus quatuor convexis, subito decrescentibus, in verticem obtusum terminata. Apertura ovata coarctata. Labium exterius marginatum, interius tenue replicatum, & super columellam expansum, dente subto oblique flexuoso, crasso. Basis perforata. Color badius, fasciis undularis longitudinalibus rufis.

Die Schale ist eysförmig, und glatt, nach der Länge herab matt gestreift. Der Schnirkel besteht aus vier gewölbten geschwinde abnehmenden Windungen, die sich in eine stumpfe Spitze endigen. Die Mündung ist eysförmig, ganz eingest. Die äußere Lefze ist eingest. Die innere dünne über die Spindel ausgebreitet, an welcher unten eine dicke schief gedrehte Falte liegt. Der Grund ist durchbohret. Die Farbe schwarzbraun, mit rothbraunen nach der Länge herablaufenden Wellen.

F. II. *Cylindroidae effusae.*

F. II. Einigermassen walzenförmige, mit ausgeschnittener Mündung.

F. II. 1. *Voluta porphyria.*

F. II. 1. Die Lagerwalze.

*Linn. S. N. Sp. 398.*

Belg. Porphyre Daedel. Oud. Angl. The Camp. Da Cost. Porphyre Argeny.

Testa subcylindrica laevi, spirae anfractibus acute marginatis, infimis planiusculis, columella incrassata oblique plicata.

Die walzenförmige glatte Schale hat scharfrandige Windungen, deren unterste etwas flach sind, mit einer dichten schief gefalteten Spindel.

Picta lineis angulatis.

Mit eckigen Winkelzügen bemalt.



*Bonan. Recr. cl. 3. f. 142.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 10. f. 11.*

*Petiv. Gaz. t. 102. f. 19.*

*Gualt. Test. t. 24. f. P.*

*Argenv. Conch. Pl. 13. f. K.*

*Regenf. Samml. I. 2. t. 15. f.*

*Knor. Vergn. I. 15. t. 1. f.*

— *Del. nat. I. t. B. IV f. 4.*

*Da Cost. Elem. Pl. 5. f. 4.*

*Mart. Konch. Kab. II. 44. t. 498. f.*

F. II. 2. *Voluta Oliua.* F. II. 2. *Die Oliven-*  
*walze.*

*Linn. S. N. Sp. 399.*

*Belg. Daadel. Angl. The Olive Shell. Hill. Gall. l'Olive. Day.*

*Testa subcylindrica laevi, spirae anfractibus planiusculis, extimo tumido reflexo; columella incrassata, oblique plicata.* Die einigermaßen walzenförmige glatte Schale hat etwas flache Schnirkelgewinde, deren äußerstes aufgeworfen, und umgebogen ist; mit einer dichten schiefgefalteten Spindel.

*a albida lineis undulatis, fasciis- a weiß mit rothbraunen wellen-*  
*que reticulatis rufis.* förmigen Linien, und netzartigen  
rothbraunen Querbändern.

*Mart.*



*Mart. Konch. Kab. II. 51. t. 561. f.*

♂ ex viridescenti reticulata, fasciis ♂ mit grünlischen Netzen, zwey schwar-  
duabus transuerfis nigris, colu- zen Querbändern, und einer fir-  
mella crocea. ranfarbigen Spindel.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 10. c. 6. f. 28.*

*Rumph. amb. t. 39. f. 3.*

*Seb. Thes. III. t. 53. f. M.*

*Mart. Konch. Kab. II. 48. t. 512. 513. f.*

♀ ex coerulescente luteoque macu- ♀ bläulich, und gelb gefleckt, mit  
lata, fasciis transuerfis viridibus grünen Querbändern.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 10. f. 26.*

*Seb. Thes. III. t. 53. f. H. G.*

*Knor. Vergn. III. 2. t. 4. f.*

*Mart. Konch. Kab. II. 48. t. 511. f.*

♂ olivacea, fasciis transuerfis inter- ♂ olivengrün, mit unterbrochenen  
ruptis nigris. schwarzen Querbändern.

*Belg. Princeps - Begraafenis. Rumph. Angl. Prinse Stamper. Petiv.*  
*Gall. Drap mortuaire. Dav.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 10. f. 25.*

*Rumph. amb. t. 39. f. 4.*

*Petiv. amb. t. II. f. I.*

*Valent. Abb. 8. t. 68. f.*





*Argenv. Conch. Pl. 13. f. S.*

*Seb. Thes. III. t. 53. f. F. a.*

*Knor. Vergn. V. 19. t. 1. f.*

*Mart. Konch. Kab. II. 45. t. 480. f.*

♀ *lutescens, fasciis longitudinalibus* ♀ gelblich, mit rothbraunen nach  
undulatis rufis. der Länge laufenden wellenförmigen Bändern.

*Mart. Konch. Kab. II. 47. t. 505. f.*

♂ *alba, luteo fuscoque nebulosa, fa-* ♂ weiß, mit gelben und braunen  
sciis duabus transueris fuscis. Wolken, und zwey braunen  
Querbändern.

*Belg. Porphyristeene Daadel. Rumph. Angl. The purple Marble Date*  
*Gall. Olive satinée a bandes. Oud.*

*Fauce rosea.*

*Mit rosenrothem Schlunde.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 10. f. 14.*

*Rumph. amb. t. 39. f. 1.*

*Gualt. Test. t. 24. f. O.*

*Seb. Thes. III. t. 53. f. A. — D.*

*Regenf. Samml. I. 2. t. 15. f.*

*Mart. Konch. Kab. II. 45. t. 476, 477. f.*

♀ *aurantia; fasciis obsoletis trans-* ♀ orangenroth, mit violeten matten.  
ueris violaceis. Querbändern.

*Belg. Achatze. Rumph. Gall. La Cornaline.*

*Mart.*



*Mart. Konch. Kab. II. 46. t. 495. f.*

♀ *aurantia*, fascia media transuersa ♀ orangenroth mit einem schneeweißen Querbande um die Mitte.

*Mus. Caes. Vindobon.*

♂ *pallide lutea*, maculis adspersa ♂ bläßgelb, mit bläulichen Flecken  
*coeruleiscentibus*, fauce violacea. besetzt, und einem violeten Schlunde.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 10. f. 6.*

*Rumph. amb. t. 39. f. 6.*

*Petiv. amb. t. 22. f. 5.*

*Gualt. Test. t. 23. f. H, J, E.*

*Seb. Thes. III. t. 53. f. W.*

*Mart. Konch. Kab. II. 46. t. 493, 494. f.*

♂ *brunna unicolor.*

♂ *braun einfärbig.*

*Belg. Grauwve Munnik. Valent. Olive de Satin. Pet.*

*Seb. Thes. III. t. 53. f. K.*

*Knor. Vergn. V. 27. t. 5. f.*

*Mart. Konch. Konch II, 47. t. 501. f.*

*Da Cost. Elem. Pl. 5. F. 7.*

λ *ex fusco nigra, unicolor.*

λ *schwarzbraun.*

*Belg. Svarte Daedel. Rumph. Gall. La Moresque Day.*



*List. Hist. Conch. l. 4. f. 10. f. 17.*

*Rumph. amb. t. 39. f. 2.*

*Gualt. Test. t. 23. f. P.*

*Seb. Thes. III. t. 53. f. L.*

*Knor. Vergn. V. 28. t. 6. f.*

*Mart. Konch, Kab. II. 45. t. 472, 473. f.*

F. II. 3. *Voluta gibbosa.* F. II. 3. Die dicke  
Schlauchdattel.

*Belg. Sluik - Daadel Mus. Oud. Angl. The clouded Olive. Hill.*  
*Gall. Agate bossue. Mus. Oud.*

Testa ovali ventricosa, co- Die eysförmige dickbäuchige  
lumella callosa, & spirae acu- Schale, hat eine schwüllige  
minatae anfractibus infimis in- Lesze, und aufgetriebene Un-  
crassatis. tergewinde am zugespitzten  
Schnitzel.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 10. f. 2.*

*Petiv. Gaz. t. 19. f. 9.*

*Gualt. Test. t. 24. f. G.*

*Argenv. Conch. Pl. 13. f. M.*

*Hill. Hist. of. Anim. Pl. 8.*

*Knor. Vergn. II. 12. t. 4. f. f.*

— — — V. 4. t. 4. f.

*Mort.*



Mart. Konch. Kab. II. 51. t. 565. 566. f.

Testa ovata, oblonga, ponderosa, glabra. Spira acuminata. Anfractus sulco foveolari distincti, infimi tumidi gibbi. Labium exterius integerrimum, acutum; interius reflexum, tumidum, callosum, supra incrassatum, subtus oblique, sinuatum, emarginatum. Venter extus brunneus, maculis oblongis, & fascia transversa albida. Faux alba.

Die Schale ist länglich eiförmig, schwer und glatt. Der Schnirkel zugespitzt. Die Windungen sind durch eine gefurchte Naht von einander abgesondert, deren untere aufgeschwollen und ungleich. Die äußere Lefze hat einen ganzen scharfen Rand die innere ist übergeschlagen, schwüllig, und oben dick aufgeworfen, unten schief gefurchet, und eingesäunet. Der Leib ist außen braun, mit weißen länglichen Flecken und einem Quersbände. Der Schlund weiß.

F. II. 4. Voluta Ispidula.

F. II. 4. Die Spizdattel.

Linn. S. N. Sp. 400.

Testa subcylindrica laevi, spira conica, suturis acutis, columella incrassata oblique plicata.

Die einigermaßen walzenförmige glatte Schale hat einen glatten kegelförmigen scharfgerandigen Schnirkel, und eine dichte schief gespaltene Spindel,

a albida, brunno maculata.

a weißlich, mit braunen Flecken.

List. Hist. Conch. l. 4. f. 10. f. 12.

Argenv. Conch. Pl. 13. f. Q.

Mart. Konch. Kab. II. 49. t. 526. f.

β alba, maculis undatis fuscis.

β weiß, mit wellenförmigen braunen Flecken.

List.



*List. Hist. Conch. l. 4. f. 10. f. 21.*

*Gualt. Test. t. 23. f. M. 00.*

*Seb. Thes. III. t. 53. f. V.*

*Adans. Seneg. Pl. 4. f. 6. t.*

*Mart. Konch. Kab. II. 46. t. 487. 488. f.*

♀ albidā, maculis venisque fuscis. ♀ lang, mit braunen Flecken, und Adern.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 10. f. 9.*

*Rumph. amb. t. 39. f. 9.*

*Petiv. Gaz. t. 102. f. 18.*

*Knor. Vergn. III. 17. t. 2. f.*

*Mart. Konch. Kab. II. 50. t. 553. f.*

♂ niuea unicolor.

♂ schneeweiß, einfarbig.

*Knor. Vergn. VI. 34. t. 45. f.*

♂ alba, maculis raris, & fascia e weiß, mit seltenen Flecken, und einem Querbande an dem Schnit-  
prope spiram transuersa rufa. tel von rothbrauner Farbe.

*Seb. Thes. III. t. 53. f. X.*

*Mart. Konch. Kab. II. 49. t. 524. 525. f.*

♀ alba parua, undis fuscis tenuissi- ♀ weiß, mit sehr feinen braunen  
mis. Wellen.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 10. f. 22.*

*Mart. Konch. Kab. II. 50. t. 543. 544. f.*

η grisea





7 grisea, parua, lineis angulatis vio- 7 lichtgrau klein mit violeten Wink-  
laceis. feldrügen.

*List. Hist. Conch. t. 4. f. 10. f. 13.*

*Petiv. Gaz. t. 152. f. 6.*

*Mart. Konch. Kab. II. 50. t. 545. 547. f.*

3 castanea.

3 kastanienbraun.

4 fusca alboque maculata.

4 braun, und weiß gefleckt.

*Mart. Konch. Kab. II. 49. t. 537, 538. f.*

5 alba punctis luteis, maculisque 5 weiß, mit gelben Punkten, braun-  
undatis fuscis, fauce violacea. nen Wellen, und einem violeten  
Echlunde.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 10. f. 3.*

*Petiv. Gaz. t. 156. f. 18.*

*Rumph. amb. t. 38. f. 5.*

*Gualt. Test. t. 23. f. T.*

*Mart. Konch. Kab. II. 48. t. 518. 521. f.*

F. III. Quatas, efusca

F. III. Ensförmige, mit ausgeschnittener Mündung.

F. III. I. Voluta bul-  
lata.

F. III. I. Die Blasen-  
walze,

Testa



Testa emarginata, ouata, Die eingesäumte eysförmige  
laeui, spira oblitterata, com- glatte Schale hat einen stumpfen  
planata, columella quadripli- spfen plattgedrückten Wirbel,  
cata. und drey Falten an der Spindel.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. II. f. II.*

*Knor. Vergn. IV. 23. t. I. f. 27. t. I. f.*

Testa ouata laevis. Spira obli-  
rata, complanata. Apertura lanceo-  
lata, extremitatibus subefusis. Co-  
lumella conuexa glabra, subtus pli-  
cata, plicis crassis, obliquis, qua-  
tuor. Labrum obtusum extrorsum  
reflexum, incrassatum. Basis infra  
plicas oblique marginata. Color  
pallide rubescens, fasciis transuer-  
sis obsoletis albis.

Die Schale ist eysförmig, und  
glatt. Der Schnirkel stumpf, und  
plattgedrückt. Die Mündung lanz-  
zettförmig. Die Ende mit unvoll-  
kommenen Auschnitten. Die er-  
habene glatte Spindel hat unten  
vier schief stehende dichte Falten.  
Die äußere Lefze ist stumpf, aus-  
wärts überschlagen, und aufgewor-  
fen. Der Grund hat unter den  
Falten einen schiefen Saum. Die  
Farbe ist blasroth mit matten weißen  
Querbändern.

F. III. 2. Voluta Persi-  
cula.

F. III. 2. Die Kornel-  
firsche.

*Lin. S. N. Sp. 404.*

Testa emarginata laeui, spi-  
ra retuso umbilicata, colu-  
mella septem plicata, labro  
marginato crenato.

Die eingesäumte glatte Scha-  
le ist mit einem stumpfen genabel-  
ten Schnirkel, und an der Spin-  
del mit sieben Falten versehen;  
an der äußern Lefze eingesäumt  
und gekerbet.

se lineis transuerfis fuluis cincta.

„ mit rothgelben Querstrichen.

*Belg. Gebandeerde Kornostje. Gall. La Cornouille fasciée.*

*List.*



*List. Hist. Conch. l. 4. f. 11. f. 9.*

*Petiv. Gaz. t. 8. f. 10.*

*Gualt. Test. t. 28. f. B.*

*Adans. Seneg. Pl. 4. f. 4.*

*Knor. Vergn. VI, 21. t. 6. f.*

*Mart. Konch. Kab. II, 42. t. 419. 420. f.*

β punctis adpersa incarnatis.

β mit fleischrothen Punkten ge-  
set.

*Belg. Gestippelte Kornelkersje. Gall. La Cornouille ponctuée.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 11. f. 10.*

*Petiv. Gaz. t. 8. f. 2.*

*Gualt. Test. t. 28. f. C, D, E.*

*Mart. Konch. Kab. II, 42. t. 421. f.*

F. III. 3. *Voluta margi-  
nata.*

F. III. 3. Die eingesäum-  
te Kornelkirsche.

Testa ovata, spira obsoleta, Die eiförmige Schale hat  
lateribus incrassato margina- einen unvollkommenen Schnir-  
tis, columella quadriplicata. tel, aufgeworfene eingesäumte  
Seiten, und vier Falten an  
der Spindel.

*Mus. Caes. Vindobon.*



Testa ovata, laevis; Spira turbinata, adnata labro incrassato; Latera cincta margine lato, tumido. Columella plicata, plicis crassis obliquis quatuor. Apertura lanceolata, extremitatibus estusis. Color niueus.

Die Schale ist eysförmig, und glatt. Der Schnirkel zugespitzt, und mit der Vorderleiste verwachsen. Die Seiten sind mit einem breiten aufgeworfenen Rande eingefasst. Die Spindel hat vier dicke Quersalten. Die Mündung ist lanzettförmig, an beiden Enden ausgeschnitten. Die Farbe schneeweiß.

F. III. 4. Voluta Faba.

F. III. 4. Die Bohne.

Linn. S. N. Sp. 406.

Belg. Bonje. Angl. Black Speckled Silver Cowrykin. Petiv. Gall. Cocombre pointée.

Testa ovata, laevi, -spirae mucronatae anfractibus plicatis, columella quadriplicata.

Die Schale ist eysförmig, und glatt, ihr Schnirkel zugespitzt, und gefalten.

Color glaucus, punctis oblongis fuscis, per series longitudinales pictis.

Die Farbe ist fahl, mit nach der Länge stehenden Reihen länglicher brauner Punkten bemalt.

Petiv. Gaz. t. 10. f. 5.

Gualt. Test. t. 28. f. Q.

Adans. Seneg. Pl. 4. f. 2.

Knor. Vergn. IV. 17. t. 6. f.

Mart. Konch. Kab. II. 42. t. 432. 433. f.

F. III. 5. Voluta glabella.

F. III. 5. Die glatte Gurke.

Linn. S. N. Sp. 407.

Belg.



Belg. Pruim. Gall. La Prune.

Testa ouata lacui, mucro- Die eysförmige, glatte, spiz-  
nata, columella quatriplica- wieblige Schale, hat an der  
ta, labro incrassato, reflexo. Spindel vier Falten, und eine  
verdickte, übergeschlagene Scha-  
lenlesze.

Bonan. Recr. cl. 3. f. 326.

Gualt. Test. t. 28. f. L.

Adans. Seneg. Pl. 4. f. 3.

Knor. Vergn. IV. 21. t. 3, 4. f.

Mart. Konch. Kab. II. 42. t. 422. 423. f.

F. III. 6. Voluta merca-  
toria.

F. III. 6. Das brüten-  
de Taubchen.

Linn. S. N. Sp. 409.

Belg. Broedende Duifje. Gall. Le Pigeon couvant.

Testa ouata, transuersim Die eysförmige Schale ist  
striata; columella retusa, la- in die Quere gestreiset, an der  
broque denticulatis. stumpfen Spindel, wie auch  
an der äußern Lesze gezäh-  
nelt.

List. Hist. Conch. l. 4. f. II. f. 42.

Petiv. Gaz. t. 9. f. 4.

Gualt. Test. t. 43. f. 7. L.

O

Adans.





*Adans. Seneg. Pl. 9. f. 29.*

*Knor. Vergn. IV. 12. t. 5. f.*

— — — VI. 16. t. 6. 7. f. 18. t. 3. f.

*Mart. Konch. Kab. II. 44. t. 452. — 458. f.*

F. III. 7. *Voluta rustica.* F. III. 7. Der Oliven-  
fern.

*Linn. S. N. Sp. 410.*

*Belg. Boetje.*

*Testa ovata, laevi, spira* Die eiförmige, glatte, spiz-  
*mucronata; columella, labro-* wirblice Schale ist an der  
*que denticulatis.* Spindel, und äußeren Resse  
gezähnt.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 11. f. 48, 49.*

*Petiv. Gaz. t. 30. f. 6.*

*Gualt. Test. t. 43. f. E. G. H.*

*Adans. Seneg. Pl. 9. f. 28.*

*Knor. Vergn. VI. 18. t. 4. f.*

*Mart. Konch. Kab. II. 44. t. 469. f.*

F. III. 8. *Voluta pau-* F. III. 8. Das arme  
*percula.* Weibchen.

*Linn. S. N. Sp. 411.*

*Gall. La Mignature.*

*Testa*



Testa ouata oblonga, laeui,  
columella quatriplicata, la-  
bro obtuso.

Die eyförmige längliche  
Schale, hat vier Falten an  
der Spindel, und eine stumpfe  
Schalenlefze.

Color fuscus, aut ferrugineus, fasciis longitudinalibus albidis.

Braun, oder eisenrothig, mit weißlichen nach der Länge laufenden Bändern.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. II. f. 35.*

*Gualt. Test. t. 54. f. L.*

*Knor. Vergn. IV. 26. t. 5. f.*

*Mart. Conch. Kab. IV. 149. t. 1386. f.*

F. III. 9. Voluta mendicaria.

F. III. 9. Das traurende Taubchen.

*Linn. S. N. Sp. 412.*

Testa ouata, transuersim  
tenuissime striata, spira coronata;  
columella complanata,  
labroque denticulatis.

Die eyförmige, in die  
Quere fein gestreifte Schale,  
ist an dem Schnirkel mit Hörnern,  
an der platt gedrückten  
Spindel, und der Schalenlefze  
mit Zähnen besetzt

Atra, fasciis transuersis tribus  
albis.

Schwarz mit drey weißen Quer-  
bändern.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. II. f. 47.*



*Petiv. Gaz. t. 11. f. 5.*

*Gualt. Test. t. 52. f. E.*

*Knor. Vergn. IV. 16. t. 3. f.*

*Mart, Konch. Kab. II. 44. t. 460, 461. f.*

F. III. 10. Voluta cancellata.

F. III. 10. Die netzförmige Faltschnecke.

*Linn. S. N. Sp. 413.*

Testa ovata, striis elevatis transuersis, plicisque obliquis reticulatim intertexta, columella umbilicata, biplicata, contorta.

Die eiförmige Schale ist mit erhabenen Streifen, und schiefen Falten netzförmig überzogen, und mit einer durchbohrten, zweymal gefalteten, verdrehten Spindel versehen

*Gualt. Test. t. 48. f. B. C.*

*Seb. Thes. III. t. 49. f. 45. 46. 48.*

*Adans. Seneg. Pl. 8. f. 16.*

*Knor. Vergn. IV. 5. t. 5. f. ?*

*Mus. Caes. Vindobon.*

F. IV. Fusiformes, marginatae, effusae.

F. IV. Spindelförmige, eingesäumte, mit ausgeschnittener Mündung.

F. IV. 1. Voluta filosa.

F. IV. 1. Die Schnurwalze.

Testa



Testa fusiformi tenuissime Die spindelförmige Schale  
reticulato striata, cingulis ele- ist mit sehr feinen Strichen netz-  
uatis transversis columella förmig gezeichnet, mit erhabenen  
quatriplicata, labro crenato. Querschnüren umgürtet, an  
der Spindel mit vier Falten ver-  
sehen, an der Schalenleiste ge-  
kerbt.

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa fusiformis, striis minu- Die Schale ist spindelförmig,  
tissimis incis reticulata, cingulis mit sehr feinen Strichen besetzt,  
fili formibus elevatis, remotis, und schnurformigen erhabenen,  
tris duodecim, anfractuum quatuor. Quergürteln umgeben, deren zwölf  
Columella umbilicata, replicata, den Leib, vier die Gewinde umge-  
plicis elevatis obliquis quatuor. ben. An der genabelten, und über-  
labrum acutum, sub cingulis sul- geschlagenen Spindel sind vier er-  
catum. Basis effusa, extus margina- habene schiefe Falten. Die äußere  
ta. Color albus, cingulorum ru- Leiste ist scharfrandig, unter den  
fus, Schnüren gefurcht. Der Grund  
ausgeschnitten und außen einge-  
saunt. Die Farbe weiß, mit roth-  
braunen Schnüren.

Die Schale ist spindelförmig,  
mit sehr feinen Strichen besetzt,  
und schnurformigen erhabenen,  
Quergürteln umgeben, deren zwölf  
den Leib, vier die Gewinde umge-  
ben. An der genabelten, und über-  
geschlagenen Spindel sind vier er-  
habene schiefe Falten. Die äußere  
Leiste ist scharfrandig, unter den  
Schnüren gefurcht. Der Grund  
ausgeschnitten und außen einge-  
saunt. Die Farbe weiß, mit roth-  
braunen Schnüren.

F. IV. 2. Voluta Sca-  
bricula.

F. IV. 2. Die rauhe  
Nadelwalze.

*Linn. S. N. Sp. 417.*

*Belg. Rauwe Pen - hoorn.*

Testa fusiformi, striis eleva- Die spindelförmige Scha-  
tis transversis, longitudinali- le hat erhabene Querstreife, und  
bus incis, columella qua- nach der Länge laufende einge-  
triplicata, labro crenato. schnittene Striche, eine gekerb-  
te Schalenleiste und vier Quers-  
falten.

Die spindelförmige Scha-  
le hat erhabene Querstreife, und  
nach der Länge laufende einge-  
schnittene Striche, eine gekerb-  
te Schalenleiste und vier Quers-  
falten.



Gualt. Test. t. 53. f. D.

Knor. Vergn. III. 27. t. 3. f.

Mart. Konch. Kab. IV. 149. t. 1389. f.

F. IV. 3. Voluta Sanguifuga.

F. IV. 3. Die Schonnadel.

Linn. S. N. Sp. 419.

Testa fusiformi, longitudinaliter sulcata, striis incisissimis transuersis, columella quadruplicata, labro laevi.

Die spindelförmige Schale ist der Länge nach geschnitten, in die Quere mit eingeschnittenen Strichen besetzt, ihre Spindel vierfach gefaltet, die Schalenleiste glatt.

List. Hist. Conch. l. 4. f. 11. f. 38.

Rumph. amb. t. 29. f. V.

Petiv. Gaz. t. 4. f. 5.

Gualt. Test. t. 53. f. F.

Argenv. Conch. Pl. 9. f. V.

Seb. Thes. III. t. 49. f. 11. 12.

Regenf. Samml. I. 12. t. 5. f.

Knor. Vergn. IV. 11. t. 3. f.

Mart. Konch. Kab. IV. 148. t. 1367. f.

F. IV. 4. Voluta castra.

F. IV. 4. Die braune Brandnadel.

Linn. S. N. Sp. 420.





Testa fusiformi, laevi, spirae anfractibus longitudinaliter rugosis, columella quatriplicata.

Testa fusiformi, laevi, spirae anfractibus longitudinaliter rugosis, columella quatriplicata.

Gualt. Test. t. 53. f. E.

*Seb. Thes. III. t. 49. f. 21, 22.*

*Knor. Vergn. V. 19. t. 4. f.*

*Mar. Konch.* Kab, IV. 148. t. 1369. f.

F. IV. 5. Voluta Vul-  
pecula.

F. IV. 5. Der Fuchst-  
thurnt.

*Linn. Syst. N. Sp.* 423.

Belg. Toornje. Rumph.

Testa fusiformi longitudina-  
bus angulata, striis transuer-  
fis incis, columella quatri-  
plicata.

Testa fusiformi longitudina- Die spindelförmige Schale  
bus angulata, striis transuer- hat nach der Länge herablau-  
fis incisis, columella quatri- fende Ecken und eingeschnitte-  
plicata. ne Querstriche, mit einer vier-  
fach gefalteten Spindel.

List. Hist. Conch. l. 4. f. II. f. 39.

*Petiv. Gaz. t. 56. f. 1.*

Rumph. amb. t. 29. f. R.

*Valent. Abb. 2. t. 10. f.*

*Gualt. Test. t. 54. f. B.*

Knorr. Vergn. V. 16, t. 3. f.

*Mart. Konch. Kab. IV, 148, t. 1366. f.*



F. IV. 6. *Voluta plicaria*.

F. IV. 6. Die knotige Bandnadel.

*Linn. S. N. Sp. 424.*

Belg. Genobelde Band - Pen. Gall. Le Minaret. Dav.

*Testa fusiformi, angulis aptice subspinosis, columella quatriplicata, labro laevi.*

Die spindelförmige Schale hat vorne zugespitzte Ecken, vier Falten an der Spindel, und eine glatte Schalenleiste.

*Bonn. Recr. el. 3. f. 64.*

*Gualt. Test. t. 54. f. F.*

*Argenv. Conch. Pl. 9. f. Q.*

*Seb. Thes. III. t. 49. f. 23, 24.*

*Knor. Vergn. I. 15. t. 5, 6. f.*

— — — III. 27. t. 4. f.

*Mart. Kouch. Kab. IV, 148. t. 1362. 1363. f.*

F. IV. 7. *Voluta pertusa*.

F. IV. 7. Die durchgestochene Nadel.

*Linn. S. N. Sp. 424.*

Belg. Monniks Kappe.

*Testa fusiformi, striis punctatis transuersim pertusa, columella quinqueplicata.*

Die spindelförmige Schale hat aus durchstochenen Punkten bestehende Streifen, und fünf Falten an der Spindel.

*List.*



*List. Hist. Conch. l. 4. f. 11. f. 65.*

*Gualt. Test. t. 54. f. H.*

*Seb. Thes. III. t. 50. f. 28. 47. 48.*

*Knor. Vergn. IV. 28. t. 3. f.*

*Mart. Konch. Kab. IV. 147. t. 1358. 1359. f.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

F. IV. 8. *Voluta Mitra episcopalis.* F. IV. 8. *Die Bischofs-  
mütze.*

*Linn. S. N. Sp. 425.*

*Belg Penne hoorn. Rumph. Angl. The Bishops - Miter Shell.*  
*Hill. Gall. La tiare episcopale. Argenv.*

*Testa fusiformi, laevi, co-* Die spindelförmige glatte  
*lumella quatriplicata.* Schale hat an der Spindel  
vier Falten.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 120.*

*Rumph. amb. t. 29. f. K.*

*Petiv. amb. t. 13. f. 11.*

*Gualt. Test. t. 53. f. G.*

*Argenv. Conch. Pl. 9. f. G.*

*Regenf. Samml. I. 5. t. 33. f.*

*Hill. Hist. of. Anim. Pl. 7.*

*Knor. Vergn. I. 6. t. 2. f.*

*Mart. Konch. Kab. IV. 147. t. 1360. f.*

F. IV. 9. *Voluta Mi-* F. IV. 9. *Die Pabst-  
tra papalis.* krone,



*Linn. S. N. Sp. 426.*

*Belg. De Paus - Krone. Rumph. Angl. The papal - Crown. Da Cost. Gall. La tiare papale. Dav.*

Testa fusiformi, anfractibus coronatis, labro denticulato, columella quatriplicata. Die spindelförmige Schale hat gekrönte Windungen, eine gezähnelte Schalenleiste, und vier Falten an der Spindel.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 119.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 11. f. 66 - 68.*

*Rumph. amb. t. 29. f. 7.*

*Petiv. amb. t. 9. f. 15.*

*Gualt. Test. t. 53. f. 7. L.*

*Argenv. Conch. Pl. 9. f. E.*

*Seb. Thes. III. t. 51. f. 1. — 5, 37.*

*Regenf. Samml. I. 1. t. 1. f.*

*Knor. Verg. I. 6. t. 1. f.*

*Da Cost. Elem. Pl. 4. f. 3.*

*Mart. Konch. Kab. IV. 147. t. 1353. 1354. f.*

F. IV. 10. Voluta Mufica.

F. IV. 10. Die Notenschnecke.

*Linn. S. N. Sp. 427.*

*Belg. Mufiek - hoorn. Angl. The Mufik Shell. Hill. Gall. La Mufique Dav.*

Testa marginata, anfractibus obtuse spinosis, columella octoplicata. Die eingesäumte Schale ist auf den Gewinden mit stumpfen Stacheln, und an der Spindel mit acht Falten besetzt.

*Bonan.*



*Bonan. Recr. cl. 3. f. 296. 297.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. II. f. 14.*

*Gualt. Test. t. 28. f. Z.*

*Argenv. Conch. Pl. 14. f. F.*

*Klein. Meth. Ostr. t. 5. f. 88.*

*Seb. Thes. III. t. 57. f. 7 — 19. 20.*

*Hill. Hist. of. Anim. Pl. 8.*

*Knor. Vergn. I. 23. t. I. f.*

—— ——— III. 12. t. I. f.

*Murray. Fund. Test. t. I. f. 17.*

*Müll. Linn. Nat. Syst. VI. I. B. 14. t. 5. f.*

*Mart. Konch. Kab. III. 96. t. 926. 929. f.*

F. IV. 11. *Voluta Vespertilio.*

F. IV. 11. *Die Fledermaus.*

*Linn. S. N. Sp. 428.*

*Belg. De Vleermuis. Klein. Angl. Long Batt Music Stamper. Pet. Gall. Chauve Souris. Dav.*

*Testa marginata, anfractibus acute spinosis, columella quatriplicata.*

*Die eingesäumte Schale hat spizige Stacheln auf den Gewinden, und eine viermal gefaltene Spindel.*

\* *spinis breuibus.*

\* *mit kurzen Stacheln.*

*List.*





*List. Hist. Conch. l. 4. f. 11. f. 16.*

*Rumph. amb. t. 32. f. 7.*

*Petiv. amb. t. 15. f. 12.*

*Valent. Abh. I. t. I. f. 3; 7. t. 62. f.*

*Gualt. Test. t. 29. f. F, G, H, V.*

*Seb. Thes. III. t. 57. f. 4, 5.*

*Knor. Vergn. II. 6. t. 4. f.*

*Mart. Konch. Kab. III. 98. t. 938, 939. f.*

♂ spinis acutis rectis.

♂ mit spitzigen geraden Stacheln.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 11. f. 17.*

*Petiv. Gaz. t. 70. f. 10.*

— amb. t. 15. f. 8.

*Gualt. Test. t. 28. f. 7. M.*

*Klein. Meth. Ostr. t. 5. f. 89.*

○ *Seb. Thes. III. t. 67. f. 1-5.*

*Knor. Vergn. I. 22. t. 3. f.*

— *Delic. nat. I. t. B. VI. f. 5.*

*Mart. Konch. Kab. III. 98. t. 937. f.*

♀ maxima, spinis acutis incurvis. ♀ sehr groß mit spitzigen gekrümmten Stacheln.

*Mart. Konch. Kab. III. 97. t. 934, 935. f.*



F. IV. 12. Voluta he-  
braea.

F. IV. 12. Die wilde  
Musik.

Linn. S. N. Sp. 429.

Belg. De wilde Musyk - hoorn. Angl. The oriental Music. Gall.  
E'hebraique Dav.

Testa ovata, anfractibus acu- Die eysförmige Schale hat  
te spinosis, plicis quinque an den Gewinden spizige Sta-  
crassioribus, tribusque obso- cheln, und an der Spindel  
letis. fünf starke, und fünf schwächer  
re Falten.

Bonan. Recr. cl. 3. f. 293.

List. Hist. Conch. l. 4. f. 11. f. 18.

Rumph. amb. t. 32. f. L.

Petiv. amb. t. 15. f. 12.

Gualt. Test. t. 28. f. T.

Argenv. Conch. Pl. 14. f. D.

Seb. Tbes. III. t. 57. f. 1 - 3, 6.

Knor. Vergn. I. 24. t. 1, 2. f.

—— — VI. 15. t. 1. f.

Mart. Conch. Kab. III. 96. t. 924. 925. f.

F. IV. 13. Voluta Ca-  
pitellum.

F. IV. 13. Die Base.

Belg. Witte Vaas, Angl. The white Music, Gall. L' Aigrette. Dav.

Testa



Testa ovata, nodosa, rugosa, columella triplicata, basi umbilicata.

Die eysförmige, knotige, runzelichte Schale hat drey Falten an der Spindel, und am Grunde eine nabelsförmige Vertiefung.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 11. f. 19.*

*Gualt. Test. t. 37. f. A.*

*Argenv. Conch Pl. 15. f. K.*

*Seb. Thes. III. t. 49. f. 76.*

*Knor. Vergn. VI. 35. t. 1. f.*

*Mart. Konch. Kab. III. 99. t. 947. 948. f.*

F. IV. 14. Voluta muricata.

F. IV. 14. Die rothmündige Vase.

*Belg. Capitaale Schwitzersbroek.*

Testa plicata, spinisque muricata, columella quinque plicata, perforata.

Die gefaltene und stachelichte Schale hat fünf Falten an der durchbohrten Spindel.

*Mart. Konch. Kab. III. 99. t. 949. 950. f.*

Testa ponderosa, transversim fulcata, sulcis acutis alternatim aequalibus. Spira conica, nodosa. Anfractus, ventrisque basis spinosa; spinis conicis, fornicatis, obtusis.

Die Schale ist schwer, in die Quere gefurchet, mit scharfen wechselweise ungleichen Furchen besetzt. Der Schnitzel kegelförmig und knotig. Die Gewinde, und der

Aper-



Apertura oblonga. Labrum exte-  
rius denticulatum, subtus plicatum.  
Columella laevis, rugis transuer-  
sis tribus majoribus, duabus alter-  
nis minoribus. Basis perforata; Co-  
lor albus, aperturae roseus.

Grund des Leibes sind stachelicht:  
die Stachel kegelförmig, hohl und  
stumpf. Die Mündung länglich.  
Die Schalenlesze ist gezähnt, un-  
ten gefalten. Die Spindel glatt,  
mit fünf größeren, und zwei klei-  
neren Falten. Der Grund ist durch-  
bohret. Die Farbe weiß, die Mün-  
dung rosenroth.

F. IV. 15. *Voluta ce-  
ramica.*

F. IV. 15. Die gezafte  
Bafe.

*Linn. S. N. Sp. 432.*

*Belg. Getakte Swizers-broeck. Rumph. Angl. Ceram Spuc Shell.  
Petiv. Gall. Chauffe-Trape.*

Testa utrinque acuminata,  
spinis diuergentibus, colu-  
mella quinque plicata.

Die an beiden Enden zu-  
gespizte Schale ist mit aus-  
gebreiteten Stacheln besetzt, und  
an der Spindel mit fünf Fal-  
ten versehen.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 368.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. II. f. 51.*

*Rumph. amb. t. 24. f. A. t. 49. f. L.*

*Petiv. amb. t. II. f. 13.*

*Gualt. Test. t. 55. f. D.*

*Argenv. Conch. Pl. 15. f. E.*

*Knor. Vergn. II. 2. t. 2. f.*

— — VI. 35. t. 2. f.

*Mart. Konch. Kab. III. 99. t. 943. . f.*

F. V.



F. IV. 16. *Voluta Pyrum*.

F. IV. 16. Die Birnwalze.

Belg. Witte offerhoorn. Angl. Gall. La rave. Dav.

Testa pyriformi, rostrata, ponderosa, columella tri-quatriplicata.

Die birnförmige schwere Schale ist mit einem Schnabel, und drey bis vier Falten an der Spindel besetzt.

α major, alba, columella triplicata.

α größer, weißer, mit drey-mal gefaltener Spindel.

Bonan. Recr. cl. 3. f. 194.

List. Hist. Conch. l. 4. f. 11. f. 25.

Rumph. amb. t. 36. f. 7.

Gualt. Test. t. 46. f. C.

Knor. Vergn. VI. 39. t. 1. f.

Mart. Konch. Kab. III. 95. t. 916. f.

β minor, fuscopunctata, columella quatriplicata.

β kleiner, braunpunktiert, mit vier-mal gefaltener Spindel.

List. Hist. Conch. l. 4. f. 11. f. 26.

Klein. Meth. Ostr. t. 4. f. 49.

Knor. Vergn. VI. 22. t. 2. f.

Mart. Konch. Kab. III. 95. t. 917. 918. f.

F. V.





F. V. Ventricosae.

F. V. Bäuchige.

F. V. I. Voluta aethiopica.

F. V. I. Die Möhrenfron.

*Linn. S. N. Sp. 435.**Belg. Gekroonde Bak. Rumph. Angl. Ceram Coronnet. Petiv. Gall. Couronne d' Ethiopie. Dav.*

Testa ovata ventricosa, spiraculata coronata spinis fornicatis, apice papillari, columella quatriplicata.

Die eysförmige bäuchige Schale ist an dem Schnirkel mit hohlen Stacheln, und einer warzenförmigen Spitze versehen, mit vier Falten an der Spindel.

α spinis fornicatis erectis.

α mit hohlen aufgerichteten Stacheln.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. I.**List. Hist. Conch. l. 4. f. II. f. 4.**Rumph. amb. t. 31. f. B.**Petiv. amb. t. 7. f. 5.**Gualt. Test. t. 29. f. H.**Seb. Thes. III. t. 64. f. 4.**Knor. Vergn. II. 4. t. 1. f.**—— Del. nat. I. t. B. 6. f. 2.**Mart. Konch. Kab. III. 73. t. 778. 779. f.*

β spinis fornicatis decumbentibus. β mit darniederliegenden hohlen Stacheln.

*Rumph. amb. t. 31. f. A.**Petiv. amb. t. 3. f. 13.*

P

*Gualt.*



*Gualt. Test. t. 29. f. 7.*

*Seb. Thes. III. t. 64. f. 2.*

*Müll. Linn. Nat. Syst. VI. 1. B. 15. t. 1. f.*

*Mart. Konch. Kab. III. 75. t. 785. f.*

♂ spinis obsoletis.

♀ mit unvollkommenen Stacheln.

*Knor. Vergn. V. 8. t. 1. f.*

*Mart. Konch. Kab. III. 72. t. 772. 773. f.*

F. V. 2. *Voluta Cymbium.* F. V. 2. *Die Gondel.*

*Linn. S. N. Sp. 436.*

*Belg. Jacobs-Kruck. Engl. Clouded Meion. Gall. Cuiller de Neptune. Dav.*

*Testa ventricosa, anfractibus canaliculatis, acute marginatis, apice papillari, columella quadriplicata.* Die bäuchige Schale hat rinnenartige scharfrandige Geginde mit einer warzenartigen Spitze, und vier Falten an der Spindel.

*Bonan. Recr.-cl. 3. f. 6.*

*List. Hist. Conch. 1. 4. f. 11. f. 6.*

*Gualt. Test. t. 29. f. B.*

*Adans. Seneg. Pl. 3. f. 2.*

*Seb.*



*Seb. Thes. III. t. 65. f. 5, 6; t. 66. f. 5.*

*Knor. Vergn. II. 30. t. 1. f.*

—— ——— *V. 28. t. 1. f.*

—— *Delic nat. I. t. 6. f.*

*Mart. Konch. Kab. III. 70. t. 762. - 765. f.*

F. V. 3. Voluta Olla.

F. V. 3. Der Topf.

*Linn. S. N. Sp. 437.*

*Belg. Teepel bak. Valent. Angl. The Melon Tun. Da. Cost. Gall. Tasse de Neptune, Dav.*

Testa ovata ventricosa, spi- Die eysförmige bäuchige  
rae anfractibus canaliculato Schale hat gewölbte ausge-  
conuexis, columella bi-tri- fehlte Windungen, und zwei  
plicata. bis drey Falten an der Spin-  
del.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 2.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 11. f. 1.*

*Gualt. Test. t. 29. f. A.*

*Argenv. Conch. Pl. 17. f. G.*

*Adans. Seneg. Pl. 3. f. 1.*

*Klein. Meth. Ostr. t. 5. f. 97.*

*Seb. Thes. III. t. 66. f. 18.*



*Knorr, Vergn. V. 28. t. 7. f.*

— — — *VI. 22. t. 2. f.*

*Mart, Konch. Konch III. 71. t. 766. f.*

*Da Cost. Elem. Pl. 4. f. 9.*

## G. Buccinum.

## G. Das Kinkhorn.

*Linn. Syst. Nat. Gen. 323.*

Testa spiralis; apertura effusa desinens in canalum retusum; labium explanatum.

Die schnirkelförmig gewundene Schale hat eine eingeschnittene Mündung, die in eine kurze Rinne ausläuft; und eine ausgebreitete Schalenleiste.

G. I. Ampullacea, inflata.

G. I. Flaschenartige, aufgeblasene.

G. I. I. Buccinum Galea

G. I. I. Das Schellenhorn.

*Linn. S. N. Sp. 439.*

*Belg. Geribde Belhoorn. Gall. Tonne cannelée Dav.*

Testa subrotunda inflata, sulcis transversis, linea elevata interstinctis, labro edentulo.

Die rundliche aufgeblasene Schale ist mit Quersfurchen besetzt, dazwischen mit einer erhabenen Linie umgürtet, und an der äußern Lippe ohne Zahn.

*Gi-*



Bonan. Recr. cl. 3. f. 183.

List. Hist. Conch. l. 4. f. 13. f. 18.

Gualt. Test. t. 42. f. A. A.

Ginan. adr. II. t. 12. f. 93.

Mart. Konch. Kab. III. 116. t. 1070. f.

G. I. 2. Baccinum Per-  
dix.

G. I. 2. Das Rebhuhn.

Linn. S. N. Sp. 440.

Belg. Patrys - hoorn. Angl. Indian Partridge Shell. Hill. Gall.  
Le Perdix. Argenv.

Testa ovata inflata, trans- Die eysförmige aufgeblasene  
versum sulcata, albo maculata, Schale ist in die Quere gefur-  
labro edentulo. chet, mit weißlichen Flecken,  
und ungezählter äußerer Lippe.

Bonan. Recr. cl. 3. f. 191.

List. Hist. Conch. l. 4. f. 15. f. 43.

Petiv. Gaz. t. 153. f. 13.

— amb. t. 4. f. 11.

Rumph. amb. t. 27. f. C.

Gualt. Test. t. 51. f. F.

Argenv. Conch. Pl. 17. f. A.

Adans. Seneg. Pl. 7. f. 5.

Seb. Tbes. III. t. 68. f. 12, 13, 16.

Hill. Hist. of. Anim. Pl. 8.

Knor. Vergn. III. 8. t. 1. f.

Mart. Konch. Kab. III. 117. t. 1078, 1079. f.





G. I. 3. Buccinum Po-  
mum.

Linn. S. N. Sp. 441.

G. I. 3. Die dicklippige  
Sturmhaube.

Belg. Diklipige Olyhoorn. Rumph. Angl. Thik lip'd Partridge.  
Petiv. Gall. Perdrix a grosse levre. Dav.

Testa ovata, inflata, trans-  
verse sulcata, apertura den-  
tata.

Die eysförmige aufgeblasene  
Schale ist in die Quere ges-  
furchet, und an der Mündung  
ungezähnel.

Albo fulvoque maculata, fulcis  
concauis, spira breui.

Weiß- und rothbraun gefleckt, mit  
hohlen Furchen, und kurzem Schnir-  
fel.

Rumph. amb. t. 27. f. B.

Petiv. amb. t. 12. f. 6.

Gualt. Test. t. 51. f. C.

Argenv. Conch. Pl. 17. f. L.

Seb. Thes. III. t. 70. f. 2 — 4.

Knor. Vergn. VI. 23. t. 2. f.

Mart. Konch. Kab. II. 36. t. 370. 371. f.

G. I. 4. Buccinum ful-  
cosum.

G. I. 4. Die gefurchte  
Sturmhaube.

Testa ovata, inflata, trans-  
versim sulcata, labio explana-  
to granuloso.

Die eysförmige aufgeblasene  
Schale ist in die Quere gesfur-  
chet, und an der ausgebreite-  
ten Spindelstelle mit Körnern  
besetzt.

Seb.



*Seb. Tbes. III. t. 68. f. 15. 17.*

*Ginan. adr. II. t. 5. f. 44.*

*Mart. Konch. Kab. III. 118. t. 1081. f.*

Testa ovata inflata ponderosa, fulcis numerosis transuersim cincta. Anfractus contingui Spira acuminata, reticulatim striata. Labrum plicatum. Labium explanatum, punctis eleuatis scabrum. Basis desinens in canalem recuruum, ascendentem. Color albidus, fasciis transuerlis rufis.

Die Schale ist eiförmig, aufblasen, und der Quere nach mit vielen Furchen umgürtet. Die Gewinde berühren einander. Der zugespitzte Schnirkel ist nezförmig gestreift. Die Schalenlesze gefalten. Die Spindellessze ausgebreitet und mit erhabenen Rörnern besetzt. Der Grund verliert sich in eine krumme aufgerichtete Röhre. Von weißer Farbe, mit rothbraunen Querbändern.

G. I. 5, Buccinum Dolum.

G. I. 5. Das Faß.

*Linn. S. N. Sp. 442.*

*Belg. Geplekte Belhoorn. Angl. Great spat rib'd Partridge. Pet. Gall. Tonne dentelée. Dav.*

Testa rotundata ventricosa, cingulis eleuatis, fulcisque remotis transuerlis, rostro prominulo, labro dentato.

Die rundliche bäuchige Schale ist mit erhabenen Gürteln, und breiten Furchen der Quere nach umgeben, mit einem hervorragenden Schnabel, und gezähnter Lesze versehen.

Albida cingulis albo fuscoque articulatis.

Weiß, mit weiß und braun unterbrochenen Gürteln.



α *fulcis obtusis latis.*

α *mit stumpfen breiten Furchen:*

β *fulcis linea eleuata interstinctis.* β *mit Furchen, die mit einer erhabenen Linie unterbrochen sind.*

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 17, 25.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 13. f. 19.*

*Petiv. Gaz. t. 99. f. 11.*

— *amb. t. 12. f. 5.*

*Rumph. amb. t. 27. f. A.*

*Gualt. Test. t. 39. f. E.*

*Argenv. Conch. Pl. 17. f. C.*

*Adans. Seneg. Pl. 7. f. 6.*

*Hill. Hist. of. Anim. Pl. 8.*

*Seb. Thes. III. t. 68. f. 9 t. 89. f. H, J, P.*

*Knor. Vergn. III. 8. t. 4. f.*

*Mart. Konch. Kab. III. 117. t. 1073. 1074. f.*

G. II. *Cassidea, rostro recuruo.*

G. II. *Sturinhauben, mit umgebogenen Schnabel.*

G. II. I. *Buccinum echinophorum.*

G. II. I. *Die Knotenschelle.*

*Linn. S. N. Sp. 443.*

*Belg. Geknobbelte Belhoorn Rumph. Angl. Knot-listed Kasket.*  
*Petiv. Gall. Casque tuberculé.*



Testa rotundata, cingulis Die rundliche Schale hat  
tuberculatis, rostro ascenden- knotige Gürteln, und einen  
te, aufgerichteten Schnabel.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 18. 19.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 15. f. 68.*

*Rumph. amb. t. 27. n. 1.*

*Petiv. amb. t. 7. f. 14.*

*Argenv. Conch. Pl. 17. f. P.*

—— Zoom. Pl. 3. f. H.

*Seb. Thes. III. t. 68. f. 18.*

*Ginan. adr. II. t. 5. f. 43.*

*Knör. Vergn. I. 17. t. 1. f.*

*Müll. Linn. Nat. Syst. VI. I. B. 16. t. 1. f.*

*Dr Cost. Elem. Pl. 4. f. 8.*

*Mart. Konch. Kab. II. 41. t. 407, 408. f.*

G. II. 2. *Buccinum cor-  
nutum.*

G. II. 2. Die gestricke-  
te Sturmhaube.

*Linn. S. N. Sp. 445.*

Belg. Gebreide Stormhoed. *Rumph. Angl. Knot liked Kasken.*  
*Petiv. Gall. Casque tricoté. Dav.*

Testa turbinata reticulata, Die verkehrt kegelförmige  
tuberculis spinosis, apertura neartig gestricke Schale hat  
dentata, knotige Stachelgürteln, und  
eine gezähnte Mündung.



*Bohan. Recr. cl. 3. f. 155.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 15. f. 73.*

*Petiv. Gaz. t. 151. f. 9.*

*Rumph. amb. t. 23. f. A.*

*Gualt. Test. t. 40. f. D.*

*Seb. Thes. III. t. 73. f. 7, 8, 17, 18.*

*Knor. Vergn. III. 2. t. 1. f.*

*Mart. Konch. Kab. II. 33. t. 348. 349. f.*

G. II. 3. Buccinum ru-  
fum.

G. II. 3. Die rothe  
Sturmhaube.

*Linn. S N. Sp. 446.*

*Belg. Roode Stormhoed. Rumph. Angl. Red Kasket - Shell. Pet. Gall, Le turban rouge. Argenv.*

Testa ovata striata, cingu-  
lis nodosis, striis geminis in-  
terstinctis; apertura dentata,  
cauda recurva.

Die eysförmige gestreifte  
Schale hat knotige Gürteln,  
und dazwischen gepaarte Strei-  
fen, mit gezähnter Mündung,  
und gekrümmten Schnabel.

*Rumph. amb. t. 23. f. B.*

*Petiv. amb. t. 5. f. 5.*

*Gualt. Test. t. 40. f. F.*

*Seb. Thes. III. t. 73. f. 3, 6.*

*Regenf.*





*Regenf. Samml. I. 12. t. 69. f.*

*Knor. Vergn. H. 9. t. 2. f.*

*Mart. Konch. Kab. III. 52. t. 341. f.*

G. II. 4. Buccinum ru-  
berosum.

G. II. 4. Die Knoten-  
sturmhäube.

*Linn. S. N. Sp. 447.*

*Belg. Volvvasse turkische Papierkasket. Angl. The persian Wheelk.  
Gall. Casque triangulaire. Dav.*

Testa ouata, albido fuscoque varia, cingulis tribus tuberculatis, rostro recuruo. Die eysförmige, weiß- und braun gefleckte Schale hat drey knotige Reihen, und einen umgebogenen Schnabel.

*Petiv. Gaz. t. 153. f. I.*

*Gualt. Test.. t. 51.*

*Seb. Thes. III. t. 73. f. II, 14.*

*Knor. Vergn. III. 10. t. 1, 2. f.*

*Mart. Konch. Kab. II. 34. t. 359, f. 38. t. 381. 382 f.*

G. II. 5. Buccinum flam-  
meum.

G. II. 5. Das attalische  
Kleid.

*Linn. S. N. Sp. 448.*

*Belg.*



Belg. Geribd westindische Stoumhoedje. Klein. Gall. Drap d'argent  
Ital. Drappo d'argento. Ron.

Testa ovata longitudinali- Die eysförmige nach der Län-  
ter plicata, cingulis aliquot ge gefaltene Schale hat einige  
tuberculatis, rostro incurva- Knotengürteln, und einen ge-  
to. krümmten Schnabel.

Bonan. Recr. cl. 3. t. 161.

List. Hist. Conch. l. 4. f. 15. f. 72.

Rumph. amb. t. 23. n. 2.

Valent. Abb. t. 11. f. 99, 100.

Seb. Thes. III. t. 73. f. 19. 20.

Knor. Vergn. IV. 4. t. 1. f.

Mart. Conch. Kab. II. 34. t. 353, 354. f.

G. II. 6. Buccinum pul-  
lum.

G. II. 6. Die Papier-  
haube.

Belg. Turks - Papier zonder Lippen. Angl. Feather - Stamper.  
Petiv. Gall. Casque plume. Dav.

Testa ovata oblonga, cin- Die eysförmige längliche  
gulis transuersum striatis, la- Schale hat gestreifte Quergür-  
bro edentulo, rostro recuruo. teln, die äußere Lefze ohne Zahn,  
mit einem gekrümmten Schnabel.

List. Hist. Conch. l. 4. f. 15. f. 71.

Rumph. amb. t. 23. f. C.

Petiv.



*Petiv. amb. t. 10. f. 10.*

*Mart. Konch. Kab. II. 36. t. 373. 374. f.*

Testa ovata, laevis glabra, longitudinaliter striata. Cingula composita striis latis profundis parallelis quinatis. Spira planiucula, transverse striata, producta in mucronem centralem prominentem. Columella subtus umbilicata, & recurvata in rostrum ascendens. Labrum exterius nullum seu imperfectum. Color rufus, maculis dispersis albis.

Die Schale ist eiförmig, leicht und glatt, nach der Länge gestreift. Die Quergürteln bestehen aus fünf gleichweit laufenden vertieften Streifen. Der Schnirkel ist etwas flach, in die Quere gestreift, ihre Spitze raget in der Mitte hervor. Die Spindel hat eine nabelförmige Vertiefung, mit einem gekrümmten aufwärts gerichteten Rüssel. Die äußere Lefze mangelt, oder ist unvollkommen. Die Farbe ist rothbraun mit zerstreuten weißen Flecken.

G. II. 7. Buccinum Testiculus.

G. II. 7. Die polnische Mütze.

*Linn. S. N. Sp. 449.*

*Belg. Poolische Muz, Gall. Bonnet de Pologne. Dav.*

Testa ovata, striis elevatis longitudinalibus, apertura dentata, rostro recurvo.

Die eiförmige Schale ist der Länge nach mit erhabenen Streifen, an der Mündung mit Zähnen besetzt, und mit einem gekrümmten Schnabel versehen.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 162.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 15. f. 66.*

*Pe.*



*Petiv. Gaz. t. 152. f. 17.*

*Rumph. amb. t. 23. n. 3.*

*Valent. Abb. t. 7. . 59.*

*Gualt. Test. t. 39. f. C.*

*Seb. Thes. III. t. 72. f. 17-20.*

*Knor. Vergn. III. 8. n. 2. f.*

— — — IV. 6. t. 1. f.

*Mart. Konch. Kab. II. 37. t. 375, 376. f.*

G. II. 8. Buccinum decussatum.

G. II. 8. Der Schuppen-  
Bezoar.

*Linn. S. N. Sp. 450.*

*Belg. Geschubde Bezoar. Gall. Casque pavé. Dav.*

Testa ovata, decussatim striata, tessulis luteis maculata, apertura dentata, rostro recurvo.

Die eiförmige kreuzweisgestreifte Schale ist mit gelben Flecken bemalt, an der Mündung gezähnt, mit einem gekrümmten Schnabel.

*Bonan. Rear. cl. 3. f. 157.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 15. f. 65.*

*Gualt. Test. t. 40. f. B.*

*Knor. Vergn. II. 10. t. 3, 4. f.*

*Mart. Konch. Kab. II. 35. t. 360, 361. f.*

G. II.



G. II. 9. Buccinum  
Areola.

G. II. 9. Das Gartens-  
beetchen.

*Linn. S. N. Sp. 451.*

*Belg. Gevlackte Bezoar. Rumph. Angl. Small Dice Kasket. Petiv. Gall. Casque truité. Argenv.*

Testa substriata, tessulis Die einigermaßen gestreifte,  
oblongis transuersim macula- und mit länglichen Würfel-  
ta, apertura dentata, rostro flecken bemalte Schale ist an  
recuruo. der Mündung gezähnet, mit  
einem gekrümmten Schnabel.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 154.*

*Rumph. amb. t. 25. f. B.*

*Petiv. amb. t. 2. f. II.*

*Gualt. Test. t. 39. f. H.*

*Argenv. Conch. Pl. 15. f. F.*

*Seb. Thes. III. t. 70. f. 7-9.*

*Knor. Vergn. III. 8. t. 5. f.*

*Mart. Konch. Kab. II. 34. t. 355 - 356. f.*

*Da Cost. Elem. Pl. 4. f. 10.*

G. II. 10. Buccinum gra-  
nularum,

G. II. 10. Das geförnte  
te Beetchen.

*Belg. Gestreepte Beddetje. Angl. Gray Kasket. Petiv. Gall. Gros  
Casque cannelé.*

Testa





Testa ovata, transuersim obsolete fulcata, tessulis luteis seriatim maculata, labio granulato, cauda recurua.

Die eysförmige einigermaßen in die Quere gefurchte Schale hat einige Reihen gelber Würfelflecken, die Schalenlesze ist gezähnt, die Spindel-lesze gekörnt, der Schnabel gekrümmet.

Rumph. amb. t. 25. f. C.

Petiv. amb. t. 9. f. 6.

Gualt. Test. t. 39. f. B. t. 40. f. E.

Mart. Konch. Kab. II. 32. t. 344. 345. f.

Testa ovata, transuersim obsolete fulcata, longitudinaliter tenuiter striata. Spira conica, decussatim striata. Apertura longa, utrinque dentata. Labrum exterius marginatum, extrorsum reflexum, intus dentatum, interius transuersim plicatum, subtus expansum, punctisque eleuatis seu granis adspersum. Basis desinens in canalum rostratum recuruum. Sutura lateralis prope columellam nulla. Color albus, maculis quadratis luteis secundum series digestis.

Die Schale ist eysförmig, der Länge nach mit matten Furchen, in die Quere mit zarten Streifen besetzt; Der kegelförmige Schnabel ist kreuzweise gestreift. Die Mündung länglicht, beiderseits gezähnt. Die Schalenlesze gesäumt, und auswärts überschlagen, von innen gezähnt. Die Spindel-lesze in die Quere gefalten, unten ausgebreitet, und mit erhabenen Punkten, oder Körnern besetzt. Der Grund endet sich in eine schnabelförmige, gekrümmte Rinne. An der Seite der inneren Lesze steht der Länge nach keine Naht. Die Farbe ist weiß mit gelben reiheweise gesetzten Würfelflecken.



G. III. Cassidea, labro muricato. G. III. Helmformige, mit gezackter Schalenleiste.

G. III. 1. Buccinum Eri-  
naceus.

G. III. 1. Das gefaltene  
Säumchen.

Linn. S. N. Sp. 452.

Belg. Gestreepte Zoomtje Rumph. Angl. Small curld Casket. Pet.

Testa ovata, longitudinaliter Die eysförmige längliche ei-  
subplicata, papillis coronata, nigermassen gefaltene Schale  
labro porrice muricato. ist mit Knoten gekrönt, und  
an der Schalenleiste gezackt.

List. Hist. Conch. 1. 4. f. 15. f. 73.

Bonan. Recr. cl. 3. f. 152.

Rumph. amb. t. 25. f. D. 6, 7.

Petiv. amb. t. 9. f. 9.

Gualt. Test. t. 39. f. D, F.

Argenv. Conch. Pl. 14. f. G.

Seb. Thes. III. t. 53. f. II. 16.

Knor. Vergn. VI. 11. t. 3. f.

Mart. Conch. Kab. II. 35. t. 363. f.

G. III. 2. Buccinum  
glaucum.

G. III. 2. Der graue  
Bezoar.

Linn. S. N. Sp. 453.

Belg. Graeuwe Kasket. Rumph. Angl. Smooth gray Casket. Petiv.  
Gall. Casque Bezoard. Day.



Testa ovata laevi, papillis Die eysförmige glatte Schale  
coronata, labro pollice muri- le ist mit Knospen gekrönt, und  
cato. hinten an der Schalenleiste ge-  
zackt.

Rumph. amb. t. 25. f. A.

Petiv. amb. t. 7. f. 4. t. 11. f. 18.

Gualt. Test. t. 40. f. A.

Seb. Thes. III. t. 71. f. 11 - 16.

Knor. Vergn. III. 8. t. 3. f.

Mart. Konch. Kab. II. 32. t. 342. 343. f.

G. III. 3. Buccinum G. III. 3. Der glatte  
Vibex. Bezoar.

Linn. S. N. Sp. 454.

Belg. Gladde Zoomtje. Rumph. Angl. Smooth-lip'd Casket. Pet.

Testa ovata, laeuissima, la- Die eysförmige ganz glatte  
bio pollice muricato. Schale ist hinten an der Scha-  
lenleiste gezackt.

Bonar. Recr. cl. 3. f. 151.

Rumph. amb. t. 25. f. E.

Petiv. amb. t. 4. f. 9.

Gualt.



- Gualt. Test. t. 39. f. F. L.*  
*Argenv. Conch. Pl. 14. f. H.*  
*Seb. Tbes. III. t. 53. f. 5-7, 10, 17.*  
*Regenf. Samml. I. 10. t. 40. f.*  
*Mart. Conch. Kab. II. 35. t. 364, 365. f.*

G. III. 4. Buccinum pa-  
 pillosum.

G. III. 4. Das förmige  
 Rinfhorn.

*Linn. S. N. Sp. 455.*

*Belg. Ryftenbry Hoorensje.*

Testa ovata oblonga, undi-  
 que tuberculata, labro posti-  
 ce muricato,

Die eysförmige längliche  
 Schale ist allenthalben mit er-  
 höhten Körnern, und hinten  
 an der Schalenleiste mit Sa-  
 cken besetzt.

*List. Hist. Conch. I. 4. f. 15. f. 23.*

*Rumph. amb. t. 29. f. M.*

*Gualt. Test. t. 44. f. G.*

*Argenv. Conch. Pl. 9. f. F.*

*Seb. Tbes. III. t. 49. f. 57, 58, 59.*

*Knor. Vergn. II. 27. t. 2. f.*

*Mart. Conch. Kab. IV. 125. t. 1204, 1205. f.*



G. III. 5. Buccinum  
Glans.

G. III. 5. Das linirte  
Rinohorn.

Linn. S. N. Sp. 456.

Belg. Modervlakje.

Testa ouata oblonga laevi,  
spirae apice longitudinaliter  
fulcato, labro postice murica-  
to.

Die eysförmige längliche  
Schale ist glatt, an der Spitze,  
der Länge nach gefurchet, und  
hinten an der Schalenlefze mit  
Zacken besetzt.

Rumph. amb. t. 29. f. P.

Seb. Thes. III. t. 39. f. 60.

Knor. Vergn. III. 5. t. 5. f.

Mart. Konch. Kab. IV. 125. t. 1195-1198. f.

G. IV. Callosa ad columellam re-  
flexam.

G. IV. Mit umgeschlagener schwie-  
liger Spindel.

G. IV. 1. Buccinum  
Arcularia.

G. IV. 1. Das weiße  
Kofferhörnchen.

Linn. S. N. Sp. 457.

Belg. Koffer Hoorntje. Gall. Arculaires blanc. Angl. Small koffer Shell.

Testa ouata, transversim  
striata, plicis longitudinali-  
bus, papillisque coronata,  
labio explanato, calloso.

Die eysförmige, in die Quer-  
re gestreifte Schale, ist der  
Länge nach mit Falten und Kno-  
ten besetzt, mit einer ausge-  
breiteten schwieligen Spindel.

List.





*List. Hist. Conch. l. 4. f. 15. f. 24.*

*Rumph. amb. t. 27. f. M.*

*Petiv. amb. t. 12. f. 9.*

*Gualt. Test. t. 44. f. R. O.*

*Argens. Conch. Pl. 14. f. C.*

*Seb. Thes. III. t. 53. f. 32. 33.*

*Knor. Vergn. VI. 22. t. 3. f.*

*Mart. Conch. Kab. IV. 125. t. 1174. 1175. f.*

G. IV. 2. Buccinum  
mutabile,

G. IV. 2. Die Auster-  
sturmhaube.

*Linn. S. N. Sp. 460.*

Testa ovata oblonga, spira  
acuminata, labio explanato.

Die eysförmige längliche  
Schale hat einen zugespitzten  
Schnirkel, und eine ausge-  
breitete Spindel.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 15. f. 30.*

*Gualt. Test. t. 44. f. B.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

G. IV. 3. Buccinum  
neritoideum,

G. IV. 3. Die Dose-  
schnecke.

Q 3

Testa



Testa orbiculata laeui, sub-  
tus planiuscula, labio expla-  
nato gibbo.

Die Schale ist scheibenrund  
und glatt, unten einigermaßen  
flach, und an der Lippe aus-  
gebreitet, und erhaben.

Gualt. Test. t. 65. f. 7.

Mus. Caes. Vindobon.

G. V. Columella, quasi abrasa,  
plana.

G. V. Mit gleichsam abgeschabter  
flacher Spindel.

G. V. 1. Buccinum Har-  
pa.

G. V. 1. Die Harse.

Linn. S. N. Sp. 462.

Belg. Davids Harp. Angl. The Harp Shell. Hill. Gall. La Harpe.  
Argenv.

Testa costis longitudinalibus  
carinatis antice mucronatis, co-  
lumella plana laeui.

Die Schale ist nach der  
Länge mit scharfen, vorne spitz-  
gen Rippen besetzt, und an der  
Lippe flach.

\* costis complanatis, latis.

\* mit flachgedrückten breiten Ri-  
ben.

Bonon. Recr. cl. 3. f. 185.

List. Hist. Conch. l. 4. f. 15. f. 55.

Rumph. amb. t. 32. f. K. L.

Petiv. amb. t. 2. f. 2. t. 7. f. 8.

Gualt. Test. t. 29. f. C, E, G.

Argenv. Conch. Pl. 14. f. D.

Seb.



Seb. Tbes. III. t. 70. f. 10.

Hill. Hist. of, Anim. Pl. 8.

Regenf. Samml. I. 2. t. 14. f.

Nurr. Fund. Test. t. 1. f. 14.

Knor. Vergn. I. 9. t. 3. f.

— — — II. 8. t. 2. f; 19. t. 1, 2. f.

Mart. Konch. Kab III. 119 t. 1090. 1091. 109. f.

♂ costis carinatis angustioribus.

♂ mit scharfen schmalen Rippen.

*Mus. Caes. Vindobon.*

G. V. 2. Buccinum persicum.

G. V. 2. Die Rudolphe-  
schnecke.

Linn. S. N. Sp. 464.

Belg. Wydmonder. Angl. The Persian-Shell. Hill. Gall. Conque  
persique.

Testa ovata lacui, anfracti- Die eiförmige glatte Scha-  
bus tuberculatis, labro cre- le ist an den Gewinden knotig,  
nato, columella complanata. an der Lesze ge'erbet, mit einer  
plattgedrückten Spindel.

List. Hist. Conch. I. 4. f. 15. f. 46. 47.

Rumph. amb. I. 27. f. E.



*Gualt. Test. t. 51. f. H. L.*

*Argenv. Conch. Pl. 17. f. E.*

*Seb. Thes. III. t. 72. f. 12 — 16.*

*Hill. Hist. of. Anim. Pl. 8.*

*Knor. Vergn. III. 2. t. 5. f.*

*Mart. Konch. Kab. III. 69. t. 760. f.*

G. V. 3. Buccinum  
Haemastoma.

G. V. 3. Der Noth-  
mund.

*Linn. S. N. Sp. 566.*

Testa ovata nodosa, labro  
intus striato, fauce fulva.

Die eiförmige knotige Schale ist an der Schalenleiste un-  
wendig gestreift, und im  
Schlunde rothgelb.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 15. f. 48.*

*Gualt. Test. t. 51. f. A.*

*Knor. Vergn. IV. 5. t. 4. f.*

*Mart. Konch. Kab. III. 101. t. 965. f.*

G. V. 4. Buccinum La-  
pillus.

G. V. 4. Das Steins-  
chen.

*Linn.*



*Linn. S. N. Sp. 467.*

Testa ovata transuersim Die eysförmige Schale ist  
striata, spira tuberculata, co- der Quere nach gestreift, aus  
lumella plana. den Gewinden knotig, mit ei-  
ner flachen Spindel.

*Reaumur Mem. de Paris 1711. Pl. 6. f. 45.*

*List. angl. t. 3. f. 5. 6.*

*Adans. Seneg. Pl. 7. f. 4.*

*Müll. Linn. Nat. Syst. VI. 1. B. 16. t. 2. f.*

*Mart, Conch, Kab. III. 121. t. IIII. IIII2. f.*

G. V. 5. Buccinum Sma-  
ragdulus.

G. V. 5. Die Smaragde-  
schnecke.

*Linn. S. N. Sp. 468.*

*Coll. l'Emeraude. Argenv.*

Testa ovata, glaberrima, Die eysförmige ganz glatte  
columella complanata, plica- Schale hat eine plattgedrückte  
ta. gefaltene Spindel.

Alba, lineis transuersis parallelis Weiß, mit gleichweitstehenden  
fascis. braunen Querstrichen.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 15. f. 45.*

*Argenv. Conch. Pl. 6. f. P.*





Seb. Thes. III. t. 54. f. 14 — 16.

Knor. Vergn. III. 14. t. 5. f.

Mart. Konch. Kab. III. 120. t. 1104. 1105. f.

G. VI. G'abra.

G. VI. Glatte Rinförner.

G. VI. 1. Buccinum      G. VI. 1. Die Treppe.  
spiratum.

Linn. S. N. Sp. 469.

Belg. Gevoord Bultje. Angl. Cloudy Dice - Shell. Pet. Gall. La tour  
de Coppenhague.

Testa ovata oblonga laevi, Die eiförmige längliche glat-  
anfractibus canali plano distinc- te Schale hat flach ausgefehl-  
tis, columella abrupta, per- te Näthe, und eine abgestuzte  
forata. durchbohrte Spindel.

Bonan. Recr. cl. 3. f. 70. 370.

List. Hist. Conch. l. 4. f. 15. f. 41.

Rumph. amb. 49. f. C. D.

Petiv. amb. t. 9. f. 21.

Gualt. Test. t. 51. f. B.

Argenv. Conch. Pl. 17. f. N.

Seb. Thes. III. t. 73. f. 23 — 26.

Regenf. Samml. I. 10. t. 41. f.

Knor.



Knor. Vergn. II. 6. t. 5. f.

—— ——— III. 3. t. 4. f.

Mart. Konch. Kab. IV. 122. t. IIII8 — IIII1. f.

Da Cost. Elem. Pl. 4. f. 6.

G. VI. 2. Buccinum  
glabratum.

G. VI. 2. Der Kanariens  
vogel.

Linn. S. N. Sp. 470.

Belg. Gladde Knipers - boor.

Testa ovato oblonga gla-  
herrima, futuris obsoletis, ba-  
si ventricosa transuersim sul-  
cata.

Die eiförmige längliche ganz  
glatte Schale hat undeutliche  
Näthe, und einen bäuchigen  
nach der Quere gefurchten Bo-  
den.

Bonan. Recr. cl. 3. f. 149.

List. Hist. Conch. l. 4. f. 15. f. 29.

Gualt. Test. t. 43. f. T.

Argenv. Conch. Pl. 9. f. G. prior.

Klein. Meth. Ostrac. t. 2. f. 47.

Knor. Vergn. II. 16. t. 4, 5. f.

Mart. Konch. Kab. IV. 122. t. IIII7. f.

G. VI. 3. Buccinum ful-  
catum.

G. VI. 3. Das gefurcht  
te Rindhorn.

Testa



Testa ovata transversum foliata, anfractibus contiguis, re gesurte Schale, hat an labro crenulato, intus striato. einander verwachsene Gewinde, und eine gekerbte inwendig gestreifte Schalenleiste.

List. Hist. Conch. l. 4. f. 15. f. 31.

Mus. Caes. Vindobon.

Testa ovata. Anfractus sex, transversim sulcati, suturis contiguis. Apertura congenerum. Labrum crenulatum. Faux striata. Labium replicatum, complanatum. Basis efusa abbreviata. Color fuscus, maculis dispersis, niucis.

Die eiförmige Schale, hat sechs in die Quere gesurte Windungen, deren Rätze an einander verwachsen sind. Die Mündung ist wie bei den Nebenarten. Die Schalenleiste fein gekerbt. Der Schlund gestreift. Die Spindelkeiste ist übergeschlagen, und ausgebreitet. Der Grund ausgeschnitten, und verfürzer. Von brauner Farbe, mit zerstreuten schneeweißen Flecken.

G. VII. Angulata.

G. VII, Eckige Rinthörner.

G. VII. 1. Buccinum undosum.

C. VII. 1. Das Eckhorn.

Linn. S. N. Sp. 472.

Belg. Boerenjonge. Angl. Small rough Whelke. Petiv.

Testa ovato oblonga transversim sulcata, obtuse quinquangulari, labro intus striato.

Die eiförmige längliche, in die Quere gesurte Schale hat fünf stumpfe Ecken, und eine inwendig gestreifte Schalenleiste.

List.



*List. Hist. Conch. l. 4. f. 14. f. 33. 36.*

*Rumph. amb. t. 29. f. O.*

*Petiv. amb. t. 13. f. 4.*

*Argenv. Conch. Pl. 9. f. N.*

*Klein. Meth. Ostr. t. 3. f. 61.*

*Seb. Thes. III. t. 52. f. 26.*

*Knor. Vergn. II. 14. t. 4, 5. f.*

*Mart. Konch. Kab. IV. 122. t. 1126. 1127. f.*

G. VII. 2. Buccinum  
Bezoar.

G. VII. 2. Die Muska-  
tennuß.

*Linn. S. N. Sp. 473.*

*Belg. Getackte Noote - Moskat. Gall. Moskat.*

Testa ovata, decussatim ru- Die eiförmige Schale ist  
gosa, spinis transuersis con- kreuzweise gerunzelt, mit hoch-  
cauis, anfractibus infimis la- len Stacheln der Quere nach,  
mellatis, columella perforata. und mit Blättern an den unter-  
sten Gewinden besetzt, sammt ei-  
ner durchbohrten Spindel.

*Argenv. Conch. Pl. 15. f. G.*

*Knor. Vergn. VI. 24. t. 2. f.*

*Mart. Konch. Kab. II. 40. t. 398, 399. f.*

G. VII. 3. Buccinum  
undatum.

G. VII. 3. Das Wellen-  
horn.

*Linn.*



Linn. S. N. Sp. 475.

Belg. Wulk. Angl. The Whelke.

Testa ovata, transversim striata, anfractibus curvato multangulis. Die eysförmige in die Quere gestreifte Schale hat runzelichte vieleckige Gewinde.

α dextrorsa.

α rechtsgewunden.

Bonn. Recr. cl. 3. f. 189.

List. angl. t. 3. f. 2.

— Hist. Conch. l. 4. f. 14. f. 14.

Seb. Thes. III. t. 39. f. 78 — 80.

Knor. Vergn. IV. 19. t. 1. f.

Müll. Linn. N. S. VI. 1. B. 16. t. 3. 4. f.

β sinistrosa.

β linksgewunden.

Mus. Caes. Vindobon.

G. VII. 4. Buccinum reticulatum.

G. VII. 4. Das Gitterhorn.

Linn. S. N. Sp. 476.

Angl. Small latticed Whelk. Pet.

Testa





Testa ovato oblonga, trans-  
uersim striata, longitudinaliter  
rugosa, apertura dentata.

Die eysförmige längliche in  
die Quere gestreifte Schale  
ist der Länge nach mit Run-  
zeln, und an der Mündung  
mit Zähnen versehen.

Reaumur Mem. de Paris. 1711. Pl. 6. f. 9.

List. Hist. Couch. l. 4. f. 14. f. 21.

Petiv. Gaz. t. 64. f. 8; t. 75. f. 4.

Mus. Caes. Vindobon.

G. VII. 5. Buccinum  
elathratum.

G. VII. 5. Das Neß-  
horn.

Testa ovata, longitudinali-  
ter plicata, striis elevatis  
transuersis decussata; rostro re-  
curuo.

Die eysförmige Schale ist  
mit nach der Länge laufenden  
Falten, und erhabenen Quers-  
streifen durchkreuzet, mit ei-  
nem gekrümmten Schnabel.

Bonan. Rect. cl. 3. f. 62.

Mus. Caes. Vindobon.

Testa ovata ventricosa, reticulata  
rugis longitudinalibus strias elevas  
tas transversas decussantibus. Pun-  
cta decussationum nodosa. Spira  
acuminata porrecta. Labrum cre-  
scutum, intus sulcatum. Labium

Die Schale ist eysförmig häuchig,  
und neßartig, mit nach der Länge  
laufenden Runzeln, welche durch  
erhabene Quersalten durchkreuzet  
werden. Die Durchkreuzungspunkte  
sind knotig. Der zugespitzte Schnabel  
reph-



replicatum tenue. Basis definens seel raget hervor. Die Schalenfuge  
in canalem, breuem recurvum. Co- ist gefaltet, und inwendig gefur-  
lor glaucus. chet Die innere Fuge ist überge-  
schlagen, und dünn. Der Grund  
endiget sich in einen kurzen ge-  
krümmten Schnabel. Von licht-  
grauer Farbe.

G. VIII. Turrita, laevis, subulata. G. VIII. Sechshörnte, glatte, abt-  
förmige Rindhörner.

G. VIII. 1. Buccinum G. VIII. 1. Die Strick-  
maculatum. nadel.

Belg. Malprieu. Angl. Tygers-tooth. Petiv. Gall. Le Cloud. Argenv.

Testa turrita subfusiformi, Die gethürmte einigermaßen  
anfractibus laevis indivis spindelartige Schale hat glatte  
integerrimis. ungetheilte, und ganzrandige  
Gewinde.

Pallida, maculis latis purpurascen- Blau, mit breiten purpurrothen  
tibus. breiten Flecken.

Bonan. Recr. cl. 3. f. 317.

List. Hist. Conch. l. 4. f. II. f. 74.

Rumph. amb. t. 30. f. A. D.

Petiv. amb. t. 5. f. 4.

Gualt. Test. t. 56. f. 7.

Argenv. Conch. Pl. II. f. A.

Seb. Thes. III. t. 56. f. 6.

Knor. Vergn. III. 23. t. 2. f.

— VI. 19. t. 6. f.

Mart. Kōnch. Kab. IV. 153. t. 1440. f.

G. VIII.



G. VIII. 2. Buccinum  
subulatum.

G. VIII. 2. Die Tiger-  
nadel.

Linn. S. N. Sp. 480.

Belg. Dunne Tygerpen. Angl. Brown Tygers horn. Petiv. Gall. Vis  
tigrée. Dav.

Testa turrita subulata, an-  
fractibus laevis, indivisis, se-  
rie duplici macularum ferru-  
ginearum pictis.

Die gethürmte spindelför-  
mige Schale hat glatte unge-  
theilte Gewinde, die mit einer  
drenfachen Reihe rothfarbiger  
Flecken bemalt sind.

Bonn. Rect. cl. 3. f. 118.

List. Hist. Conch. l. 4. f. 11. f. 70.

Rumph. amb. 30. t. B.

Petiv. amb. t. 4. f. 2.

Gualt. Test. t. 56. f. B.

Argenv. Conch. Pl. 11. f. X.

Seb. Thes. III. t. 56. f. 28.

G. VIII. 3. Buccinum  
candidum.

G. VIII. 3. Die weiße  
Nadel.

Testa turrita subulata laevi;  
anfractibus integerrimis, prope  
futuram incrassatis.

Die gethürmte ahlförmige  
glatte Schale hat ungetheilte  
ganzrandige Gewinde, die bei  
der Muth sich verdicken.

Mus. Caes. Vindobon.



Testa subulata laevis. Anfractus circiter viginti, indivisi, integerrimi, supra prope suturam incrassati; supremi linea transversa bifariam partiti, & juxta suturam crenulati. Apertura, & basis congenerum. Color niveus.

Die ahlförmige Schale ist glatt. Die Gewinde, deren beiläufig zwanzig sind, nahe an der Nath. Die obersten sind durch eine neue Querlinie in zwey Theile getheilet, und an der Nath gekerbet. Die Mündung und der Grund sind wie an den Nebenarten beschaffen. Die Farbe schneeweiß.

G. VIII. 4. Buccinum ferrugineum.

G. VIII. 4. Die rostfarbige Nadel.

Testa turrita subulata ferruginea, anfractibus laevibus, bipartitis, integerrimis.

Die gethürmte ahlförmige, rostfarbige Schale ist glatt, zweytheilig und ganzrandig.

List. Hist. Conch. l. 4. f. II. f. 71.

Mus. Caes. Vindobon.

Testa subulata, laevis. Anfractus circiter sexdecim integerrimi, linea exarata transversa bifariam divisi. Apertura & basis congenerum. Color ferrugineus, maculis obsoletis albis.

Die Schale ist ahlförmig, und glatt. Die Gewinde bäuchig, ganzrandig, und zweytheilig; sechszehn an der Zahl. Die Mündung und der Grund nach Art der Unverwandten. Von eisenrothiger Farbe, mit matten weißen Flecken.

G. VIII. 5. Buccinum crenulatum.

G. VIII. 5. Die gekrönte Nadel.

Linn S. N. Sp. 481.

Belg. Gekrönte Pen. Rumph. Angl. Tooth'd Rodkin. Pet.

Testa



Testa turrita, anfractibus bipartitis, margine superiore crenatis. Die gethürmte Schale hat zweytheilige am Oberrande gekerbte Windungen.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 11. f. 75.*

*Rumph. amb. t. 30. f. E.*

*Petiv. amb. t. 8. f. 13.*

*Gualt. Test. t. 57. f. L.*

*Argenv. Conch. Pl. 11. f. 1.*

*Seb. Thes. III. t. 56. f. 9. 35.*

*Knor. Vergn. I. 8. t. 7. f.*

*Mart. Konch. Kab. IV. 153. t. 1442. f.*

G. VIII. 6. Buccinum vittatum. G. VIII. 6. Die gekerbte Nadel.

*Linn. S. N. Sp. 483.*

Testa ventricoso turrita, transuersim striata, sutura anfractuum duplicato crenulata, le ist in die Quere gestreift, und an der Naht zweysfach gekerbet.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 15. f. 34.*

*Klein. Meth. Ostr. t. 7. f. 121.*

*Mart. Konch. Konch IV. 155. t. 1461. f.*





G. VIII. 7. Buccinum  
strigilatum.

G. VIII. 7. Die gestrie-  
gelte Nadel.

Linn. S. N. Sp. 484.

Belg. Naalde • Pen. Gall. Le Foret. Day.

Testa subulata longitudi-  
naliter striata, anfractibus in-  
diuisis, cingulo suturali niueo  
rufo maculato.

Die ahlförmige Schale hat  
ungetheilte nach der Länge ge-  
streifte Gewinde, die an der  
Muth mit einem schneeweißen  
rothbraun gefleckten Bande um-  
geben sind.

Rumph. amb. t. 36. f. H.

Gualt. Test. t. 57. f. O.

Argenv. Conch. Pl. II. f. R.

Mus. Caes. Vindobon.

G. VIII. 8. Buccinum du-  
plicatum.

G. VIII. 8. Die Nadel-  
nadel.

Linn. S. N. Sp. 485.

Gall. La Vis de pressoir. Day.

Testa subulata anfractibus  
bipartitis, striatis.

Die ahlförmige Schale hat  
zweytheilige, gestreifte Win-  
dungen.

Bonan. Recr. cl. 3. f. 110.

Gualt. Test. t. 57. f. N.

Knor.



*Knor. Vergn. VI. 18. t. 6. f. 24. t. 5. f.*

*Mart. Konch. Kab. IV. 155. t. 1455. f.*

G. VIII. 9. Buccinum lanceolatum, Die Lanzennadel.

*Linn. S. N. Sp. 486.*

*Belg. Pickenier. Angl. Furrow - Pen, Pet. Gall. L'alène. Dav.*

Testa subulata laevi, an- Die ablsförmige glatte Scha-  
fractibus integris, lineis lon- le hat ungetheilte Gewinde,  
gitudinalibus fulvis. die mit rothgelben Streifen  
nach der Länge herab bezeichnet  
sind.

*Rumph. amb. t. 30. f. G.*

*Petiv. Gaz. t. 13. f. 20.*

*Argenv. Conch. Pl. II. f. Z.*

*Knor. Vergn. VI. 24. t. 4. f.*

*Mart. Konch. Kab. IV. 154. t. 1450. f.*

G. VIII. 10. Buccinum dimidiatum, Die umwundene Nadel.

*Linn. S. N. Sp. 487.*

*Belg. Omwonden Pen.*

Testa subulata laevi, an- Die ablsförmige glatte Scha-  
fractibus bipartitis integerrimis. le hat zweytheilige ganzrandige  
Gewinde.



α macularum crocearum serie trans- α mit dreyfacher Reihe safranfar-  
uerla triplici picta. bigen Flecken in die Quere be-  
malet.

*Seb. Thes. III. t. 56. f. 16, 23, 24, 27.*

*Knor. Verg. I. 23. t. 4. f.*

*Mart. Konch. Kab. IV. 154. t. 1443. f.:*

β lutescens, maculis longitudina- β gelblich, mit länglichen schnee-  
li us niueis, anfractuum margi- weißen Flecken, und plattgedrück-  
ne superiore compresso attenua- tem verdünntem Oherande an den  
to. Gewinden.

*Rumph. amb. t. 30. f. C.*

*Gualt. Test. t. 51. f. M.*

*Seb. Thes. III. t. 56. f. 15, 19:*

*Knor. Vergn. I. 23. t. 5. f.*

— — VI. 18. t. 5. f.

G. VIII. II. Buccinum  
cinereum.

G. VIII. II. Die aschen-  
graue Nadel.

Testa subulata; anfractibus  
indivisis; prope futuram longi-  
tudinaliter striatis.

Die ahlförmige Schale hat  
ungetheilte, und an der Naht  
nach der Länge gestreifte Ge-  
winde.

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa



Testa subulata glabra. Anfractus quatuordecim indivisi, integerrimi, margine superiore longitudinaliter striati. Columella complanata. Apertura, & basis congenerum. Color cinereus; fascia transversa prope suturam nigricante obsoleta.

Die Schale ist ablsförmig und glatt. Die vierzehn Gewinde sind eingetheilt, ganz glatt, und nur an der Naht der Länge nach gestreift. Die Spindel flach gedrückt. Die Mündung und der Grund wie an den Nebenarten dieses Geschlechtes. Von aschengrauer Farbe, mit einer undeutlichen schwärzlichen Querbinde unweit der Naht.

G. VIII. 12. Buccinum pertusum.

G. VIII. 12. Die durchstochene Nadel.

Testa subulata; anfractibus bipartitis, striis longitudinalibus elevatis, & transuersis excavato punctatis.

Die ablsförmige Schale hat zweytheilige Gewinde, die nach der Länge herab erhabene Streifen, und in die Quere vertiefte Punkten haben.

Mart. Konch. Kab. IV. 155. t. 1457. f.

Mus. Caes. Vindobon.

Testa subulata. Anfractus circiter viginti striati, striis longitudinalibus elevatis, punctisque excavatis per seriem transversam digestis. Apertura & basis congenerum. Color croceus aut albus, maculis dispersis fulvis.

Die Schale ist ablsförmig. Die Gewinde, deren ungefähr zwanzig sind, haben der Länge nach erhabene Streifen, und in die Quere eine dreifache Reihe ausgehöhlter Punkten. Die Mündung, und der Grund ist wie an den andern Nadeln dieses Geschlechtes. Von safrangelber, oder weißer Farbe mit zerstreuten rothgelben Flecken.



G. VIII. 13. Buccinum  
sinuatum,

G. VIII. 13. Die Fal-  
tennadel.

Testa turrita anfractibus  
longitudinaliter plicatis, prope  
superiorem attenuatis, labro pos-  
tice sinuato.

Die gethürmte nach der Länge  
ge gefaltene Nadel hat an der  
Nath zusammengedrückte Ge-  
winde, und eine hinten aus-  
geschnittene Schalenleiste.

Mart. Konch. Kab. IV. 155 z. 1464. 1465. f.

Testa turrita. Anfractus circiter  
novem, longitudinaliter plicati,  
prope futuram complanati. Labrum  
replicatum, postice sinu breui exci-  
sum. Columella replicata. Aper-  
tura, & basis congenerum. Color  
lutescens, epidermide decidua ni-  
gra.

Die Schale ist gethürmt. Die  
Gewinde, deren ungefehr neun sind,  
der Länge nach gefalten, nächst der  
Nath platt gedrückt. Die Schal-  
enleiste ist erweitert, und hinten  
mit einem kurzen Einschnitte ver-  
sehen. Die Spindel ist übergeschla-  
gen. Die Mündung, und der  
Grund, wie an andern Spindeln  
dieses Geschlechtes. Von gelblicher  
Farbe mit schwarzer abfallender  
Oberhaut.

H. Strombus.

H. Die Flügelschnecke.

Testa spiralis; aperrura  
dilatata, labro ampliato.

Die schirnkelförmige  
Schale hat eine erweiterte  
Mündung, und ausgebrei-  
tete Schalenleiste.

H. I.





H. I. Digitati, labro in lacinias  
tenuas excurrente.

H. I. Gezackte, deren Schalen-  
lefze mit schmalen Zacken versehen  
sind.

H. I. 1. Strombus Fusus.

H. I. 1. Die Sternma-  
del.

Linn. S. N. Sp. 489.

Belg. Dikke Starre - Pen. Gall. Fuseau étoilé.

Testa turrita laeui, rostro  
subulato, labro dentato.

Die gethürmte glatte Scha-  
le hat einen ablsförmigen Schna-  
bel mit einer gezackten Schalen-  
lefze.

α testa crassa lutescens; apice longitu-  
dinaliter striato, labio incillato.

α dickschalig gelblich braun, an  
der Spitze nach der Länge ge-  
streift, mit verdickter Spindellefze.

Bonap. Recr. cl. 3. t. 121.

List. Hist. Conch. l. 4. f. 12. f. 11, 18.

Argenv. Conch. Pl. 10. f. D.

Klein. Hist. Conch. t. 4. f. 87.

Sch. Thes. III, t. 56. f. 1. 2.

Knor. Vergn. V. 6. t. 1. f. 7. t. 2. f.

Chemnitz Naturforscher IX. 6. t. 1, 2. f.

Mart. Conch. Kab. IV. 158. t. 1495. 1496. f.

β attenuata alba, apice reticula-  
tim striato, rostro elongato.

β Schmal, weiß, an der Spitze  
gitterförmig gestreift, mit einem  
verlängerten Schnabel.

R 5

List.



*List. Hist. Conch. l. 4. f. 14. f. 9.*

*Argenv. Conch. Pl. 10. f. A.*

*Seb. Tbes. III. t. 56. f. 3.*

*Mart. Konch. Kab. IV. 159. t. 1500. 1502. f.*

An prioris varietas pulla?

Etwan eine unvollkommene Ab-  
änderung der vorigen?

H. I. 2. Strombus Pes      H. I. 2. Der Vogelfuß.  
pelicani.

*Linn. S. N. Sp. 490.*

*Belg. Pelikaans - Poot. Angl. Blobber - lupt. Petiv. Gall. Patte  
d'oie. Dav. Ital. Turbine pendatilo. Gin.*

Testa labro tetradactylo, Die Schale hat eine vier-  
spirarum marginibus nodolis; zackige Schalenleiste, mit kno-  
fauce laeni. tigen Randen an den Gewin-  
den, und glattem Schlunde.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 85. 87.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 12. f. 20.*

*Petiv. Gaz. t. 79. f. 6; t. 127. f. 11.*

*Gualt. Test. t. 53. f. A, B, C.*

*Argenv. Conch. Pl. 14. f. M.*

*Klein. Meth. Ostr. t. 2. f. 41. 42.*

*Ginan.*



*Ginan*, *adr.* t 7. f. 58. 60.

*Seb. Thes.* III. t. 62. f. 17.

*Knor. Vergn.* III. 7. t. 4. f.

*Murr. Fund. Test.* t. 1. f. 21.

*Mart. Konch. Kab.* III, 83. t. 848 - 850. f.

H. I. 3. *Strombus Chiragra*.

H. I. 3. Die Bootschacke.

*Linn. S. N. Sp.* 491.

*Belg.* Wufje - Bootschack. *Angl.* Female Devil's Claw. *Petiv. Gall.* Araignée femelle *Dav.*

*Testa labro hexadactylo, digitis curvis, rostro recurvato, labio striato.* Die Schale hat an der Schale sechs krumme Zacken, einen gekrümmten Rüssel, mit einer gestreiften Spindelröhre.

*Bonan. Recr. cl.* 3. f. 314.

*List. Hist. Conch.* l. 4. f. 12. f. 24.

*Rumph. amb.* t. 35. f. A. B.

*Petiv. amb.* t. 14. f. 3.

*Gualt. Test.* t. 35. f. A.

*Seb. Thes.* III. t. 82. f. 1, 6, 7, 9, 10.

*Knor. Vergn.* I. 27. t. 1. f.

— *Delic. nat.* I. t. B. II. f. 1.



Mart. Konch. Kab. III. 85. t. 851. 852. f.

— — — — — 87. t. 856. 857. f.

H. I. 4. Strombus Scorpio. H. I. 4. Die Podagra-  
schnecke.

Linn. S. N. Sp. 492.

Belg. Podagra kreeft. Valent. Angl. Knob-Fingers. Petir. Gall.  
Le Scorpion. Argenv.

Testa labro heptadactylo, Die Schale hat sieben kno-  
digitis nodosis, postico lon- tige Zacken, deren hinterster  
gillmo, sehr lang ist.

List. Hist. Conch. I. 4. f. 12 f. 22.

Rumph. amb. t. 36. f. K.

Valent. Abh. t. 3. f. 28.

Argenv. Conch. Pl. 14. f. B.

Seb. Thes. III. t. 82. f. II. 15.

Knor. Vergn. II. t. 3. f. 1.

Murray. Fund. Test. t. I. f. 29.

Mart. Konch. Kab. III. 88. t. 860. f.

H. I. 5.



H. I. 5. Strombus      H. I. 5. Die Krabben-  
Lambis.                      schnecke.

*Linn. S. N. Sp. 493.*

*Belg.* Geele krabbe. *Angl.* The Spider Shell. *Hill.* Gall. Araignée  
*male.* *Dav.*

*Testa labro heptadactylo,* Die Schale hat an der Schüs-  
*digitis rectifuculis, fauce laevi.* senleste sieben einigermaßen ge-  
rade Zacken, und einen glatten  
Schlund.

*α digitis perfectis elongatis.*

*α* mit vollkommenen verlängerten  
Zacken.

*Rumph amb. t. 35. f. F.*

*Petiv. amb. t. 14. f. 5.*

*Gualt. Test. t. 35. f. C.*

*Argenv. Conch. t. 14. f. E.*

*Seb. Thes. III. t. 82. f. 8.*

*Hill. Hist. of. Anim. Pl. 8.*

*Knor. Vergn. I. 28. t. 1. f.*

*Mart. Konch. Kab. III. 86. t. 855. f.*

*β digitis imperfectis, haud productis.* *β* mit unvollkommenen verstärkten  
Zacken.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 12. f. 21.*

*Rumph. amb. t. 36. f. G.*

*Petiv.*





○

*Petiv. amb. t. 14. f. 8.**Seb. Thes. III. t. 82. f. 16. 17.**Knor. Vergn. III. 7. t. 1. f.*H. I. 6. Strombus Mil-  
lepeda.H. I. 6. Die Vielsuß-  
schnecke.*Linn. S. N. Sp. 494.**Belg. Duizend - Been. Rumph. Angl. The twelve Fingers. Petiv.  
Gall. Millepied Dav.*Testa labro decadactylo,  
digitis inflexis, dorso gibbo  
compresso,Die Schale hat zehn um-  
gebogene Zacken, und einen  
höckerigen plattgedrückten Rü-  
cken.*Bonan. Recr. cl. 3. f. 311.**Lift. Hist. Conch. 1. 4. f. 12. f. 23.**Rumph. amb. t. 36. f. 1.**Petiv. amb. t. 14. f. 7.**Argenv. Conch. Pl. 15. f. B.**Mart. Konch. Kab. III. 88. t. 861. 862. f.*

H. II. Labre lobate.

H. II. Mit lappenförmiger.  
Schalenleiste.

H. II. 1.



H. II. 1. Strombus len-  
iginosus.

H. II. 1. Die Sommer-  
sprossen.

*Linn. S. N. Sp. 495.*

*Belg. Sproetje. Rumph. Angl. knobbed Broadlip. Petiv. Gall. Tete de serpent. Dav.*

Testa labro antice trilobo,  
dorso tuberculato coronato,  
rostro obtuso.

Die Schalenleſze iſt vorne  
dreylappig, der Rücken knottig,  
und gekrönt, der Schnabel  
ſtumpf.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 300.*

*Rumph. amb. t. 37. f. Q.*

*Petiv. amb. t. 14. f. 10.*

*Gualt. Test. t. 32. f. A.*

*Argenv. Conch. Pl. 15. f. C.*

*Seb. Thes. III. t. 52. f. 17, 18.; t. 62. f. II.*

*Knor. Vergn. III. 13. t. 2. f.; 26. t. 2, 3. f.*

*Mart. Konch. Kab. III. 80. t. 825. 826. f.*

H. II. 2. Strombus Gal-  
lus.

H. II. 2. Der Kampf-  
hahn.

*Linn. S. N. Sp. 496.*

*Belg. Kemphaantje. Rumph. Angl. The Plough. Da Cost. Gall. Aile d'Ange. Dav.*

Testa labro mucronato  
longissimo, dorso spinoso, ros-  
tro recto.

Die Schalenleſze hat einen  
ſehr langen hervortretenden Fin-  
ger, der Rücken iſt ſtachlicht,  
der Schnabel gerad.

*Bonan.*



Bonan. Recr. cl. 3. f. 309. 310.

List. Hist. Conch. l. 4. f. 12. f. 29. 30.

Rumph. amb. t. 37. f. 5.

Gualt. Test. t. 32. f. M.

Seb. Thes. III. t. 62. f. 1, 2.

Knor. Vergn. IV. 12. t. 1. f.

—— Del. nat. I. t. B. IV f. 3.

Mart. Konch. Kab. III. 84. t. 841, 842. f.

—— ——— 85. t. 846. f.

Da Cost. Elem. Pl. 5. f. 1.

H. II. 3. Strombus Au-  
ris Dianae.

H. II. 3. Der Dianen-  
flügel.

Linn. S. N. Sp. 497.

Belg. Wyzer. Rumph. Angl. Horned Broad - Lip. Petitv. Gall. Oreille  
d' Anc. Argenv.

Testa labro antice mucro-  
nato, dorso tuberculoso, ros-  
tro erecto.

Die Schalenleiste hat einen  
hervortretenden Finger, der  
Rücken ist knottig, der Schna-  
bel in die Höhe gebogen.

Bonan. Recr. cl. 3. f. 301. 302.

List. Hist. Conch. l. 4. f. 12. f. 26. 28.

Rumph. amb. t. 37. f. R.

Petitv. amb. t. 14. f. II.

Gualt. Test. t. 32. f. D, H.

Argenv. Conch. Pl. 14. f. O.

Hleiss.



*Klein. Meth. Ostr. t. 6. f. 106.*

*Seb. Thes. III. t. 61. f. 1 — 6. t. 62. f. 13.*

*Knor. Vergn. II. 15. t. 1. 2. f.*

*Mart. Konch. Kab. III. 84. t. 838. 839. f.*

H. II. 4. Strombus Pu-  
gilis.

H. II. 4. Das Fleisch-  
horn.

*Linn. S. N. Sp. 498.*

*Belg. Vlees - Hoorn. Gall. Oreille de Cochon. Dav.*

Testa labro antice promi-  
nente rotundato, spira spino-  
sa, rostro trilobo, fauce ru-  
bra.

Die rundliche Schalenlefze  
raget vorne hervor, der Schnir-  
kel ist stachlicht, der Rüssel  
dreylappig, mit einem rothen  
Schlunde.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 299.*

*Gualt. Test. t. 32. f. B.*

*Argenv. Conch. Pl. 15. f. A.*

*Klein. Meth. Ostr. t. 6. f. 108.*

*Knor. Vergn. I. 9. t. 1. f.*

— — — III. 16. t. 1. f.

*Mart. Konch. Kab. III. 81. t. 830. 831. f.*



H. II. 5. Strombus Luvianus.

H. II. 5. Die Lühoneferschnecke.

Linn. S. N. Sp. 500.

Belg. Lohoenſche Hoorntje. Rumph. Angl. Lohoe Broad - Lip. Petiv. Gall. Gueule noire. Argenv.

Testa labro prominulo, anfractibus rotundatis aequalibus, fauce sanguinea, columella nigra.

Die Schalenleſze raget hervor, die Gewinde ſind rundlich, und gleich, der Schlund bluthroth, die Spindel ſchwarz.

Liſt. Hiſt. Conch. l. 4. f. 12. f. 6.

— — Gaz. t. 98. f. 10.

Petiv. amb. t. 14. f. 12.

Rumph. amb. t. 37. f. S.

Gualt. Teſt. t. 31. f. H, 3.

Argenv. Conch. Pl. 14. f. N.

Seb. Theſ. III. t. 61. f. 20, 21. t. 62. f. 31, 32.

Knor. Vergn. V. 16. t. 5. f.

Mart. Konch. Kab. III. 77. t. 789. 790. f.

H. II. 6. Strombus fasciatus.

H. II. 6. Die gebänderte Flügelſchnecke.

Testa labro prominulo, anfractibus infimis obtuse spinosis, ventre fasciis fuscis.

Die Schalenleſze raget etwas hervor, die unterſten Gewinde ſind mit ſtumpfen Stacheln gekrönet, und der Leib mit braunen Bändern umgeben.

Mart.





*Mart. Konch. Kab. III. 78. t. 800 - 802. f.*

Testa laevis. Anfractus septem, infimi duo spinosi, spinis obtusis. Labrum rotundatum prominulum. Labium reflexum. Basis obtusa biloba. Color testae albus, ventris fasciis interruptis fuscis; faux rosea.

Die Schale ist glatt. Die Gewinde der Zahl nach sieben, davon die untersten mit stumpfen Knoten besetzt sind. Die Schalenlefze ist rundlich, raget etwas hervor. Die Spindellefze übergeschlagen. Der Grund stumpf und zweifachig. Die Schale ist weiß, mit braunen unterbrochenen Bändern bemalt; der Schlund rosenroth.

H. II. 7. Strombus gibberulus.

*Linn. S. N. Sp. 501.*

H. II. 7. Die höckerige Kanarienschnecke.

*Belg. Gebande Kanartje. Angl. Gall. Ailée bossue. Angl. Girdled Canarie. Pet.*

Testa labro prominulo, dorso laeui, anfractibus gibbosis inaequalibus.

Die Schalenlefze raget hervor, der Rücken ist glatt, die Gewinde sind höckerig und ungleich.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 12. f. 1.*

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 150.*

*Rumph. amb. t. 37. f. V.*

*Petiv. amb. t. 14. f. 13.*

*Gualt. Test. t. 31. f. N.*

*Seb. Thes. III. 61. t. 53. f.*

*Knor. Vergn. II. 14. t. 3. f.*

— — — III. 13. t. 4. f.

*Mart. Konch. Kab. III. 77. t. 792—796. f.*



H. II. 8. Strombus Oniscus.

H. II. 8. Die Affel-  
schnecke.

Linn. S. N. Sp. 502.

Belg. Graeuwe Moerbey. Valent.

Testa ovata, cingulis nodosis, spirae apice mucronato, labro granulato, basi obtusa.

Die eiförmige Schale hat knotige Gürteln, eine verdünnte Wirtelspize; mit körniger Schalenleiste und stumpfen Grunde.

List. Hist. Conch. l. 4. f. 10. f. 44.

Petiv. Gaz. t. 48. f. 16.

Gualt. Test. t. 22. f. 7.

Seb. Thes. III. t. 55. f. 23.

Knor. Vergn. IV. 12. t. 4. f.

—— — VI. 15. t. 6. f.

Mart. Konch. Kab. II. 34. t. 357. 358. f.

H. III. Strombus ampliatus.

H. III. Mit ausgebreiteten Flügeln.

H. III. 1. Strombus Lucifer.

H. III. 1. Die Kameelschnecke.

Linn. S. N. Sp. 503.

Belg. Gemarmelde Kameelhoorn. Angl. Spiked Whelk. Gall. Chameau.

Testa transversum dupliciter striata, spira carinata, minute tuberculato.

Die in die Quere doppelte gestreifte Schale hat keilsförmige kleinknottige Schnirkelgewinde.

Bonap.



*Bonan. Recr. cl. 3. f. 303.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 13. f. 4—6.*

*Rumph. amb. t. 49. f. M.*

*Valent. Abb. t. 10. f. 88.*

*Gualt. Test. t. 55. f. A. B. E.*

*Argenv. Conch. Pl. 14. f. 7.*

*Seb. Tbes. III. t. 61. f. 8; t. 62. f. 38—40.*

*Knor. Vergn. II. 29. t. 1. f.*

— — — III. 5. t. 4. f; 16. t. 4. f.

*Mart. Konch. Kab. III. 90. t. 878, 886.*

*Da Cost. Elem. Pl. 5. f. 2.*

H. III. 2. Strombus Gi- H. III. 2. Die gezakte  
gas. Schweizerhose.  
*Linn. S. N. Sp. 504.*

*Belg. Getakt Vleugel - Hoorn. Angl. The large Conch. Gall. La  
grande Aillée. Ital. Ognicella.*

Testa labro rotundato ma- Die rundliche Schalenleſze  
ximo, ventris spiraeque spi- ist sehr groß, der Leib und  
nis patentibus. Schnirkel mit ausgebreiteten  
kegelförmigen Stacheln beſezet.

Fauce rosea. Mit rosenrothem Schlunde.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 307. 321.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 12. f. 19.*



*Gualt. Test. t. 33. f. A; t. 54. f. M.*

*Knor. Vergn. III. 17. t. 1. f.*

*Mart. Konch. Kab. III. 80. t. 824. f.*

H. III. 3. Strombus Epi-  
dromis.

H. III. 3. Das Besans-  
segel.

*Linn. S. N. Sp. 506.*

*Belg. Bezaantje Rumph. Angl. Great Canalic. Pet. Gall. La Tour-  
terelle, Dav.*

Testa labro rotundato, bre-  
ui, ventre laevi, spira sub-  
nodosa.

Die rundliche Schalenleiste  
ist kurz, der Leib glatt, der  
Schnitzel etwas knottig.

*Bonan. Mus. Kirch. f. 146.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 12. f. 10.*

*Petiv. Gaz. t. 98. f. 11.*

— amb. t. 14. f. 18.

*Rumph. amb. t. 36. f. M.*

*Seb. Tbes. III. t. 62. f. 21 — 23. 26.*

*Knor. Vergn. VI. 33. t. 2. f.*

*Mart. Konch. Kab. III. 79. t. 821. f.*



H. III. 4. Strombus Ca-  
narium.

H. III. 4. Das Säub-  
chen.

Linn. S. N. Sp. 507.

Belg. Bultje Rumph. Angl. Hunchbackt Canarie Pet. Gall. Pigeonne.

Testa tumida, laevi; labro  
rotundato, breui, retuso.

Die bäuchige glatte Schale,  
hat eine rundliche, kurze, ein-  
gezogene Schalenleiste.

Bonan. Recr. cl. 3. f. 146.

List. Hist. Conch. l. 4. f. 12. f. 9.

Petiv. Gaz. t. 98. f. 13.

— amb. t. 14. f. 17.

Rumph. amb. t. 36. f. N.

Gualt. Test. t. 32. f. N. L.

Argenv. Conch. Pl. 14. f. Q.

Seb. Thes. III. t. 62. f. 28, 29, 24, 25.

Klein. Meth. Ostr. t. 4. f. 73.

Knor. Vergn. I. 18. t. 5. f.

Mart. Conch. Kab. III. 79. t. 817. 818. f.

H. III. 5. Strombus vit-  
ratus.

H. III. 5. Das aufge-  
wickelte Besanssegel.

Linn. S. N. Sp. 508.

Belg. Opgerolde Bezaantje. Rumph. Angl. Great net Whelk. Pet.  
Gall. Misaine roulée.

S 4

Testa





Testa labro rotundato, ventre laeui, spirae elongatae anfractibus sutura distinctis,

Die Schalenleiste ist rundlich, der Leib glatt, die Gewinde des verlängerten Schnirkels haben eine Zwischennath.

*Petiv. Gaz. t. 98. f. 12.*

— amb. t. 7. f. 9.

*Rumph. amb. t. 36. f. 0.*

*Argenv. Conch. Pl. 9. f. F.*

*Seb. Thes. III. t. 62. f. 18 — 20.*

*Knor. Vergn. III. 20. t. 2. f.*

*Mart. Konch. Kab. III. 79. t. 822. f.*

H. III. 6. *Strombus acinctus.*

H. III. 6. Die breite Kanarienschnecke.

*Linn. S. N. Sp. 509.*

*Belg. Geblomde Kanarie. Angl. Broad knobbed Canarie. Petiv.*

Testa labro rotundato, spirae anfractibus striatis, ventre laeui, cingulis quatuor albo maculatis.

Die Schalenleiste ist rundlich, die Gewinde gestreift, der Leib glatt, mit vier weißen gestreuten Gürteln.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 12. f. 16.*

*Rumph. amb. t. 37. f. X.*

*Petiv. amb. t. 14. f. 19.*

*Argenv.*



*Argenv. Conch. Pl. 10. f. C.*

*Seb. Thes. III. t. 61. f. 15.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

H. III. 7. Strombus Ur-  
ceus.

*Linn. S. N. Sp. 312.*

H. III. 7. Die knottige  
Kanarienschnecke.

*Belg. Gebulde Kanary. Rumph. Angl. Long knobbed Canarie. Pet.*

Testa labro attenuato, stria-  
to, ventre spiraque plicato  
nodosis.

Die Schalenlesze ist vereng-  
get und gestreift, der Leib  
und der Schnirsel mit Knotten  
und Falten besetzt.

$\alpha$  alba transversim striata, (major.)  $\alpha$  weiß, der Quere nach gestreift,  
(größer.)

$\beta$  fusco maculata, aut reticulata,  $\beta$  glatt, mit braunen Flecken, oder  
Netz (kleiner.)

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 12. f. 13.*

*Petiv. Gaz. t. 98. f. 14.*

— amb. t. 14. f. 21.

*Rumph. amb. t. 37. f. T.*

*Gualt. Test. t. 32. f. E.*

*Seb. Thes. III. t. 60. f. 28. 29.*

*Knor. Vergn. III. 13. t. 5. f.*

*Mart. Konch. Kab. III. 78. t. 804 — 806. f.*



H. IV. Turriti.

H. IV. Gethürmte Flügel-schnecken.

H. IV. 1. Strombus turberculatus.

H. IV. 1. Die knottige Nadel.

*Linn. S. N. Sp. 415.*

Testa turrita, transuersim striata, nodis glabris cincta; labro incrassato.

Die gethürmte Schale ist in die Quere gestreift, mit glatten Knotten umgeben, an der Schalenlesze verdickt.

*Mart. Konch. Kab. IV. 157. t. 1490. f.**Mus. Caes. Vindobon.*

I. Murex.

I. Die Stachelschnecke.

Testa spiralis suturis longitudinalibus varicosis. Apertura desinens in canallem rectum, aut subascendentem.

Die schnirkelförmig gewundene Schale ist der Länge nach mit wulstigen Rätthen besetzt. Die Mündung endiget sich in eine gerade, oder etwas aufsteigende Rinne.

I. I. Spinosi, rostro elongato.

I. I. Dornige, mit verlängertem Rüssel.

I. I. 1. Murex Haustellum.

I. I. 1. Der Schnepfenschnabel.

*Linn.*



*Linn. S. N. Sp.* 518.

*Belg.* Scheppertje. *Rumph. Angl.* The common Woodcock Shell.  
*Gall.* Tete de Becasse. *Dav.*

Testa subovata tuberculata, Die etwas eiförmige knotiz-  
rostro elongato subulato, recto, ge Schale hat einen verlänger-  
inermi. ten ablsförmigen, geraden, un-  
bewaffneten Küßel.

« incarnata, maculis nigris.

« fleischroth, mit schwarzen Flecken.

ß niuea, maculis rufis.

ß schneerweiß, mit braunrothen  
Flecken.

*Bonan. Recr. cl.* 3. f. 268.

*List. Hist. Conch. l.* 4. f. 13. f. 23.

*Rumph. amb. t.* 26. f. F.

*Petiv. amb. t.* 4. f. 8.

*Gualt. Test. t.* 30. f. E.

*Argenv. Conch. Pl.* 16. f. B.

*Klein. Meth. Ostr. t.* 4. f. 81.

*Seb. Thes. III. t.* 78. f. 5, 6.

*Hill. Hist. of. Anim. Pl.* 8.

*Knor. Vergn. I.* 12. t. 2, 3. f.

—— ——— *III.* 9. t. 4. f.

*Mart. Konch. Kab. III.* 115. t. 1066. f.

I. I. 2. Murex Tribulus. I. I. 2. Die Spinne.

*Linn. S. N. Sp.* 519.

*Belg.*



Belg. Spinnekop. Rumph. Angl. Thorney Woodcock. Hill. Gall.  
La becaffe epineuse. Dav.

Testa ouata, spinis setaceis Die eysförmige Schale ist  
trifariis, rostro elongato, sub- mit einer dreifachen Reihe bor-  
lato, spinoso. stiger Stacheln besetzt, und mit  
einem verlängerten, abisförmigen, stachelichten Rüssel versehen.

α spinis simplicibus, alternis majo- α mit einfachen wechselweise größe-  
ribus. ren Stacheln.

Bonan. Recr. cl. 3. f. 269.

List. Hist. Conch. l. 4. f. 13. f. 22.

Petiv. Gaz. t. 101. f. 16.

— amb. t. 6. f. 8.

Rumph. amb. t. 26. f. G.

Gyalt. Test. t. 31. f. A.

Seb. Thes. III. t. 78. f. 4.

Hill. Hist. of. Anim. Pl. 8.

Knor. Vergn. I. 11. t. 3. 4. f.

— Delic. nat. t. B. V. f. 5.

Murr. Fund. Test. t. 1. f. 15.

Mart. Kench. Kab. III. 113. t. 1053. 1054. f.

Da Cost, Elem. Pl. 4. f. 5.

β spinis subaequalibus duplicatis. β mit beynabe gleichgroßen doppel-  
ten Stacheln.

Rumph. amb. t. 26. f. 3.

Gyalt. Test. t. 31. f. B.

Argenv.





*Argenv. Conch. Pl. 16. f. A.*

*Seb. Thes. III. t. 78. 1 — 3. f.*

*Knor. Verg. V. 27. t. 1. f.*

*Mart. Konch. Kab. III. 113. t. 1052. f.*

I. I. 3. *Murex cornu-*  
*rus,*

I. I. 3. Der gezackte  
Schneepfentopf.

*Linn. S. N. Sp. 520.*

*Belg. Gedoornde Snippekop. Angl. Thorney Snipe. Gall. La*  
*grande Massie d'Hercule. Dav.*

Testa subrotunda, spinis  
subulatis obliquis, rostro elon-  
gato, spinis sparsis.

Die rundliche Schale hat  
ahlsförmige schiefstehende Sta-  
cheln und einen verlängerten  
mit zerstreuten Stacheln besetz-  
ten Rüssel.

*Bonap. Recr. cl. 3. f. 283.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 13. f. 21.*

*Rumph. amb. t. 26. f. 5.*

*Gualt. Test. t. 30. f. D.*

*Adans. Seneg. Pl. 8. f. 20.*

*Seb. Thes. III. t. 78. f. 7 — 9.*

*Knor. Vergn. VI. 17. t. 1. f.*

*Mart. Konch. Kab. III. 114. t. 1057. f.*



I. I. 4. Murex Brandaris.

I. I. 4. Der dornige Schnepfentopf.

Linn. S. N. Sp. 521.

Belg. Getackte Snippekop Rumph. Argl. The common thorney Murex. Pet. Gall. Massüe d' Hercule. Dav.

Testa ouata, spinis rectis, rostro mediocri subulato, recto, labio excauato.

Die eysförmige Schale hat gerade Stacheln, einen mittelmässig langen ablsförmigen geraden Rüssel mit einer ausgehöhlten Schalenleiste.

Bonan. Recr. cl. 3. f. 281.

Petiv. Gaz. t. 68. f. 12.

Rumph amb. t. 26. f. 4.

Gualt. Test. t. 30. f. F.

Argenv. Zoom. Pl. 4. f. C.

Ginan. adr. II. t. 8. f. 61. 62.

Regenf. Samml. 6. t. 67. f.

Knor. Vergn. II. 18. t. 1. 2. f.

—— ——— 22. t. 4. 5. f.

Mart. Konch. Konch III. 114. t. 1060. 1061. f.

—— ——— 115. t. 1062 - 1065. f.

I. I. 5. Murex Trunculus.

I. I. 5. Das gehörnte Purpurhorn.

Linn. S. N. Sp. 522.

Belg.



*Belg.* Gebandeerde Purper - Hoorn. *Gall.* Pourpre a bandes.

Testa ovata nodosa, spinis Die eysförmige knotige Scha-  
 anticis majoribus, rostro trun- le hat vorne größere Stacheln,  
 cato breui, perforato, und einen stumpfen kurzen  
 durchbohrtenüssel.

*Bonan.* *Recr. cl.* 3. f. 271, 274, 277.

*Gualt.* *Test. t.* 31. f. C.

*Argenv.* *Conch. Pl.* 16. f. G.

*Klein.* *Meth. Ostr. t.* 6. f. 104.

*Seb.* *Tbes. III. t.* 52. f. 15. 16.

*Knor.* *Vergn. III. 13. t. I. f.*

—— — V. 13. t. 4. f.; 19. t. 6. f.

*Mart.* *Konch. Kab. III, 109. t. 1019. 1020. f.*

I. II. Suturis foliaceis: Purpurac.  
 distac.

I II. Mit blätterigen Näthen: so-  
 genannte Purpurschnecken.

I. II. I. Murex tripte-  
 rus.

I. II. I. Die dreyflüg-  
 lige Purpurschnecke.

*Belg.* Vleugel - hoornetje. *Gall.* Pourpre triangulaire ailée. *Dav.*

Testa elongata triangulari, Die länglichte, dreyeckig-  
 angulis alato membranaceis. Schale hat flügel förmig aus-  
 gebreitete Ecken.

*Mart.* *Konch. Kab. III. III. t. 1033. f.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa



Testa elongato triangularis, transuersim rugosa; rugae inaequales acutae, striis eleuatis longitudinalibus subtilissimis; decussatae. Spira constans anfractibus septem, tuberculis solitariis inter futuras obstita. Suturae longitudinales tres obsoletae, totidem constituentes angulos expansos in membranas plicatas aliformes. Apertura tuberculata ouato oblonga, definens in canalem rectum spira breuiorem. Color nitens-nivus.

Die länglichte dreyeckige Schale ist in die Quere gerunzelt; Die Runzeln sind ungleich, und scharf, und mit erhabenen feinen Streifen der Länge nach durchkreuzt. Der Schnirkel bestehet aus sieben Gewinden, die zwischen den Nätzen mit einzelnen Körnern besetzt sind. Nach der Länge laufen drey undeutliche Nätze, welche eben so viele Ecken bilden, die sich in häutige gefaltene Flügel ausbreiten. Die länglicht eiförmige Mündung ist mit Körnchen besetzt, und endiget sich in eine gerade Rinne, die kürzer als der Schnirkel ist. Die Farbe ist glänzend schneeweiß.

## I. II. 2. Murex triquet- ter.

## I. II. 2. Die dreyseiti- ge Purpurschnecke.

Belg. Geplekte Vleugel - Hoorentje. Gall. Pourpre triangulaire tachetée.

Testa elongata triquetra subalata, reticulatim costata, rostro recto clauso.

Die länglichte dreyseitige einigermassen geflügelte Schale ist mit nezförmigen Ribben besetzt, und mit einem geraden geschlossenen Rüssel versehen.

Mart. Konch. Kab. III. III. t. 1038. f.

Mus. Caes. Vindobon.

Testa elongata, costis transuersis, & longitudinalibus reticulatim decussata. Spira pyramidata composita ex anfractibus senis. Suturae longitudinales tres, eleuatae; angulos totidem constituentes, in membranas plicatas obsoletas excrecentes; quarum illa nonnisi labri externi, manifesta est. Apertura ellip-

Die Schale ist länglicht, mit nach der Länge, und in die Quere laufenden Ribben durchkreuzt. Der pyramidenförmige Schnirkel bestehet aus sechs Gewinden. Die drey nach der Länge stehenden erhabenen Nätze bilden eben so viele Ecken, welche sich in gefaltene, unvollkommene Flügel verbreiten, davon  
rica,



tica, desinens in canalem elongatum rectum clausum. Labrum crenulatum. Color albus maculis dispersis rubris.

nur sener an der Schalenleese deutlich ist. Die Mündung ist elliptisch, und verlängert sich in eine gerade geschlossene Rinne. Die Schalenleese ist gekerbet. Von weißer Farbe mit rothen Flecken.

I. II. 3. *Murex ramosus*.

I. II. 3. Die Kraussschnecke.

*Linn. S. N. Sp. 523.*

*Belg. Ocean-Hoorn. Rumph. Angl. The Caltrup Shell. Hill. Gall. Chauffe Trape. Argent.*

Testa oblonga, triangula, trifariam frondosa, anfractibus contiguis, rostro truncato.

Die längliche, dreieckige Schale hat dreh Reihen krausser Blätter, aneinandergewachsene Windungen, und einen abgestumpften Rüssel.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 275. 276.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 14. f. 41.*

*Rumph. amb. t. 26. f. A. I.*

*Petiv. amb. t. 12. f. 2.*

*Gualt. Test. t. 37. f. G. D. L.; t. 38. f. A.*

*Valent. Abb. t. 4. f. 38; 5. t. 42. f.*

*Argent. Conch. Pl. 16. f. C. E. H.*

— *Zoom. Pl. 4. f. D.*

*Seb. Thes. III. t. 77. f. 1. 2. 7.*

*Klein. Meth. Ostr. t. 4. f. 8.*

*Hill. Hist. of. Anim. Pl. 8.*





Regenf. Samml. I. 6. t. 6. f.

Knor. Vergn. I. 26. t. 1. 2. f.

— — — III. 9. t. 3. f.

— — — V. 11. t. 1. f.

Mart. Konch. Kab. III. 102. t. 980. f.

— — — 103. t. 981 — 983. f.

— — — 104. t. 984 — 986. f.

— — — 105. t. 987 — 989. f.

# I. II. 4. Murex Scorpio. I. II. 4. Die Skorpion- schnecke.

Linn. S. N. Sp. 524.

Belg. Scorpioentje Rumph. Angl. Least ragged Whelk. Petiv. Gall.  
Patte de Crapaud. Dav.

Testa quadrifariam frondosa, spira capitata, rostro truncato. Die Schale hat drey Reihen krauser Blätter, einen kolbigen Schnickel, und abgestumpften Rüssel.

Rumph. amb. t. 26. f. D.

Petiv. amb. t. 9. f. 14.

Valent. Abb. t. 4. f. 36. 37.

Gualt. Test. t. 37. f. M.

Argenv. Conch. Pl. 16. f. D.

Seb.



Seb. Thes. III. t. 77. f. 13 — 16.

Knor. Vergh. II. II. t. 4. 5. f.

Mart. Konch. Kab. III. 112. t. 1040 — 1041. f.

Da Cost. Elem. Pl. 5. f. 6.

I. II. 5. Murex saxatilis.

I. II. 5. Das Brandshorn.

Linn. S. N. Sp. 525.

Belg. Dubbelde Brana - Hoorn. Angl. The Endive - Shell. Hill. Gall. La Chicorée. Argenv.

Testa sexariam frondosa, Die sechsfach krausblätteri-  
anfractibus contiguis, rostro ge Schale, hat aneinander ge-  
abbreviato, wachsende Bindungen, und ei-  
nen verkürzten Rüssel.

α brunna.

α Braun.

β nivea, frondibus nigris.

β Schneeweiß, mit schwarzen Kraus-  
blättern.

Rumph. amb. t. 26. f. C. 2.

Petiv. amb. t. 12. f. 1.

Argenv. Conch. Pl. 16. f. K.

Seb. Thes. III. t. 77. f. 5, 6.

Hill. Hist. of. Anim. Pl. 8.

Regenf. Samml. I. I. t. 2. f.



*Knor. Vergn. II. 7. t. 4. 5. f.*

—— ——— III. 9. t. 2. f.

—— ——— VI. 19. t. I. 4. f.

*Murr. Fund. Test. t. I. f. 26.*

*Mart. Konch. Kab. III. 107. t. 1004-1010. f.*

—— ——— 108. t. 1011-1014. f.

I. II. 6. *Murex Erina-*  
*ceus.*

I. II. 6. Die vieleckige  
Purpurschnecke.

*Linn. S. N. Sp. 526.*

Testa multifariam subfron-  
dosa, spirae anfractibus mult-  
angulis, rostro breuiusculo.

Die Schale hat viele un-  
vollkommene Krausblätter, viel-  
eckige Wirbelgewinde, und ei-  
nen etwas verkürzten Rüssel.

*Gualt. Test. t. 49. f. H.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

I. III. Varicosi, futuris rotundis,  
torosis.

I. III. Warzige, mit runden Knot-  
tigen Röhren.

I. III. I. *Murex Rana,*

I. III. I. Die Kröten-  
schnecke.

*Linn. S. N. Sp. 527.*

*Belg. Padde-Hoorn. Rumph.*  
*Gall. Rzerocheuse, Dav.*

*Angl. Wide cadoe Wheelk. Petiv.*

Testa



Testa futuris oppositis, compressis, cingulis mucicatis, apertura ouata.

Die Schale hat entgegengesetzte Zusammengedrückte Rätze, dornige Gürteln, und eine eyrunde Oefnung.

α testa rotundata, spinis dorſi, & suturarum breuibus.

α mit rundlicher Schale, deren Rücken und Rätze mit kurzen Dörnern beſetzt ſind.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 182.*

*List. Hiſt. Conch. l. 4. f. 15 f. 59.*

*Petiv. Gaz. t. 100. f. 12.*

— amb. t. 11. f. 15.

*Rumph. amb. t. 24. f. G.*

*Gualt. Teſt. t. 49. f. L.*

*Argenv. Conch. Pl. 9. f. D.*

*Seb. Theſ. III. t. 60. f. 15 — 18.*

*Regenf. Samml. I. 6. t. 64. f.*

*Knor. Vergn. II. 13. t. 6. 7. f.*

*Mart. Konch. Kab. IV. 133. t. 1271. f.*

β testa compressa, spinis suturarum elongatis.

β mit platgedrückter Schale, und verlängerten Stacheln auf den Rätzen.

*List. Hiſt. Conch. l. 4. f. 14. f. 44.*

*Seb. Theſ. III. t. 60. f. 19.*

*Knor. Vergn. III. 7. t. 5. f.*

*Mart. Konch. Kab. IV. 133. t. 1275. 1276. f.*



I. III. 2. Murex Gyri-  
nus.

Linn. S. N. Sp. 528.

Belg. Vorscheen - Poppe. Gall. Grenouillete.

Testa futuris oppositis, con-  
tinuatis, cingulis tuberculosis  
fasciata; apertura rotunda.

I. III. 2. Die Frosch-  
schnecke.

Die Schale hat entgegen-  
gesetzte ununterbrochene Rätze,  
und ist mit knottigen Gürteln,  
und einer rundlichen Mündung  
versehen.

Seb. Thes. III. t. 60. f. 25 — 27.

Knor. Vergn. VI. 25. t. 5. 6. f.

Mart. Konch. Kab. IV. 128. t. 1233. 1234. f.

I. III. 3. Murex Lam-  
pas.

Linn. S. N. Sp. 529.

I. III. 3. Der knottige  
Delffuchen.

Belg. Gebulde Olykoek. Rumph. Angl. Knopped Trumpet. Petiv.  
Gall. Culotte de Suisse Dav.

Testa granulosa, futuris op-  
positis, cingulis tuberculatis,  
labro dentato, labio striato.

Die körnige Schale hat ent-  
gegengesetzte Rätze, knottige  
Querbänder, eine gezähnte  
Schalenleiste, und gestreifte  
Spindellippen.

Bonan. Recr. el. 3. f. 103.

List. Hist. Conch. l. 4. f. 15. f. 88.

Rumph. amb. t. 28. f. C.

Petiv. amb. t. 12. f. 16. 17.

Gualt.





*Gualt. Test. t. 50. f. D.*

*Argenv. Conch. t. 9. f. D.*

*Knor. Vergn. II. 28. t. I. f.*

*Mart. Konch. Kab. III. 106. t. 998 — 123. f.*

I. III. 4. *Murex Olearium,*

I. III. 4. Der geribbte  
Delfuchen.

*Linn. S. N. Sp. 530.*

*Belg. Gebande Argus Oogen. Rumph. Angl. Girdled Argus Shell.*  
*Petiv. Gall. Argus a boutons-*

*Testa saturis alternis, cin-*  
*gulis nodosis, dorso postice*  
*transuersim striato.*

Die Schale hat wechselwei-  
se stehende Nöthe, knottige  
Gürteln, und einen hinten mit  
Querstreifen besetzten Rücken.

*Bonan. Recr. cl. 3. t. 289.*

*Rumph. amb. t. 49. f. E.*

*Petiv. amb. t. 6. f. 6.*

*Gualt. Test. t. 50. f. A.*

*Knor. Vergn. V. 3. t. 3. f.*

*Mart. Konch. Kab. IV. 127. t. 1223. f.*

I. III. 5. *Murex cost-*  
*rus.*

I. III. 6. Der eckige  
Delfuchen.

T 4

Testa



Testa subfusiformi, costis Die einigermassen spindelför-  
transuersis angulatis, sutura mige Schale, hat eckige Quer-  
solitaria, rostro elongato. ribben, eine einzelne Nath,  
mit einem verlängerten Rüssel.

Seb. Thes. III. 1. 57. f. 31.

Mart. Konch. Kab. IV. 131. t. 1253. f.

Testa subfusiformis. Anfractus Die Schale ist einigermassen spin-  
circiter octo, cincti costis crassis, delförmig Die Gewinde, deren  
convexis, angulatis. Sulci inter- beiläufig acht sind, haben diese er-  
medii striati, striis elevatis, dupli- habene eckige Ribben. Die Zwi-  
catis. Sutura varicosa, solitaria, schenfurchen sind gestreift, die  
labro subopposita. Apertura plica- Streifen erhaben und doppelt. Die  
ta, ovato oblonga, delinens in ro- Nath ist knottig und einzeln, der  
strum umbilicatum, canaliculatum Schalenleiste gegenüberstehend. Die  
recurvum. Color pallide luteus. gefaltene länglich eysförmige Mün-  
dung endiget sich in einen nabel-  
förmig eingedrückten, rinnenarti-  
gen gekrümmten Rüssel. Die Far-  
be ist bläßgelb.

I, III, 6. Murex Femor-  
rile.

I, III, 6. Das Fußhorn.

Linn. S. N. Sp. 531.

Belg. Voet - Hoorn. Rumph. Angl. Stoené Whelk. Gall. Rhino-  
ceros. Dav.

Testa rugosa, trigona; spi- Die runzelichte dreyeckige  
rae apice tuberculato, aper- Schale hat eine knotige Wir-  
tura edentula, antice trans- belspitze, mit einer ungezäh-  
uersim expansa. ten vorne in die Quere erwei-  
terten Mündung.

Bonan. Recr. cl. 3. f. 290.

List. Hist. Conch. l. 4. f. 14. f. 37.

Rumph. amb. t. 26. f. B.

Pesiv.



*Petiv. amb. t. 12. f. 3.*

*Gualt. Test. t. 50. f. C.*

*Argenv. Conch. Pl. 10. f. B.*

*Seb. Thes. III. t. 63. f. 7 — 10.*

*Knor. Vergn. IV. 16. t. 1. f.*

— *Del. nat. I. t. B. IV. f. 2.*

*Mart. Konch. Kab. III. 111. t. 1039. f.*

I. III. 7. *Murex cuta-*  
*ceus.*

I. III. 7. Die Haut-  
schnecke.

*Linn. S. N. Sp. 532.*

*Belg. Vell - Hoorn. Gall. Degrés bordés.*

Testa futura solitaria, no-  
disque transuersim decussatis,  
apertura dentata, columella  
perforata.

Die Schale hat eine einzeln  
ne Naht, in die Quere durch-  
kreuzte Knotten, eine gezäh-  
te Mündung, und durchbohrte  
Spindel.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 14. f. 38.*

*Seb. Thes. III. t. 52. f. 10. 11.*

*Mart. Konch. Kab. IV. 118. t. 1085, 1086. f.*

I. III. 8. *Murex Pyrum.*

I. III. 8. Die getrock-  
nete Birne.

*Linn. S. N. Sp. 535.*

*Belg. Gedrooyede Peer. Rumph. Angl. Hairy Whelk. Petiv. Gall.*  
*Poire seche.*

Testa ouata, nodosa, trans-  
uersim sulcata, rostro elonga-  
to flexuoso.

Die eiförmige knottige Scha-  
le ist in die Quere gefurchet,  
und mit einem langen geboge-  
nen Rüssel versehen.

*List.*



*Rumph. amb. t. 26. f. E.*

*Petiv. amb. t. 12. f. 4.*

*Gualt. Test. t. 37. f. F.*

*Argenv. Conch. Pl. 10. f. G.*

*Regenf. Samml. I. 6. t. 60. f.*

*Knor. Vergn. II. 7. t. 2. 3. f.*

*Mart. Konch. Kab. III. 112. t. 1040. 1041. f.*

I. III. 9. *Murex Ruber*  
*cula.*

I. III. 9. Die Livrees  
schnecke.

*Linn. S. N. Sp. 536.*

*Belg. Livreyhoorn. Gall.*

Testa futuris oppositis, cin-  
gulis nodulosis, apertura den-  
tata.

Die Schale hat entgegen-  
gesetzte Nätze, knottige Gür-  
teln, und eine gezähnte Mün-  
dung.

*Gualt. Test. t. 49. f. I.*

*Argenv. Conch. Pl. 9. f. I.*

*Seb. Thes. III. t. 49. f. I — 5.*

*Knor. Vergn. I. 13. t. 3. 4. f.*

—— — III. 5. t. 2. 3. f.

*Mart. Konch. Kab. IV. 132. t. 1259 — 1266. f.*

I. III. 10.



I. III. 10. *Murex reticularis*.

*Linn. S. N. Sp.* 538.

I. III. 10. Die Netzschnecke.

Testa suturis suboppositis, tuberculata, striis elevatis reticulatis, rostro abbreviato,

Die knottige Schale hat einigermassen entgegengesetzte Ränder, netzförmig durchkreuzte erhabene Streifen, und einen verkürzten Rüssel.

*Bonan. Recr. cl. 3. f.* 193.

*List. Hist. Conch. l. 4. f.* 14. *f.* 30.

*Petiv. Gaz. t.* 153. *f.* 6.

*Gualt. Test. t.* 49. *f.* M.

*Mus. Caes. Vindobon.*

I. III. 11. *Murex Anus*.

I. III. 11. Das frumme Maul.

*Linn. S. N. Sp.* 539.

*Belg. Oorhorn. Valent. Angl. Hairy - Ear. Petiv. Gall. La Grimace:*

Testa gibbosa reticulatim tuberculata, suturis, & labiis dilatato membranaceis, rostro erecto.

Die höckerige, netzförmige, knottige Schale, hat ausgebreitete häutige Ränder und Lippen, mit einem aufgerichteten Schnabel.

*Bonan. Recr. cl. 3. f.* 279. 280.

*List. Hist. Conch. l. 4. f.* 11. *f.* 57.

*Petiv.*





*Petiv. Gaz. t. 74. f. 9. ; t. 99. f. 10.*

— *amb. t. 6. f. 4.*

*Rumph. umb. t. 24. f. F.*

*Gualt. Test. t. 37. f. B. E.*

*Argenv. Conch. Pl. 9. f. H.*

*Seb. Thes. III. t. 60. f. 6. 7.*

*Hill. Hist. of. Anim. Pl. 8.*

*Knor. Vergn. III. 3. t. 5. f.*

*Mart. Konch. Kab. II. 41. t. 403. 404. f.*

*Da Cost. Elem. Pl. 4. f. 2.*

I. IV. Echinati, sine rostro.

I. IV. Dornige, ohne Rüssel.

I. IV. 1. Murex Ricinus.

I. IV. 1. Die gezackte  
Maulbeere.

*Linn. S. N. Sp. 540.*

*Belg. Gedakte Moerbey. Rumph. Angl. Small Spur Shell. Pet. Gall-  
L' Herisson. Dav.*

Testa ovata, spinis subula-  
tis, apertura dentata.

Die eiförmige Schale ist  
mit ahlförmigen Dörnern beset-  
zet, und an der Mündung ge-  
zähnt.

♂ ore luteo, spinis longioribus  
(minor).

♂ mit gelber Mündung, und längeren  
Dörnern (kleiner).

♂ ore amethystino, spinis breviori-  
bus (major).

♂ mit amethystfarbener Mündung,  
und kürzeren Dörnern (größer).

*Rumph.*



*List. Hist. Conch. l. 4. f. 11. f. 12.*

*Rumph. amb. t. 24. f. E.*

*Petiv. amb. t. 11. f. 11.*

*Gualt. Test. t. 28. f. N.*

*Seb. Thes. III. t. 60. f. 37. 3942.*

*Knor. Vergn. I. 25. t. 5. 6. f.*

—— ——— VI. 24. t. 7. f.

*Mart. Konch. Kab. III. 101. t. 972. 973 f;*

—— ——— 102. t. 976. 977. f.

# I. IV. 2. Murex Nodus. I. IV. 2. Die große Kastanie.

*Linn. S. N. Sp. 541.*

*Belg. De bandeerde Castanje. Angl. The great Chesnut. Gall. La Chataigne a bandes.*

*Testa utrinque attenuata, spinis conicis, labro tuberculato, columella laevi.* Die beiderseits zugespitzte Schale ist mit kegelförmigen Stacheln besetzt, an der Schalenleiste knottig, an der Spindel glatt.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 15. f. 10.*

*Seb. Thes. III. t. 60. f. 12.*

*Knor. Vergn. II. 2. t. 3. f.*

*Mart. Konch. Kab. III. 100. t. 957. 958. f.*



I. IV. 3. *Murex neritoides*.

*Linn. S. N. Sp. 542.*

*Belg. Roots - Hoorn met Moesjesjes. Angl. The Coequet. Gall. La Coquette.*

Testa obtuse nodosa, labro angulato, columella complanata, bimaculata.

I. IV. 3. Das Schminkepfasterchen.

Die Schale ist mit stumpfen Knotten besetzt, an der Seitenleiste eckig, mit zweien Flecken an der flachgedrückten Spindel.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 15. f. 50.*

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 173. 174.*

*Petiv. Gaz. t. 19. f. 10.*

*Gualt. Test. t. 66. f. B. E.*

*Klein. Meth. Ostrac. t. 1. f. 30.*

*Mart. Konch. Kab. III. 100. t. 959. 960. f.*

I. IV. 4. *Murex Mancinella*.

*Linn. S. N. Sp. 544.*

*Belg. Langverpige Maerberzie. Angl. The Malberry Shell, Hill. Gall. La Mure allongée.*

Testa ovata oblonga, tuberculis acutis muricata, ore dentato amethystino.

I. IV. 4. Die lange Maulbeere.

Die eiförmige längliche Schale ist mit spitzigen Dornen bewafnet, mit einer amethystfarbenen gezähnten Mundung.

*List.*



List. Hist. Conch. l. 4. f. 15. f. 5.

Petiv. Gaz. t. 48. f. 14.

Argenv. Conch. Pl. 17. f. H.

Hill. Hist. of Anim. Pl. 8.

Mart. Konch, Kab. III. 101. t. 970. f.

I. IV. 5. Murex Hippo-  
castanum.

I. IV. 5. Das Pimpel-  
chen.

Linn. S. N. Sp. 545.

Belg. Pimpeltje.

Testa ovata striata, quadri-  
fariam spinosa, columella um-  
bilicata.

Die eysförmige gestreifte Schas-  
le ist mit vier Reihen Stas-  
cheln umgeben, und an der  
Spindel genabelt.

List. Hist. Conch. l. 4. f. 13. f. 15.

Rumph. amb. t. 24. f. 4.

Gualt. Test. t. 31. f. F.

Seb. Thes. III. t. 49. f. 80 — 82.

Knor. Vergn. III. 7. t. 3. f.

—— — V. 4. t. 2. f.

Mart. Konch, Kab. II. t. 40. f. 398.

I. IV. 6. Murex rugo-  
sus.

I. IV. 6. Die runzel-  
lichte Knotenschnecke.

Testa



**Testa ovata**, longitudinaliter rugosa, striis, carinisque nodosis transuersis, rostro umbilicato breui. Die eysförmige, der Länge nach runzelichte Schale ist in die Quere gestreift, und knotig gefieleet, mit einem genabelten kurzen Rüssel.

*Mart. Konch. Kab. IV. 124. t. 1155. 1156. f.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

**Testa ovata.** Anfractus quinque connati, longitudinaliter rugosi, transuersim striati, & carinati, carinis angulatis. Apertura ovalis columella umbilicata. Rostrum breue, effusum. Die Schale ist eysförmig. Die fünf Gewinde sind zusammengewachsen, nach der Länge gerunzelt, in die Quere gestreift, mit eckigen Risen. Die Mündung eysförmig. Die Spindel genabelt. Der Rüssel kurz und ausgeschlitten.

I. IV. 7. *Murex fen-  
ticosus.*

*Linn. S. N. Sp. 546.*

I. IV. 7. Die Distel-  
schnecke.

*Belg.* Distel - Hoorntje. *Angl.* Small prickly Whelk. *Petr.*

**Testa subturrita**, longitudinaliter costato muricata, transuersim cancellata, ore striato. Die einigermaßen gethürmte Schale ist der Länge nach stachelicht geribbt, in die Quere gegittert, an der Mündung gestreift.

*Bonap. Recr. cl. 3. f. 35.*

*Rumph. amb. t. 29. f. N.*

*Petr.*





*Petiv. amb. t. 9. f. 17.*

*Gualt. Test. t. 51. f. 7.*

*Argenr. Conch. Pl. 9. f. 0.*

*Seb. Thes. III. t. 49. f. 45 — 47.*

*Knor. Vergn. IV. 23. t. 4. 5. f.*

I. IV. 8. Murex Melongena. I. IV. 8. Das Bettzeug.

*Linn. S. N. Sp. 547.*

*Belg. Gedoorende Schildpadstaert. Rumph. Angl. The blue & white Murex. Hill. Gall. le Lard. Dav.*

Testa pyriformi, spira Die birnformige Schale hat  
subspinosa prominente, aper- einen hervorstechenden einiger-  
tura laeui, maßen dornigen Schnitzel,  
und eine glatte Mündung.

\* ventre transuersum spinoso.

α der Leib der Quere nach mit  
Stacheln besetzt.

*Bonan. Rect. cl. 3. f. 186. 295.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 13. f. 24.*

*Rumph amb. t. 24. f. 2.*

*Petiv. Gaz. t. 21. f. 9.*

*Gualt. Test. t. 26. f. F.*

*Argenr. Conch. Pl. 15. f. H.*



*Seb. Thes. III. t. 72. f. 1 — 9.*

*Hill. Hist. of. Anim. Pl. 8.*

*Regenf. Samml. I. 5. t. 49. f.*

*Knor. Vergn. I. 17. t. 5. f.*

*Mart. Konch. Kab. II. 39. t. 391 — 893. f.*

— — — — — 40. t. 394. f.

♂ ventre sine spinis.

♂ der Leib ohne Stacheln.

*Rumph. amb. t. 24. f. 3.*

*Petiv. amb. t. 21. f. 8.*

*Knor. Vergn. II. 10. t. 1. f.*

*Mart. Konch. Kab. II. 39. t. 393. f. 40. t. 395-397f.*

I. IV. 9. *Murex rapi-*  
*formis.*

I. IV. 9. Die dicke  
Rübe.

*Belg. Geknobbelde Knoll. Gall. Gros - Radix.*

*Testa* pyriformi , spinis  
fornicatis obtusis , anfractibus  
carinatis , rostro breui , in-  
curuo , umbilicato.

Die birnförmige Schale ist  
mit hohlen stumpfen Stacheln  
besetzt, mit keilsförmig erha-  
benen Gewinden, und einem  
kurzen krummen genabelten  
Rüssel.

*Testa* pyriformis , ponderosa. An-  
fractus sex , transversim striati , ca-  
rinati , varina spinis ; fornicatis ob-

Die Schale ist birnförmig, und  
schwer. Die sechs Gewinde sind  
gestreift, und keilsförmig, am Niele  
tusis



rufis coronata. Sutura canaliculata. Spira pyramidata. Labrum intus transversim striatum. Columella umbilicata; umbilicus latus, profundus, lamellosus, incurvatus in rotum brevis inflexum.

mit hohlen stumpfen Stacheln gekrönt; Die Nuth rinnenartig ausgehöhlet; Der Schnirkel pyramidenförmig; Die Schalenleiste notwendig in die Quere gestreitet. Die Spindel genabelt; der breite, tiefe, und blätterichte Nabel ist in einen kurzen krummen Rüssel gebogen.

\* subspinosa albida.

„ weiß, mit unvollkommenen Stacheln.

*Knor. Vergn. V. 21. t. 2. f.*

*Mart. Konch. Kab. III. 68. t. 750. f.*

β foliaceo spinosa, fusca.

β braun, mit Blättern und Stacheln besetzt.

*Mart. Konch. Kab. III. 68. t. 754. 755. f.*

I. IV. 10. Murex laceus.

I. IV. 10. Der ausgeschnittene Morgenstern.

Testa ovata, oblonga, striata; anfractibus carinatis, spinosis; labro antice soluto; columella perforata.

Die eiförmige länglichte gestreifte Schale hat keilsförmige stachelichte Gewinde, eine vorne ausgeschnittene Schalenleiste, mit einer durchbohrten Spindel.

*List. Hist. Conch. I. 4. f. 15. f. 11.*

*Klein. Meth. Ostr. t. 3. f. 56 — 58.*



*Seb. Thes. III. t. 60. f. 30 — 32.*

*Mart. Konch. Kab. III. 100. t. 95 I. f.*

Testa ovata, utrinque attenuata.  
Anfractus quinque, transuersim ca-  
rinati; carina spinis obtusis muri-  
cata. Ventris cingula spinosa b n.  
Apertura ouato oblonga. Labium  
antice sinu a columella solutum.  
Columella umbilicata. Color ex  
pallido roseus,

Die eysförmige Schale ist beider-  
seits zugespitzt. Die fünf Gewinde  
sind in die Quere gestreift, und  
keilförmig, an dem Riele mit stum-  
pfen Stacheln besetzt. Um den Leib  
sind zweien flachlichte Bänder. Die  
Mündung ist länglicht eysförmig.  
Die Schalenleiste vorne durch einen  
Auschnitt von der Spindel ge-  
trennet. Die Farbe ist blaß ro-  
senroth.

I. V. Rostro recto elongato.

I. V. Mit einem geraden ver-  
längerten Rüssel.

I. V. I. Murex baby-  
lonius.

I. V. I. Der Babels-  
thurm.

*Linn. S. N. Sp. 549.*

*Belg. Babilonfc Tooren. Rumph. The Babel Shell. Pet. Gall. La  
Tour de Babel. Dav.*

Testa turrita, cingulis acu-  
tis maculatis, labro fisso, ro-  
stro elongato recto.

Die gethürmte Schale ist  
mit scharfen gefleckten Gürteln  
umgeben, an der Schalenleiste  
gespalten, mit einem verlän-  
gerten geraden Rüssel.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 14. f. II.*

*Rumph. amb. t. 29. f. L.*

*Gualt. Test. t. 52. f. N N,*



*Argenv. Conch. Pl. 12. f. M.*

*Seb. Thes. III. t. 79. f.*

*Hill. Hist. of. Anim. Pl. 7.*

*Regenf. Samml. I. 1. t. 9. f.*

*Knor. Vergn. IV. 13. t. 2. f.*

—— *Del. nat. I. t. B. IV. f. 6.*

*Mart. Konch. Kab. IV. 143. t. 1331. 1332. f.*

I. V. 2. *Murex javanus.* I. V. 2. Die javanische  
Spindel.

*Linn. S. N. Sp. 550.*

*Testa turrita, transuersim* Die gethürmte in die Quer  
*striata, asfractibus carinato* re gestreifte Schale hat viel  
*tuberculatis, labro antice so-* förmige knottige Gewinde, und  
*luto.* eine vorne getrennte Spindel-  
leſze.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 79.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 12. f. 9.*

*Seb. Thes. III. t. 62. f. 42.*

*Knor. Vergn. VI. 27. t. 3. f.*

*Mart. Konch. Kab. IV. 143. t. 1334. 1335. f.*

I. V. 3. *Murex Colus.* I. V. 3. Die franzöſi-  
sche Spindel.





Linn. S. N. Sp. 551.

Belg. Tabaks - Pip. Rumph. Angl. Spindle - Shell. Pet. Gall. Le Fufcau.

Testa turrita, transuersim Die gehürnte in die Que-  
striata, carinato nodosa, labro re gestreifte Schale hat knottig-  
crenulato, rostro recto elon- ge Kiele, eine gekerbte Spina-  
ga.o. dellefze, und einen geraden ver-  
längerten Rüssel.

Bonan. Recr. cl. 3. f. 360.

List. Hist. Conch. l. 4. f. 14. f. 11.

Rumph. amb. t. 29. f. F.

Petiv. amb. t. 6. f. 5.

Gualt. Test. t. 52. f. L.

Argenv. Conch. Pl. 9. f. B.

Klein. Meth. Ostr. t. 4. f. 78.

Seb. Thes. III. t. 79. 4. 5.

Regenf. Samml. I. t. 12. f. 6.

Knor. Vergn. III. 5. t. 1. f. 14. t. 1. f.

Mart. Konch. Kab. IV. 144. t. 1339 — 1341. f.

— — — — 145. t. 1343 — 1344. f.

Müll. Linn. Naturf. IV. 1. B. 17. t. 3. f.

Da Cost. Elem. Pl. 4. f. 4.

I. V. 4. Murex Mo-

I. V. 4. Der handirte  
Möhr.

Linn.



*Linn. S. N. Sp. 552.*

Testa ventricosa nigra, fascia transuersa alba, spirae le hat ein weißes Querband, anfractibus nodosis, columella und knottige Schneckelgewinde mit einer runzelichten Spindel.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 357.*

*Adans. Seneg. Pl. 2. f. 31.*

*Seb. Tbes. III. t. 80. f. plurimae.*

*Regenf. Samml. I. II. t. 61. f.*

*Knor. Vergn. I. 20. t. 1. f.*

—— ——— II. 6. t. 2. f.

—— *Del. nat. I. t. B. V. f. 4.*

*Mart. Konch. Kab. IV. 139. t. 1300. f.*

I. V. 5. *Murex Cochlidium.*

I. V. 5. Die indische Spindel.

*Linn. S. N. Sp. 553.*

*Belg. Indian. Gall. L'Indien.*

Testa ventricosa, transuersim sulcata, anfractibus spinis coronatis, rostro elongato recto. Die bäuchige Schale ist der Quere nach gefurchet, an den Gewinden mit Stacheln gekrönt, mit einem verlängerten geraden Rüssel.



*List. Hist. Conch. l. 4. f. 14. f. 2.*

*Argenv. Conch. Pl. o. f. A.*

*Seb. Tbes. III. t. 57. f. 27. 28.*

*Knor. Vergn. VI. 15. t. 4. f.; 26. t. 2. f.*

*Mart. Konch. Konch IV. 143. t. 1333. f.*

I. V. 6. *Murex Spirillus.*

I. V. 6. Die langschne-  
belige Rube.

*Linn. S. N. Sp. 554.*

*Belg. Langgestaarte gladde Knoll. Gall. Mafsië lifse.*

*Testa ventricosa, spira acuminata, anfractibus acute marginatis, columellae labio expanso.*

Die bäuchige Schale hat einen zugespizten Schnirkel, scharfrandige Gewinde mit einer ausgebreiteten Schalenleſze.

*Knor. Vergn. VI. 24. t. 3. f.*

*Mart. Konch. Kab. III. 115. t. 1069. f.*

I. V. 7. *Murex canaliculatus.*

I. V. 7. Die gezackte  
Spindel.

*Linn. S. N. Sp. 555.*

*Belg. Razp. Gall. Navet a longue queue.*

*Testa*



Testa ventricosa, spirae an-  
fractibus canaliculo dincti-  
tis.

Die Gewinde der bäuchigen  
Schale sind mit einer Rinne  
von einander abgesondert.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 13. f. 2.*

*Valent. Abh. II. t. 92. f.*

*Gualt. Test. t. 47. f. A.*

*Seb. Thes. III. t. 68. f. 22.*

*Knor. Delic. nat. I. t. B. VI. f. 4.*

*Mart. Konch. Kab. III. 67. t. 742. 743. f.*

I. V. 8. Murex per-  
versus.

I. V. 8. Die linksge-  
wundene Feige.

*Linn. S. N. Sp. 557.*

*Angl. The pointed Murex. Hill. Gall. Buccin unique. Argenv.*

Testa ventricosa, anfracti-  
bus sinistrorsis, spinoso coro-  
natis, rostro elongato recto.

Die bäuchige Schale hat  
linksgewundene mit Stacheln  
gekrönte Windungen, und einen  
geraden verlängerten Rüssel.

*Gualt. Test. t. 30. f. B.*

*Argenv. Conch. Pl. 15. f. F.*

*Hill. Hist. of. Anim. Pl. 8.*

*Mus. Caes. Vindobon.*



I. V. 9. Murex pugilinus.

I. V. 9. Das unächte Fleischhorn.

Testa ventricosa, anfractibus canaliculatis, acute coronatis, rostro recto, extus transuersim sulcato.

Die bäuchige Schale hat rinnenartig ausgefehlte, und spizig gekrönte Windungen, mit einem geraden auswändig in die Quere gefurchten Rüssel.

List. Hist. Conch. l. 4. f. 13. f. infra 6.

Gualt. Test. t. 47. f. B.

Knor. Vergn. I. 30. t. I. f.

Mart. Konch. Kab. IV. 152. t. 1323. 1324. f.

Testa ventricosa, crassa. Anfractus septem, infra tuturam canaliculati, in medio carinati; carina spini acuti breuibus coronata. Venter laevis, spira, & rostrum rectum, transuersim undulato striata. Columella subumbilicata. Color fuluus, aut pallide luteus.

Die Schale ist bäuchich, und dick. Die sieben Gewinde sind unter der Naht rinnenartig ausgefehlte, in der Mitte kiel förmig erhaben, und allda mit kurzen spizigen Stacheln gekrönt. Der Leib ist glatt, der Schnirkel, und der gerade Rüssel in die Quere wellenförmig gestreift. Die Spindel einigermassen genabelt. Von gelbrother, oder blaßgelber Farbe.

I. V. 10. Murex aruanus.

I. V. 10. Die zweyfelige Spindel.

Linn. S. N. Sp. 556.

Testa





Testa oblonga ventricosa, Die längliche bäuchige Scha-  
 anfractibus bicarinatis, rostro le hat zwey erhabene tielförmige  
 elongato, Gürteln, und einen verlängerten Rüssel.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 101.*

*Rumph. amb. t. 28. f. A.*

*Mart. Konch. Kab. IV. 138. t. 1295. 1296. f.*

I. V. II. Murex despectus.

I. V. II. Die nordische Spindel.

*Linn. S. N. Sp. 559.*

*Belg. Noordsche Wulk. Angl. The common english Whelk. Da Cost.*

Testa oblonga ventricosa, Die längliche bäuchige Scha-  
 anfractibus teretibus, rostro le hat runde Gewinde, und einen  
 recto. geraden Rüssel.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 190.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 14. f. 4; f. 15. f. 15.*

*Linn. It. westg. t. 5. f. 8.*

*Seb. Thes. III. t. 83. f. 3 — 6.*

*Da Cost. Elem. Pl. 1. f. 3 — 5.*

*Mart. Konch. Kab. IV. 136. t. 1292. 1294. f.*

I. V. 12.



I. V. 12. Murex Tritonis.

I. V. 12. Die Tritons-  
schnecke.

*Linn. S. N. Sp. 560.*

*Belg. Kink-Hoorn, Rumph. Angl. Tritons - trumpet. Pet. Gall. Trompe marine Dav.*

Testa oblonga, anfractibus teretibus, prope futuram cre- Die längliche Schale hat  
nulat, varicibus longitudi- runde an der Naht gekerbte  
nalibus, apertura denticulata. Bindungen, mit nach der  
Länge laufenden Näthen, und  
einer gezähnelten Mündung.

Sulci transversi, striati. Apex roseus.

Nach der Quere laufen gestreifte Furchen. Die Spitze ist rosenroth.

$\alpha$  attenuata rosea, & lutescens  
immaculata.

$\alpha$  schmal, von rosenrother, oder gelblicher Farbe ohne Flecken.

*Mart. Conch. Kab. IV. 134. t. 1278. 1279.f.*

$\beta$  ventricosa, albo fuscoque variegata.  $\beta$  bäuchig, weiß und braun gefleckt.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 188.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 15. f. 12. 13.*

*Rumph. amb. t. 28. f. B.*

*Petiv. Gaz. t. 12. f. 15.*

*Gualt. Test. t. 48. f. A.*

*Seb.*



*Seb. Tbes. III. t. 81. f. omnes.*

*Knor. Vergn. II. 16. t. 2. 3. f.*

— — — *V. 5. t. 1. f.*

— — — *Del. nat. I. t. B. VI. f. I.*

*Mart. Konch. Kab. IV. 134. t. 1277. f.*

— — — *136. 1282. 1283. f.*

I. V. 13. *Murex Pufio.*

I. V. 13. Die gefleckte  
Spindel.

*Linn. S. N. Sp. 561.*

*Belg. Gnemoe - Hoorn,*

*Testa oblonga, ventricosa, Die längliche bäuchige glatte*  
*laeui, anfractibus rotundatis, te Schale, hat runde Gewin-*  
*apertura laeui, rostro breui. de, eine glatte Mündung, samt*  
*einem kurzen Rüssel.*

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 40.?*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 14. f. 7.*

*Gualt. Test. t. 52. f. 3.*

*Knor. Vergn. IV. 21. t. 7. f.*

*Mart. Konch. Kab. IV. 97. t. 1357. f.*

I. V. 14. *Murex accinctus.*

I. V. 14. Die Gürtel-  
spindel.

*Testa*



Testa fusiformi, laeui, fusca, anfractibus conuexis, fascia articulata alba, rostro recto breui.

Die spindelförmige glatte Schale hat an den bäuchigen Gewinden einen gegliederten weißen Gürtel, mit einem kurzen geraden Rüssel.

*Mart. Konch. Kab. IV. 127. t. 1281. 1219. f.*

Testa fusiformis, laevis. Anfractus octo conuexi, attenuati, conuati. Apertura ouato oblonga. Labrum intus striatum. Columella laevis, supra plica una transuersa. Basis extus transuersim striata, constituens rostrum abbreviatum, rectum. Color atro fuscus, cingulo angusto anfractuum albo, lineis angulatis rufis articulato.

Die Schale ist spindelförmig und glatt. Die acht bäuchigen zusammen gewachsenen Gewinde verbinden sich. Die Schalenlefze ist innwendig gestreift. Die Spindel glatt, und oben mit einer Querspalte versehen. Der Grund ist von außen in die Quere gestreift, und bildet einen geraden verkürzten Rüssel. Von schwarzbrauner Farbe mit einer weißen schmalen Quersbinde, die durch rothbraune Winkelsüge unterbrochen wird.

I. V. 15. Murex vulpinus.

I. V. 15. Die rothbraune Spindel.

Testa oblonga, ventricosa, glabra, basi, anfractuumque marginibus striatis, rostro breui, torto.

Die längliche bäuchige glatte Spindel ist an dem Rande der Windungen gestreift, und mit einem kurzen gedrehten Rüssel versehen.

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa



Testa oblonga. Anfractus octo laeues, teretiusculi, prope futuram transuersim striati. Venter conuexus subtus transuersim striatus, definens in rostrum breue extus intortum. Apertura laeuis. Color ex fusco ruber.

Die Schale ist länalich. Die acht Gewinde glatt, rund, an der Nath in die Quere gestreift. Der erhabene Leib ist unten der Quere nach gestreift, und endiget sich in einen kurzen, auswändig gedrehten Rüssel. Die Mündung ist glatt. Von braunrother Farbe.

I. V. 16. Murex Tulipa.  
pa.

I. V. 16. Die Achatz-  
birne.

Linn. S. N. Sp. 562.

Belg. Agaate - Peer, Rumph. Gall. L'Agathine. Dav.

Testa oblonga ventricosa, laeui, anfractibus rotundatis, futura geminata, columella uniplicata, rostro patulo striato.

Die längliche bäuchige glatte Schale hat runde mit einer zweyfachen Nath versehene Gewinde, mit einer Falte an der Spindel, samt einem erweiterten gestreiften Rüssel.

Bonan. Reer. cl. 3. f. 187.

List. Hist. Conch. l. 4. f. 14. f. I. 2.

Rumph. amb. t. 49. f. H.

Gualt. Test. t. 46. f. A.

Argenv. Conch. Pl. 13. f. K.

Seb. Thes. III. t. 71. f. 23 — 31.

Regenf. Samml. I. 9. t. 35. f.





*Knor. Vergn. V. 18. t. 5. f.*

— — — *VI. 29. t. 1. f.*

*Mart. Konch. Kab. IV. 136. t. 1286. f.*

— — — *137. t. 1288. 1289. f.*

I. V. 17. *Murex Dolarium.*

I. V. 17. Die Vortreppe.

*Linn. S. N. Sp. 564.*

*Belg. Bestrappen.*

Testa ventricosa, costis obtusis angulatis, labro plicato, columella umbilicata.

Die bänchige Schale hat stumpfe, eckige Ribben, eine gefaltene Spindellette, samt einer genabelten Spindel.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 347.*

*Seb. Thes. III. t. 52. f. II.*

*Knor. Vergn. V. 3. t. 5. f.*

I. V. 18. *Murex lignarius.*

I. V. 18. Die Holzspindel.

*Linn. S. N. Sp. 566.*

Testa



Testa oblonga , anfractibus Die längliche Schale hat  
longitudinaliter plicatis , ob- stumpfsinnige nach der Länge  
tuse nodosis , rostro abbrevia- gefaltene Windungen mit einem  
to. verkürzten Schnabel.

Fulva , fascia ventris niuea.

Rothgelb, mit einer weißen Quer-  
binde um den Leib.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 32.*

*Seb. Thes. III. t. 52. f. 4.*

*Knor. Vergn. VI. 20. t. 7. f.*

I. V. 19. Murex Tra-  
pezium.

I. V. 19. Die Bände-  
spindel.

*Linn. S. N. Sp. 567.*

*Belg. Gebaande Knobbel - Hoorn. Rumph. Gall. Le Tapis. Dav.*

Testa oblonga , anfractibus Die längliche Schale hat  
carinato angulatis , apertura felförmige eckige Windungen,  
dentata , rostro recto. eine gezähnte Mündung, mit  
einem geraden Schnabel.

Lineis transuerfis , geminaatis fus- Mit gepaarten braunen Quere-  
cis. streifen.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 287.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 14. f. 26.*

*Rumph. amb. t. 49. f. K.*



*Gualt. Test. t. 46. f. B.*

*Argenv. Conch. Pl. 10. f. H.*

*Seb. Thes. III. t. 79. f. 1.*

*Knor. Verg. IV. 20. t. 1. f.*

—— ——— *V. 10. t. 4. f.*

*Mart. Konch. Kab. IV. 139. t. 1298. 1299. f.*

I. V. 20. *Murex craticulatus.*

I. V. 20. Die Wellenspindel.

*Linn. Sp. N. Sp. 569.*

*Testa fusiformi longitudinaliter rugosa, cingulis elevatis acutis, labro dentato, rostro recto.*

Die spindelförmige Schale ist der Länge nach gerunzelt, und in die Quere mit erhabenen scharfen Ringen umgürtet, an der Schalenleiste gezähnt, mit einem geraden Rüssel.

*Niuea, maculis longitudinalibus croceis.*

Schneeweiß, mit nach der Länge laufenden safranrothen Flecken.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 15. f. 22.*

*Knor. Vergn. II. 3. t. 6. f.*

*Mart. Konch. Kab. IV. 149. t. 1382. 1383. f.*

I. VI.



I. VI. Turrili, rostro breui.

I. VI. Gethürmte, mit kurzem  
Rüssel.I. VI. I. Murex Verta-  
gus.I. VI. I. Die Schnau-  
zennadel.*Linn. S. N. Sp. 571.**Belg. Witte Tuitje. Rumph. Angl. White Inouted Peg. Petiv. Gall.  
Chenille blanche. Dav.*

Testa turrita, anfractibus su- Die gethürmte Schale hat  
perne plicatis, rostro ascen- oben gefaltene Windungen, ei-  
dente, columella biplicata. nen aufgerichteten Rüssel, und  
zwo Falten an der Spindel.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 84.**List. Hist. Conch. l. 4. f. 15. f. 83.**Petiv. Gaz. t. 56. f. 4.**— amb. 1. 13. f. 14.**Rumph. amb. t. 30. f. K.**Gualt. Test. t. 57. f. D.**Argenv. Conch. Pl. II. f. P.**Adans. Seneg. Pl. 10. f. 2.**Knor. Vergn. III. 20. t. 3. f.**— — V. 15. t. 6. f.**— — VI. 40. t. 4. 5. f.**Murr. Fund. Test. t. 1. f. 28.**Müll. Linn. Naturfyst. VI. B. 17 t. 4 f.*



*Mart. Konch. Kab. IV. 156. t. 1479. f.*

————— 157. t. 1480. 2488. f.

I. VI. 2. *Murex fulcatus.* I. VI. 2. Die Mangos-  
nadel.

*Belg. Mauger - Naalde. Rumph. Angl. Mango's Peg. Pet.*

*Testa turrata, longitudinaliter rugosa, transversim sulcata, labro ampliato, rostro breuissimo recto.* Die gethürmte Schale ist in die Länge gerunzelt, der Quere nach gesurhet, an der Schalenlesze ausgebreitet, mit einem sehr kurzen geraden Rüssel.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 68.*

*Rumph. amb. t. 30. f. T.*

*Petiv. amb. t. 13. f. 22.*

*Mart. Konch. Kab. IV. 157. t. 1484-1485. f.*

*Testa turrata. Anfractus undeni, declives, plani, longitudinaliter rugosi, transversim sulcati. Labrum ampliatum, acute marginatum, antice solutum. Columella vix labiata. Angulo labro opposito. Rostrium breuissimum, rectum. Color fuscus.*

Die Schale ist gethürmet. Die eilf Gewinde sind abhängig flach, nach der Länge mit Runzeln, in die breite mit Furchen besetzt. Die Schalenlesze ist ausgebreitet, scharf-randig und vorne abgesondert. An der Spindel ist kaum eine Lesze. Der Schalenlesze gegen über steht eine hervorragende Ecke. Der Rüssel ist sehr kurz und gerad. Die Farbe braun.



I. VI. 3. Murex gibbo-  
sus.

I. VI. 3. Die höckerige  
Stachelnadel.

Testa turrita anfracti-  
bus marginatis, ventre gibbo;  
labro fillo, denticulato, ro-  
stro breui.

Die gethürmte Schale ist an  
den Windungen eingesäumet,  
auf dem Rücken höckerig, an  
der gespaltenen Schalenleiste ge-  
zähnel, und mit einem kurzen  
Rüssel versehen.

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa turrita. Anfractus circiter  
nouem transuersim striati, plicis  
longitudinalibus decussati, supra  
prope futuram compresso marginati.  
Venter tubere dorsali gibbus.  
Apertura oblonga. Labrum supra  
sinu transuerso lato fissum, mar-  
gine denticulatum. Columella re-  
plicata, laevis. Rostrum rectum,  
breue. Color albus, maculis pal-  
lide rubris.

Die Schale ist gethürmet. Die  
Gewinde, deren beiläufig neun sind,  
gestreift, mit nach der Länge  
laufenden Falten durchkreuzet, und  
oben an der Naht mit einem ein-  
gedrückten Rande versehen. Der  
Leib hat auf den Rücken einen Hö-  
cker. Die Mündung ist länglich.  
Die Schalenleiste durch einen brei-  
ten Querausschnitt gespalten, am Ran-  
de gezähnel. Die Spindel ist über-  
geschlagen, und glatt. Der Rüssel  
gerad, und kurz. Von weißer Far-  
be mit blaßrothen Flecken.

I. VI. 4. Murex Aluco.

I. VI. 4. Die gefurchte  
Dornspindel.

*Linn. S. N. Sp. 572.*

*Belg. West Indische Pause - Kroon. Rumph. Angl. Knopped Popes  
Crown. Petiv.*



Testa turrita, anfractibus transuersim fulcatis in medio tuberculatis, columella uniplicata, rostro ascendente.

Die gehürnte Schale hat nach der Quere gefurchte, in der Mitte mit Knoten besetzte Gewinde, zwei Falten an der Spindel, und einen aufgerichteten Rüssel.

$\alpha$  albid.

$\alpha$  weißlich.

$\beta$  alba, maculis lineisque fuscis.

$\beta$  weiß, mit braunen Flecken und Strichen.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 67.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 15. f. 87.*

*Rumph. amb. t. 30. f. O.*

*Petiv amb. t. 7. f. 12.*

*Gualt. Test. t. 57. f. G.*

*Argenv. Conch. Pl. II. f. H.*

*Seb. Thes. III. t. 51. f. 25. t. 50. f. 15. 16.*

*Knor. Vergn. I. 16. t. 4. f.*

*Mart. Konch. Kab. IV. 156. t. 1473. 1474. f.*

I. VI. 5. *Murex coronatus.*

I. VI. 5. Die gedornete Schnepfennadel.

*Belg. Gedoornde Snuite Pen, Rumph. Angl. The rougheren Shell. Hill.*

Testa



Testa turrita, substriata, an- Die gethürmte Schale ist  
fractibus coronatis, columella einigermassen gestreift, an den  
uniplicata, rostro ascendente. Gewinden gekrönet, mit einer  
Falte an der Spindel, und ei-  
nen aufgerichteten Rüssel.

Bonan. Recr. cl. 3. f. 69.

List. Hist. Conch. l. 4. f. 15. f. 79.

Rumph. amb. t. 30. f. N.

Petiv. amb. t. 13. f. 23.

Gualt. Test. t. 57. f. A.

Hill. Hist. of. Anim. Pl. 7.

Knor. Vergn. III. 16. t. 5. f.

Mart. Konch. Kab. IV. 156. t. 1478. f.

Testa turrita substriata. Anfrac-  
tus undeni, subtus laeues, in me-  
dio spinis procumbentibus corona-  
ti, prope futuram attenuati. Aper-  
tura, & rostrum praecedentis. Color  
albidus, maculis latis, fuscis,

Die Schale ist gethürmet, und  
einigermassen gestreift. Die eilf  
Gewinde sind unten glatt, in der  
Mitte mit darniederliegenden Dör-  
nern gekrönet, nächst der Muth  
verengert. Die Mündung und der  
Rüssel ist wie bei der vorhergehenden  
Art. Weißlich mit braunen Fle-  
cken.

I. VI. 6. Murex littera-  
tus.

I. VI. 6. Die Buchsta-  
bennadel.

Testa ventricosa turrita, ni-  
gro maculata, columella uni-  
plicata, rostro breui.

Die bäuchig gethürmte  
schwarzgeflechte Schale hat an  
der Spindel eine Falte, und  
einen kurzen Rüssel.



*List. Hist. Conch. l. 4. f. 15 f. 89.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa ventricosa, turrita. Anfractus circiter octo coaliti, supra prope futuram spinis erectis brevibus muricati. Apertura ampliata. Columella uniplicata, Rostrum breve, rectum. Color niueus, maculis punctatis, characteres nonnquam aemulantibus, nigris.

Die Schale ist bäuchig und gekürrnet. Die acht Gewinde sind zusammenaewachsen, und oben mit kurzen aufgerichteten Dornern besetzt. Die Mündung ist erweitert. Die Spindel hat eine Quersalte. Der Rüssel ist kurz, und gerad. Die Farbe schneeweiß, mit schwarzen punktirten Flecken, die bisweilen buchstabenähnliche Zeichnungen bilden.

I. VI. 7. *Murex fusca-*  
*rus.*

*Linn. S. N. Sp. 573.*

I. VI. 7. Die gezackte  
Besansspindel.

*Belg. Getaakte Bezaanknop. Gall. Obelisce chinois. Dav.*

Testa turrita, anfractibus spinosis, prope futuram crenulatis, basi planiuscula.

Die gekürrnete Schale hat stachelichte, an der Muth gekerbte Windungen, und einen etwas flachen Boden.

α alba.

α weiß.

β ex fusco luteo.

β braungelb.

γ atro fusca.

γ schwarzbraun.

*Gualt. Test. t. 56. f. E. H.*

*Argenv. Conch. Pl. II. f. L.*

*Knor.*



*Knor. Vergn. III. 26. t. 4. 5. f.*

I. VI. 8. *Murex Radula.*

I. VI. 8. Die Nadel-  
feile.

*Linn. S. N. Sp. 575.*

Testa turrita, anfractibus  
serie triplici punctatis, basi  
planiuscula sulcata.

Die gethürmte Schale hat  
auf den Gewinden eine drey-  
fache Reihe hervorstehender  
Punkte, mit einem etwas fla-  
chen gefurchten Boden.

$\alpha$  alba.

$\alpha$  weiß.

*Knor. Vergn. III. 15. t. 3. f.*

$\beta$  cingulis albis, rufis, fuscisque.

$\beta$  mit weißen, rothbraunen und  
dunkelbraunen Gürteln bemalet.

*Bonon. Recr. cl. 3. f. 327.*

*Gualt. Test. t. 58. f. F.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

I. VI. 9. *Murex atratus.*

I. VI. 9. Die schwarze  
Stachelnadel.

Testa turrita, atra, anfracti-  
bus transuersim striatis, tuber-  
culatis, columella uniplicata,  
rostro recto.

Die gethürmte schwarze  
Schale hat knottige, in die  
Quere gestreifte Windungen,  
eine Falte an der Spindel, mit  
einen geraden Rüssel.





*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa turrita. Anfractus decem, coaliti, transuersim striati, duplici tuberculorum acutorum, & breuium serie cincti. Apertura oblonga. Labrum dilatatum, crenulatum. Columella uniplicata. Angulus labri margini oppositus. Rostrum rectum, breue. Color, ater, nitens.

Die Schale ist gethürmet. Die zehn Gewinde sind zusammenge- wachsen, und mit einer doppelten Reihe kurzer spiziger Hörnchen um- geben. Die Mündung ist länglich. Die Schalenlefze erweitert, und fein gekerbet. Die Spindel hat eine Querfalte. Der Spindellefze gegenüber steht eine hervorragende Ende. Der Rüssel ist gerad und kurz. Die Farbe ist glänzend schwarz.

**K. Trochus.**

**K. Die Kräufelschnecke.**

Testa spiralis. Apertura angulata, coarctata. Co- lumella obliquata.

Die Schale ist schnir- felförmig gewunden. Die Mündung eckig, und ein- gefast. Die Spindel ste- het etwas schief.

K. I. Columella perforata.

K. I. Mit durchbohrter Spin- del.

K. I. I. Trochus nilo- ticus.

K. I. I. Die glatte Py- ramide.

*Linn. S. N. Sp. 579.*

*Belg.*



Belg. Gevjakre Tol. Rumph. Angl. The great waved Top. Pet.  
Gall. Le Sabot marbré. Argenv.

Testa conica, anfractibus conuexiusculis laevis, columella perforata. Die kegelförmige Schale hat einigermaßen erhabene glatte Gewinde, und einen durchbohrten Spindel.

Bonan. Recr. cl. 3. t. 102.

List. Hist. Conch. l. 4. f. 8. f. 3.

Rumph. amb. t. 21. f. A.

Gualt. Test. t. 59. f. B. C.

Argenv. Conch. Pl. 8. f. C.

Gev. Belust. 5. t. 33 — 35.

Regenf. Samml. I. 4. t. 42. f.

Knor. Vergn. I. 12. t. 1. f.

—— — II. 5. t. 1. f. ; 6. t. 1. f.

K. I. 2. Trochus maculatus.

Linn. S. N. Sp. 580.

K. I. 2. Die knottige Pyramide.

Belg. Bagyne - Drolle. Rumph.

Testa conica, tuberculata, umbilico obliquo, labio bilobo. Die kegelförmige fleinknotige Schale hat einen schiefen Nabel, und einen zweyfachen Lappen an der Schalenlippe.



$\alpha$  conica, anfractibus transuersim  
itriatis; albida, rubro maculata.

$\alpha$  kegelförmig, mit in die Que-  
re gestreiften Windungen; weiß,  
mit rothen Flecken.

*Gualt. Test. t. 61. f. E.*

*Knor. Vergn. II. 2. t. 4. 5. f.*

*Müll. Linn. Nat. Syst. VI. 1. B. 18. t. 1. f.*

*Murr. Fund. Test. t. 1. f. 20.*

*Da Cost. Elem. Pl. 3. f. 13.*

$\beta$  conica, anfractibus oblique ru-  
gosis, prope futuram compres-  
sis; a ba, viridisque, rubro  
maculata.

$\beta$  kegelförmig, mit schiefe unze-  
lichten, an der Naeh zusam-  
mengeschrückten Windungen;  
weiß, und grün, mit rothen  
Flecken.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 8. f. 5.*

*Rumph. amb. t. 21. f. 3.*

*Gev. Belust. 7. t. 52 f.*

$\gamma$  conica attenuata, anfractibus  
transuersim itriatis, prope fu-  
turam compressis; viridis fu-  
sco maculata.

$\gamma$  spitzkegelförmig, mit in die  
Quere gestreiften, an der Naeh  
zusammengeschrückten Windun-  
gen; grün mit braunen Flecken.

*Gualt. Test. t. 61. f. D. D.*

*Gev. Belust. 7. t. 48. f.*

*Regenf. Samml. I. 2. t. 13. f.*



K. I. 3. Trochus pers-  
pectivus.

K. I. 3. Die Perspektiv-  
schnecke.

*Linn. S. N. Sp. 581.*

*Belg* Perspectiv - Hoorn. *Rumph. Angl.* Spinnet - Shell. *Petiv. Gall.*  
*Le Cadran. Dav.*

Testa convexo conica, an-  
fractibus decussatim striatis,  
umbilico lato crenato.

Die gewölbt kegelförmige  
Schale hat kreuzweise gestreif-  
te Windungen, und einen wei-  
ten gekerbten Nabel.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 27. 28.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 8. f. 24.*

*Rumph. amb. t. 27. f. L.*

*Petiv. amb. t. 2. f. 14.*

*Gualt. Test. t. 65. f. O.*

*Argenv. Conch. Pl. 9. f. M.*

*Gev. Belust. 25 t. 266 — 272 f.*

*Seb. Thes. t. 40. f. 1, 2, 13, 14, 28, 41, 42.*

*Regenf. Samml. I. 6. t. 61. f.*

*Knor. Vergn. I. II. t. 1. 2. f.*

K. I. 4. Trochus pharao-  
nius.

K. I. 4. Die Pharao-  
schnecke.

*Linn. S. N. Sp. 584.*

*Belg.*



Belg. Prins Roberts Knop, Gall. Bouton de Camifole. Dav.

Testo subouata, striata, Die fast eysförmige gestreifte  
punctis concatenatis globosis, Schale ist mit kettenförmig an-  
columella labioque dentato, einanderstehenden runden Kör-  
umbilico crenato. nern umgeben, an der Spin-  
del und Schalenleiste gezähnt,  
am Nabel gekerbet.

Bonan. Recr. al. 3. f. 222.?

List. Hist. Conch. l. 4. f. 8. f. 25.

Petiv. Gaz. t. 14. f. 10.

Gualt. Test. t. 63. f. B.

Argenv. Conch. Pl. II. f. L. Q.

Adans. Seneg. Pl. 12. f. 2.

Gev. Belust. 13. t. 101 — 107. f.

Knor. Vergn. I. 30. t. 6. f.

—— — IV. 26. t. 3. 4. f.

K. I. 5. Trochus Magus. K. I. 5. Der Heren-  
meister.

Linn. S. N. Sp. 585.

Belg. Tovenaar. Gall. Le Sorciere. Dav.

Testa umbilicata striata: Die genabelte und gestreifte  
anfractibus supra plicatis. Schale hat an dem Oberrande  
gefaltene Windungen.

Gualt.





*Gualt. Test. t. 64. f. C.*

*Argenv. Conch. Pl. II. f. S.*

*Gev. Belust. 13. t 127. f.*

*Knor. Vergn. VI. 27. t. 4. f.*

K. I. 6. *Trochus cinerarius.*

K. I. 6. Der schiefstrahlige Kräusel.

*Linn. S. N. Sp. 590.*

Testa umbilicata, conica, anfractibus prope futuram canaliculatis.

Die genabelte kegelförmige Schale ist an der Naht ausgekehlet.

Alba, fasciis oblique fuscis.

Weiß, mit schiefen braunen Querbändern.

*Mus. Caes. Vindobon.*

K. I. 7. *Trochus umbilicatus.*

K. I. 7. Die Wirbelschnecke.

*Linn. S. N. Sp. 592.*

Testa convexa, conica, anfractibus substriatis, umbilico cylindraceo.

Die gewölbte kegelförmige Schale hat gestreifte Gewinde und einen walzenförmig ausgehöhlten Nabel.

*Mus. Caes. Vindobon.*

K. I. 8.



K I. 8. Trochus fascia-  
tus.

K. I. 8. Die gebänderte  
Kräuselschnecke.

Testa conica, laeui, an-  
fractibus rotundatis supra com-  
pressis, umbilico profundo, la-  
bro crenulato.

Die kegelförmige glatte  
Schale hat rundliche oben ein-  
gedrückte Gewinde, einen tie-  
fen Nabel, mit einer gekerb-  
ten Spindelkeule.

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa conica. Anfractus quin-  
que rotundati, supra prope futuram  
complanati. Umbilicus verticalis  
profundus. Labium crenulatum.  
Color albidus, fusco maculatus, fas-  
cia transuersa rosea.

Die Schale ist kegelförmig. Ihre  
fünf rundliche Gewinde sind oben  
an der Naht etwas flach gedrückt.  
Der Nabel ist tief und senkrecht.  
Die Schalenkeule fein gekerbt. Die  
Farbe weiß mit braunen Flecken,  
und einem rosenrothen Querbande,

K. I. 9. Trochus tessu-  
latus.

K. I. 9. Der Würfel-  
kräusel.

Testa conica, anfractibus  
rotundatis transuersim striatis,  
columella obsolete perforata.

Die kegelförmige Schale  
hat rundliche, in die Quere  
gestreifte Windungen, und eine  
durchbohrte Spindel.

*Mus. Caes. Vindobon.*



Testa convexo conica. Anfractus quinque transverſum ſtriati, convexusculi, declives. Columella uniloba, replicata, obtegens foramen obliquum, tenue. Color albidus, luteo maculatus, teſſulis oblongis purpureis ſeriatim digeſtis, infra hunc corticem margaritaceus.

Die Schale iſt gewölbt kegelförmig. Die fünf Gewinde ſind in die Quere geſtreift, etwas bündig, und abhängig. Die Spindel hat eine lappenförmige Ecke, und bedeckt durch ihren Ueberſchlag das ſchiefe dünne Nabelloch. Die Farbe iſt weiß, mit gelben Flecken, und länglichen purpurrothen reiheweife ſtehenden Flecken; unter dieſer Hinde perlenmutterartig.

K. I. 10. Trochus ſolaris.

K. I. 10. Das Sonnenhorn.

Linn. S. N. Sp. 593.

Belg. Zonne - Hoorn.

Testa umbilicata complanato conica, anfractibus spinoso radiatis, apertura ſemicordata.

Die genabelte ſtachelgedrückte kegelförmige Schale hat um die Gewinde ſtachelichte Strahlen, und eine halb herzſörmige Mündung.

Bonan. Recr. cl. 3. f. 356. 367.

Liſt. Hiſt. Conch. l. 4. f. 8. f. 9.

Rumph. amb. t. 20. f. K.

Gualt. Teſt. t. 65. f. N. P.

Argenv. Conch. Pl. 8. f. H.

Gev. Beluſt. 20. t. 192 f.

Knor. Vergn. VI. 26. t. 4. f.



K. II. Imperforati.

K. II. Ohne Nabelloch.

K. II. 1. Trochus Pyramis.

K. II. 1. Die Spitzsäule.

Testa conica acuminata; anfractibus imbricatis, seriatim granulosis; columella contorta imperforata.

Die kegelförmige zugespitzte Schale hat ziegelförmig auf einander liegende, reiheweise mit Körnern besetzte Gewinde, mit einer krummgedrehten und durchbohrten Spindel.

Gev. Belust. 9 t. 68 f.

Knor. Vergn. I. 12. t. 4. f.

Testa conica, acuminata. Anfractus duodecim plani declives, serie transuersa tripli granulorum cincti; margine inferiore imbricato, prominente, crenato, acuto. Basis plana, transuersim striata. Color pallide virescens, fusco luteo maculatus; infra corticem argenteus.

Die Schale ist kegelförmig und zugespitzt. Die zwölf Gewinde sind abhängig, flach, mit einer dreifachen Reihe Körnchen besetzt, am ziegelförmiggestellten scharfen hervorstechenden Unterrande gekerbt. Der Grund ist flach, und der Quere nach gestreift. Blaugrün mit bräunlichen, oder gelben Flecken; unter der Rinde mit einem silberartigen Glanz.

K. II. 2. Trochus vestiarius.

K. II. 2. Das Wulstknöpfchen.

Linn. S. N. Sp. 594.

Belg. Bulislakja. Gall. Bouton de Camifole. Dav.

Testa



Testa conico orbiculata laevi,  
columellae basi callosa.

Die plattkegelförmige schei-  
benrunde Schale hat am Bo-  
den der Spindel einen erha-  
benen Wulst.

α rubella, cingulo albo.

α röthlich, mit einem weißen  
Gürtel.

β cinerea, cingulo albo fuscoque.

β aschengrau, mit einem weiß  
und braun gegliederten Gürtel.

γ alba, radiis obliquatis griseis.

γ weiß, mit schiefen hellgrauen  
Strahlen.

δ plumbea, cingulo albo reticu-  
lato.

δ bleyhbrunz, mit einem weiß-  
gegliederten Gürtel.

List. Hist. Conch. l. 4. f. 8. f. 64.

Petiv. Gaz. t. II. f. 6.

Gualt. Test. t. 65. f. E. F. G.

Gev. Belust. 19. t. 189. f.

Knor. Vergn. VI. 22. t. 7. f.

K. II. 3. Trochus La-  
bio.

K. II. 3. Die Dicklippe.

Linn. S. N. Sp. 595.

Belg. Diklip. Angl. Thick-lip. Top. Petiv.





Testa imperforata, ouata,  
striato tuberculata, apertura  
dentata, incrassata; columel-  
la unidentata.

Die undurchbohrte eysförmige mit Streifen und Knotten besetzte Schale hat eine gezähnte dicke Lippe, und an der Spindel einen Zahn.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 8. f. 25. 26.*

*Rumph. amb. t. 21. f. E.*

*Petiv. amb. t. 12. f. 1.*

*Gev. Belust. 18. v. 165. f.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

K. II. 4. Trochus turbinatus.

K. II. 4. Der türkische Bund.

*Belg. Tulbande.*

Testa ouata, laevi, anfractibus conuexis, columella unidentata, imperforata.

Die eysförmige Schale hat erhabene Gewinde, mit einem Zahne an der undurchbohrten Spindel.

α alba, maculis oblongis nigris.

α weiß, mit länglichen schwarzen Flecken.

β alba, venulis cingulisque articulatis nigris.

β weiß, mit schwarzen Adern, und gegliederten Gürteln.

γ alba, venulis, cingulisque articulatis purpureis.

γ weiß, mit purpurrothen Adern, und gegliederten Gürteln.

*List.*



*List. Hist. Conch. l. 4. f. 8. f. 33. 34. 35.*

*Gualt. Test. t. 63. f. D. E. G.*

*Argenv. Conch. Pl. 6. f. N.*

*Gev. Belust. 20. t. 197. 198. 200. 201. f.*

*Knor. Vergn. I. 10. t. 6. 7. f.*

Testa ovata, Anfractus sex, con-  
uexi, laeues contigui. Apertura  
lunata. laevis. Columellae labium  
unidentatum.

Die Schale ist eysförmig. Die  
sechs Gewinde sind erhaben, glatt,  
und aneinander verwachsen. Die  
Mündung mondförmig, und glatt.  
Die Spindelstelle mit einem Zahne  
versehen.

K. II. 5. Trochus Tu-  
ber.

K. II. 5. Der Knotten-  
bund.

*Linn. S. N. Sp. 596.*

Testa imperforata conica,  
anfractibus subcarinatis utro-  
que margine nodosis.

Die Gewinde der undurch-  
bohrten kegelförmigen Schale  
sind einigermassen keilsförmig,  
und an jedem Rande knottig.

*Argenv. Conch. Pl. 9. f. R. ?*

*Gev. Belust. 19 t. 179 f.*

*Regenf. Samml. 3. t. 27. f.*

*Knor. Vergn. I. 3. t. 2. f.*



K. II. 6. Trochus Conulus.

K. II. 6. Der Schnurbund.

*Linn. S. N. Sp. 598.*

Testa imperforata conica  
striata; anfractibus linea ele-  
vata intertinctis.

Die undurchbohrte kegelförmige gestreifte Schale hat die Gewinde durch eine erhabene Querlinie abgesondert.

*List. angl. t. 3. f. 15.*

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 91. 99.*

*Gualt. Test. t. 61. f. M.*

*Klein. Meth. Ostrac. t. 2. f. 36.*

*Gev. Belust. 9. t. 69, 70. f.*

*Knor. Vergn. VI. 27. t. 5. f.*

K. II. 7. Trochus Zyphiphinus.

K. II. 7. Der Zupubenkräusel.

*Linn. S. N. Sp. 599.*

Testa imperforata, conica,  
laevi, anfractibus marginatis.

Die undurchbohrte kegelförmige glatte Schale hat eingesaumte Windungen.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 93.*

*Rumph. amb. t. 21. f. 1.*



*Gualt. Test. t. 91. f. B. C.*

*Argenv. Conch. Pl. 9. f. N.*

*Knor. Vergn. III. 14. t. 2. 3. f.*

K. II. 8. Trochus granulatus.

K. II. 8. Der gekörnte Kräusel.

Testa imperforata, conica, striis transuersis tenuissimis, & granulatis, alternatim majoribus; suturis emarginatis.

Die undurchbohrte kegelförmige Schale ist der Quere nach mit dünnen, und fein gekörnten Streifen von abwechselnder Größe umgürtet, und an den Näthen eingesäumt.

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa conica, ventricosa. Anfractus circiter decem, transuersum striati; striis alternatim majoribus, & granulis moniliformi serie cinctis, supra prope futuram lineam elevatam marginatis. Basis conuexiuscula, striis majoribus rufo articulatis. Color griseus, faux margaritacea.

Die Schale ist kegelförmig häufich. Die Gewinde, deren ungefähre zehn, sind in die Quere gestreift; die Streifen wechselweise größer, mit Perlenketten umgeben, oben an den Näthen mit einer erhabenen Linie eingesäumt. Der Boden ist etwas häufich, an welchem die größern Streifen rothbraun gegliedert sind. Von hellgrauer Farbe, mit einem perlensmutterartigen Schlunde.

K. II. 9. Turbo crocatus.

K. II. 9. Der Safran-Kräusel.



Testa imperforata conica, Die undurchbohrte Kegelför-  
laevi, futura sulcata, anfrac- mige Schale hat eine gefurch-  
tibus conuexis, spira crocea. te Nath, gewölbte Windun-  
gen, mit einem safranrothen  
Schnirkel.

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa conica, laevis. Anfractus Die Schale ist Kegelförmig, und  
circiter quinque conuexi, sulco su- glatt. Ungefähr fünf erhabene  
turali interlincti. Basis conuexa. Gewinde, die an der Nath mit ei-  
Columella angulata, replicata, te- ner Rurche von einander abge-  
gens foramen obsoletum. Color nert sind. Der Grund ist bäuchig.  
basis, & epidermidis nitens albus, Die eckige, übergeschlagene Spiz-  
spirae sub epidermide croceus. del bedekt ein undeutliches Nabel-  
loch. Der ganze Grund und die  
Oberhaut ist glänzend weiß, der  
Schnirkel unter der Oberhaut sa-  
franroth.

K. III. Turriti, columella exserta,

K. III. Gethürmte, mit hervors-  
ragender Spindelkegze.

K. III. I. Trochus Te-  
lescopicum.

K. III. I. Die See-  
tonne.

*Linn. S. N. Sp. 600.*

Belg. Zeeton. Rumph. Angl. Indian Whirligig. Petiv. Gall. Le Te-  
lescope. Dav.

Testa imperforata turrita, Die undurchbohrte gethürm-  
striata, columella exserta spi- te und gestreifte Schale hat ei-  
rali. ne hervorragende gewundene  
Spindel.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 92.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 8. f. 10.*

*Rumph.*





*Rumph. amb. t. 21 f. 12.*

*Petiv. amb. t. 4. f. 10.*

*Argenv. Conch. Pl. 11. f. B.*

*Seb. Thes. III. t. 50. f. 1 — 12.*

*Knor. Vergn. III. 22. t. 2. 3. f.*

— *Del. nat. I. t. B. IV. f. 9.*

K. III, 2. Trochus do-  
labratus.

K. III, 2. Die Schiffs-  
fabne.

*Linn. S. N. Sp. 601.*

*Belg. Vlaggetje.*

Testa umbilicata turrata,  
glabra; columella exserta, re-  
curvata, triplicata.

Die genabelte gehürnte glat-  
te Schale hat eine hervorras-  
gende gedrehte, mit drey Fal-  
ten versehene Spindel.

*Argenv. Conch. Pl. 14. f. L.*

*Knor. Vergn. VI. 29. t. 2. f.*

L. Turbo.

L. Die Mondschnecke.

Testa spiralis, apertur-  
ra coarctata, rotunda, in-  
tegra.

Die schnirkelförmig ge-  
wundene Schale hat eine  
eingefasste, runde, ganz-  
randige Mündung.



L. I. Imperforati, columella plana.

L. I. Undurchbohrte mit einer flachen Spindel.

L. I. 1. Turbo littoreus.

L. I. 1. Die Strandschnecke.

Linn. S. N. Sp. 607.

Belg. Aliékruiken. Angl. Couvin. Gall. Bigourneau.

Testa subouata transuersim fasciata, columella plana.

Die etwas eysförmige Schale ist der Quere nach mit Bändern umgeben, und mit einer flachen Spindel versehen.

List. angl. t. 3. f. 9.

— Hist. Conch. l. 4. f. 5. f. 43.

Gualt. Test. t. 45. f. G.

Mus. Caes. Vindobon.

L. I. 2. Turbo muricatus.

L. I. 2. Die Reißbrennschnecke.

Linn. S. N. Sp. 608.

Testa umbilicata, subouata, cincta punctis eminentibus transuersim digestis, columella obtusa.

Die genabelte, etwas eysförmige Schale ist in die Quere mit erhabenen reiheweisen Körnern besetzt, und mit einer stumpfen Spindel versehen.

Gualt.



Gualt. Test. 1. 45. f. F.

Mus. Caes. Vindobon.

L. II. Imperforati, solidi.

L. II. Undurchbohrte dickschalige

L. II. 1. Turbo Pullus.

L. II. 1. Die Bock-  
schnecke.

Linn. S. N. Sp. 610.

Belg. Bokje.

Testa imperforata ovata, lae- Die undurchbohrte, eysför-  
ui; apertura antice angulata. mige glatte Schale hat eine  
vorne eckige Mündung.

Picta maculis, fasciisque purpu-  
reis & albidis.

Mit weißlichen, und purpuro-  
then Flecken, und Bändern bema-  
let.

Mus. Caes. Vindobon.

L. II. 2. Turbo Petho-  
latus.

L. II. 2. Der Nassauer.

Linn. S. N. Sp. 612.

Belg. Petool-Horn. Angl. Nassaw-Shell. Petiv. Gall. La Nassaviennne.  
Argenv.

Testa imperforata ovata lae-  
ui, anfractibus versus futuram  
obtusè carinatis.

Die undurchbohrte eysförmi-  
ge glatte Schale ist auf den  
Gewinden gegen die Nath mit  
einer stumpfen Querkiele um-  
geben.

List.



- List. Hist. Conch.* l. 4. f. 5. f. 39.  
*Rumph. amb. t.* 19. f. D. 5. 6. 7.  
*Petiv. amb. t.* 7. f. 15.  
*Argenv. Conch. Pl.* 6. f. K.  
*Seb. Thes.* III. t. 74. f. 23 — 29.  
*Klein. Merb. Ostr. t.* 2. f. 51.  
*Gev. Belust.* 21. t. 205 — 208 f.  
*Regenf. Samml.* I. 8. t. 18. f. 9. t. 27 f.  
*Knor. Vergn.* I. 3. t. 3. f.  
 ——— II. 22. t. 1. 2. f.  
 ——— III. 3. t. 3. f.; 23 t. 4. f. 28 t. 2. 5 f.  
 ——— *Del. nat.* I. t. B. III. f. 7.

L. II. 3. Turbo Coch-  
lus.

L. II. 3. Der grüne  
Silbermund.

*Linn. S. N. Sp.* 613.

*Belg.* Zilvermond. *Angl.* Silver - Mouth Shell. *Gall.* Bouche d'Argent. *Argenv.*

*Testa imperforata, ouata,* Die undurchbohrte eiförmig-  
*transuersim obsolete sulcata,* ge Schale ist mit matten Quer-  
*cingulo unico dorsali crassiore.* furchen umgeben, deren eine  
 auf den Rücken dicker als die  
 andern ist.

*List. Hist. Conch.* l. 4. f. 5 f. 29.

*Rumph. amb. t.* 19. f. 4.

*Petiv. amb. t.* 9. f. 14.

*Argenv.*



*Argenv. Conch. Pl. 6. f. 7.*

*Seb. Thes. III. t. 74. f. 20, 21.*

*Gev. Belust. 20 t. 9. f.*

*Regenf. Samml. I. 1. t. 12. f.*

*Knor. Vergn. I. 3. t. 3. f.*

—— *Del. nat. I. t. B. III. f. 6.*

L. II. 4. Turbo Chry-  
sostrum.

L. II. 4. Der Gold-  
mund.

*Linn. S. N. Sp. 614.*

*Belg. Goud - Mond. Rumph. Angl. The golden mout'd Snail. Hill  
Gall. Bouche d'or. Dav.*

Testa imperforata subouata Die undurchbohrte etwas en-  
rugosa, anfractibus spinarum förmige runzelichte Schale hat  
fornicatarum serie duplici ein- auf den Gewinden mit einer  
eis. doppelten Reihe hohler Sta-  
cheln besetzt.

*Rumph. amb. t. 19. f. E.*

*Petiv. amb. t. 4. f. 4.*

*Gualt. Test. t. 62 f. H.*

*Argenv. Conch. Pl. 6. f. D.*

*Klein. Meth. Ostr. t. 7. f. 126.*

*Seb. Thes. III. t. 74. f. 9 — 11.*

*Hill.*





Hill. Hist. of. Anim. Pl. 7.

Gev. Belust. 18. t. 171. f.

Knor. Vergn. II. 14. t. 2. f.

— — V. 13. t. 3. f.

L. II. 5. Turbo Te-  
stum perficum.

L. II. 5. Das chinesi-  
sche Dach.

Linn. S. N. Sp. 615.

Angl. The prikly Trochus Hill. Gall. Le toit chinois.

Testa imperforata, ouata  
spinis obtusis depressis, sub-  
tus papillofa.

Die undurchbohrte euförmis-  
ge Schale ist unten mit Wärg-  
chen, oben mit stumpfen nie-  
dergedruckten Dörnern besetzt.

Argenv. Conch. Pl. 8. f. P.

Hill. Hist. of Anim. Pl. 7.

Mus. Caes. Vindobon.

L. II. 6. Turbo Pago-  
dus.

L. II. 6. Die Pagoden-  
schnecke.

Linn. S. N. Sp. 616.

Belg.



Belg. Langleevende Tol. Rumph. Angl. Great Nestors Top. Petiv.  
Gall. La Pagode. Dav.

Testa imperforata, conica, Die undurchbohrte kegelför-  
spinis obtusis concatenatis, sub- mige untenher warzige und ge-  
tus papillosa, striata. streifte Schale ist mit auf den  
Gewinden mit aneinander schlies-  
senden stumpfen Dörnern be-  
setzt.

List. Hist. Conch. l. 4. f. 8. f. 36.

Rumph. amb. t. 21. f. D.

Petiv. amb. t. 10. f. 8.

Gualt. Test. t. 22. f. B. C.

Argenv. Conch. Pl. 8. f. A.

Gev. Belust. 8. t. 62. f.

Knor. Vergn. I. 25. t. 3. 4. f.

L. II. 7. Turbo Calcar. L. II. 7. Der Sporn.

Linn. S. N. Sp. 617.

Belg. De Spoor. Rumph. Angl. Spur - Shell. Pet. Gall. L' Eperon.  
Dav.

Testa subimperforata de- Die eigermäßen undurchbohr-  
pressa, anfractibus scabris su- te niedergedrückte Schale ist  
pra spinis fornicato compressis. auf den Gewinden rauh, und  
oben mit blattgedrückten hohlen  
Dörnern umgeben.

List.



*List. Hist. Conch. l. 4. f. 6. f. 46.*

*Rumph. amb. t. 20. f. 7.*

*Petiv. amb. t. 9. f. 13.*

*Argenv. Conch. Pl. 6. f. R.*

*Klein. Meth. Ostr. t. 1. f. 128.*

*Gev. Belust. 8. t. 60. f.*

*Knor. Vergn. III. 20. t. 1. f.*

L. II. 8. Turbo rugo-  
sus.

L. II. 8. Der Runzel-  
bund.

*Linn. S. N. Sp. 618.*

*Belg. Gerimpelde Tulband.*

Testa imperforata subouata, Die undurchbohrte einiger  
striata, anfractibus superne maßen euförmige gestreifte Scha-  
rugosis. le hat am obern Umfange der  
Gewinde mit Knotten besetzt.

*Bonon. Recr. cl. 3. f. 12.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 8. f. 41.*

*Gualt. Test. t. 63. f. C. F. H.*

*Seb. Thes. III. t. 74. f. 13. 14.*

*Gev. Belust. 15. t. 136. f.*

*Knor. Vergn. III. 20. t. 1. f.*

L. II. 9.



L. II. 9. Turbo mar-  
moratus.

L. II. 9. Die Schlän-  
genhaut.

*Linn. S. N. Sp. 619.*

*Belg. Slangen - Velle - Hoorn. Angl. The green Giants Ear. Gali. L'oreille de geant.*

Testa imperforata subouata Die undurchbohrte etwas  
laevi, anfractibus trifariam eyförmige glatte Schale ist am  
marginato nodosis, columella Rande der Gewinde mit einer  
subrostrata explanata. dreyfachen Reihe Knotten um-  
geben, und an der Spindel  
einigermassen in einen Rüssel  
verlängert, und flachgedrückt.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 5. f. 46.*

*Rumph. amb. t. 19. f. A. B.*

*Gualt. Test. t. 64. f. A.*

*Seb. Thes. III. t. 74. f. 1. 2.*

*Klein. Meth. Ostr. t. 7. f. 124.*

*Gev. Belust. 13. t. 128 — 131 f.*

*Regenf. Samml. I. 5. t. 52. f.*

*Knor. Vergn. III. 26. t. 1 f.; 27. t. 11. f.*

L. II. 10. Turbo sar-  
maticus.

L. II. 10. Der Del-  
frug.



Linn. S. N. Sp. 620.

Belg. Bont Knobbel - Hoorn. Rumph. Gall. Le burgau. Dav.

Testa imperforata, connexo Die undurchbohrte erhabene  
nodosa obtusa, anfractibus su- runde stumpfe Schale hat  
pra nodosis, canali intertinctis. oben knottige Gewinde, die  
durch eine Rinne von einander  
abgesondert stehen.

Argenv. Conch. Pl. 8. f. B.

Gev. Belust. 7. t. 52 f.

Knor. Vergn. II. 9. t. 1. f.

L. II. II. Turbo galea-  
rus.

L. II. II. Die Sturm-  
haubenartige Mondschncke.

Testa turbinata transuersim Die birnförmige Schale ist  
fulcata, anfractibus oblique in die Quere gefurchet, auf  
angulatis, labio unidentato. den Gewinden mit schiefen  
Ecken, und an der Spindel-  
leste mit einem Zähnen be-  
setzt.

List. Hist. Conch. l. 4. f. 8. f. 51.

Mus. Caes. Vindobon.

Testa turbinata solida. Anfra- Die Schale ist dicht und birn-  
ctus quatuor., transuersim fulcati, förmig. Die vier Gewinde sind der  
prope marginem externum angulis Quere nach gefurchet, am äußern  
obliquis, obrusis. Apertura luna- Rande mit schiefen, stumpfen Ecken  
ta. Labrum integrum acutum. versehen. Die Mündung mond-  
Columella subumbilicaria. Labium förmig. Die Schalenleste ganzran-  
reflexum plica, seu denticulo acu- dig, und scharf. Die Spindel et-  
to notatum. Color albus, punctis nigermaßen durchbohret. Die Spin-  
dispersis rufis. delleste übergeschlagen, und mit ei-  
ner spitzigen zahnförmigen Falte  
besetzt. Von weißer Farbe mit  
zerstreuten rothbraunen Punkten.

L. II. 12.





L. II. 12. Turbo trochiformis.

L. II. 12. Die träufelartige Mondschnecke.

Gall. La fripiere. Dav.

Testa imperforata convexo conica, anfractibus plicato-rugosis, basi plano concava, apertura falcata.

Die undurchbohrte, runderhabene kegelförmige Schale ist auf den Windungen mit Runzeln und Falten besetzt, am Grunde flach und hohl, mit einer schüsselförmigen Mündung.

Knor: Vergn. III. 29. t. I. 2. f.

Mus. Caes. Vindobon.

Testa convexo conica, tenera, subpellucida. Anfractus declives imbricati, plicato rugosi. Basis plano concava. Labrum integerrimum, falcatum. Columella subhorizontalis, reflexa, imperforata. Color albus, radiis obliquis curvatis luteis.

Die Schale ist runderhaben kegelförmig, dünn, und halb durchsichtig. Die kegelförmig abhängigen Gewinde sind mit Runzeln und Falten besetzt. Der Grund ist flach und hohl. Die Schalenleiste ganz randig und schüsselförmig. Die Spindel beinahe wagrecht, ohne Nabel. Von weißer Farbe, mit krummen gelben Querspäßen.

Vestigiata, testis alienis insidentibus.

Sie hat Eindrücke von fremden aufliegenden Schalen.

L. II. 13. Turbo helicinus.

L. II. 13. Die Schirmfelmundschnecke.



Testa rotundata glabra, anfractibus conuexis, columella incrassata, subimperfiorata.

Die rundliche glatte Schale hat gewölbte Windungen, eine verdickte Spindel, mit einem unvollkommenen Nabel.

*Knor. Vergn. V. 3. 1. f.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa rotundata, solida. Anfractus sex conuexi, laeues, contigui. Apertura ovata. Columella incrassata, replicata; Umbilicus obsoletus, tectus. Color epidermidis ex purpureo viridescens, faucis argenteo margaritaceus.

Die Schale ist rundlich und dicht. Die sechs Gewinde sind erhaben, glatt, und berühren einander. Die Spindel ist verdickt, übergeschlagen, mit einem gedeckten unvollkommenen Nabelloche. Die Oberhaut ist purpurfarbig und grünlich, der Schlund mit einem silbernen Perlenmutterglanz.

L. III. Solidi, perforati.

L. III. Dichte, durchbohrte.

L. III. 1. Turbo cinereus.

L. III. 1. Die aschengraue Mondschnecke.

Testa rotundata, laeui, anfractibus conuexis, columellae basi elongata, fauce sulcata, umbilico lato.

Die rundliche glatte Schale hat erhabene Gewinde, einen gefurchten Schlund mit einem breiten Nabelloche.

*Mus. Caes. Vindobon.*



Testa rotundata, laevis. Anfractus sex convexi, prope suturam complanati, & obsolete transuersim striati. Apertura semicircularis. Columellae basis elongata, diducta. Umbilicus profundus. Color cinereus, maculis & lineis albis nigrisque,

Die Schale ist rundlich und glatt. Die sechs Gewinde sind bäuchig, nächst der Naht plattgedrückt, mit unvollkommenen Querstreifen. Die Mündung ist halbrund. Der Grund der Spindel ist verlängert, und ausgebreitet. Der Nabel tief. Von aschengrauer Farbe mit weissen und schwarzen Flecken und Strichen.

L. III. 2. Turbo nodulosus.

L. III. 3. Die knottige Mondschnecke.

Testa conico rotundata, anfractibus noduloso striatis, denticulo umbilicali.

Die runderhabene kegelförmige Schale ist an den Gewinden mit Knotten und Streifen besetzt, und an dem Nabelloche mit einem Zähnen versehen.

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa simillima sequenti, sed transuersim striata, nodisque obliquis obsita. Color niger, maculis dispersis niveis.

Die Schale ist der folgenden am ähnlichsten, nur ist sie mit schiefen Knotten und Streifen besetzt. Von schwarzer Farbe mit zerstreuten schneeweißen Flecken.

L. III. 3. Turbo Pica.

L. III. 3. Die Elster.



Linn. S. N. Sp. 622.

Belg. Soldat. Angl. Magpye Top - Shell. Pet. Gall. La Pic. Dav.

Testa umbilicata, conico ro- Die genabelte runderhäutene  
tundata, laevi, denticulo um- kegelförmige glatte Schale ist  
bilicali. am Nabelloche mit einem Zähns-  
chen versehen.

Bonan. Recr. cl. 3. f. 29. 30.

List. Hist. Conch. l. 4. f. 14. f. 2.

Petiv. Gaz. t. 70. f. 9.

Rumph. amb. t. 21. f. A.

Gualt. Test. t. 68. f. B.

Argenv. Conch. Pl. 8. f. G.

Adans. Seneg. Pl. 12. f. 7.

Gev. Belust. t. 10 f. 74 — 77.

—— — II. t. 78 — 80. f.

Regenf. Samml. I. 6. t. 66. f. ; II t. 57 f.

Knor. Vergn. I. 10. t. 1. f.

—— — II. 21. t. 3. f.

L. III. 4. Turbo Argy-  
rostomus.

L. III. 4. Der geribbte  
Silbermund.

Linn. S. N. Sp. 624.

Belg. Geplekte Zilver - Mond. Angl. The spotted Silvermouth. Gall  
La bouche d'argent bariolée, Argenv.

Testa



Testa umbilicata, subouata, transuersim cingulata, longitudinaliter striata.

Die genabelte eysförmige Schale ist in die Quere gegürtet, und der Länge nach gestreift.

Alba, fasciis longitudinalibus fuscis.

Weiß, mit nach der Länge herablaufenden Bändern.

List. Hist. Conch. l. 4. f. 12. f. 9.

Rumph. amb. t. 19. f. 3.

Gualt. Test. t. 64. f. D.

Argenv. Conch. Pl. 6. f. F.

Seb. Thes. III. t. 74. 4. 6.

Gev. Belust. 16. t. 153. 154. f.

Regenf. Samml. I. 10. t. 43. f.

Knor. Vergn. III. 15. t. 5. f.

Da Cost. Elem. Pl. 3. f. 12.

L. III. 5. Turbo margaritaceus.

L. III. 5. Der bunte Silbermund.

Linn. S. N. Sp. 625.

Belg. Bonte Zilver - Mond.





Testa umbilicata subovata  
cingulis elevatis, intercostali-  
bus laevibus.

Die genabelte, einigermaßen  
eyförmige Schale hat erhabene  
zwischen den Furchen liegende  
Bürteln.

Alba maculis viridescens fuscis-  
cisque.

Weiß, mit grünlischen und brau-  
nen Flecken.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 11.*

*Argenv. Conch. Pl. 6. f. A.*

*Seb. Thes. III. t. 74. f. 3.*

*Gev. Belust. 17. t. 155 — 158. f.*

L. III. 6. Turbo Del-  
phinus.

L. III. 6. Der gezackte  
Dolphin.

*Linn. S. N. Sp. 626.*

*Belg. Getackte Dolphyn. Angl. The echinated Snail, Petiv. Gall.  
le Dauphin. Dav.*

Testa umbilicato hispida,  
anfractuum spinis ramosis.

Die Schale hat einen gez-  
ackten Nabel, und mit ästis-  
gen Stacheln besetzte Gewinde.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 31.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 6. f. 45.*

*Rumph. amb. t. 20. f. H.*

*Petiv.*



*Petiv. amb. t. 3. f. 1.*

*Gualt. Test. t. 68. f. C.*

*Gev. Belust. 4. t. 26 — 28. f.*

*Hill. Hist. of. Anim. Pl. 7.*

*Argenv. Conch. Pl. 6. f. H.*

*Seb. Thes. III. t. 59. f. 15 — 27.*

*Knor. Vergn. I. 22. t. 4. 5. f.*

L. III. 7. Turbo distortus.

L. III. 7. Der geribbte Delphin.

*Linn. S. N. Sp. 627.*

Testa umbilicata, submucronata, spinis indivisis.

Die genabelte und gezackte Schale ist an den Gewinden mit ungetheilten Stacheln besetzt.

*Gualt. Test. t. 68. f. D.*

*Gev. Belust. 4. t. 24. f.*

*Seb. Thes. III. t. 59. f. 1 — 6.*

*Knor. Vergn. IV. 7. t. 2. 3. f. ; 8. t. 1. f.*

L. III. 8. Turbo carinatus.

L. III. 8. Die gefielte Mondschnecke.



Testa rotundata, anfractibus carinatis, umbilico spirali profundo.

Die ründliche Schale ist an den Gewinden mit Kielen umgeben, und mit einem tiefen schnirkelförmigen Nabel versehen.

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa rotundata, pyramidata, tenera, subpellucida. Anfractus quinque teretes, cincti carinis lamellosis tribus sex, supremis tenuioribus. Apertura orbicularis. Umbilicus verticalis, spiralis, latus. Color albus.

Die Schale ist rund, pyramidenförmig, dünn und halbdurchsichtig. Die fünf Gewinde sind erhaben rund, mit drey bis sechs blätterichten Kielen, davon die obersten dünner sind, umgeben. Die Mündung ist rund. Der breite schnirkelförmige Nabel steht senkrecht. Von weißer Farbe.

L. IV. Cancellati.

L. IV. Segitterte.

L. IV. 1. Turbo scalaris.

L. IV. 1. Die achte Wendeltreppe.

*Linn. S. N. Sp. 630.*

*Belg. Wenteltrap. Angl. Royal Stair - Case. Pet. Gall. La vraie Scallata. Dav.*

Testa umbilicata, ventricoso conica, anfractibus distantibus, fasciis longitudinalibus membranaceis intertextis.

Die genabelte häuchige kegelförmige Schale hat entfernte Gewinde, die mit nach der Länge herablaufenden häutigen Klammern verwachsen sind.

*Rumph.*



*Rumph. amb. t. 49. f. A.*

*Petiv. amb. t. 2. f. 9.*

*Gualt. Test. t. 10. f. ZZ.*

*Argenv. Conch. Pl. 11. f. V.*

*Knor. Vergn. IV. 20. t. 2. 3. f.*

—— ——— *V. 23. t. 1. f.; 24. t. 6. f.*

*Murr. Fund. Test. t. 1. f. 7.*

*Mart. Konch. Kab. IV. 152. t. 1428. 1431. f.*

—— ——— ——— *153. t. 1432. 1433. f.*

L. IV. 2. Turbo Cla-  
thrus.

L. IV. 2. Die gemei-  
ne Wendeltreppe.

*Linn. S. N. Sp. 631.*

*Belg. Wentel-Trapje. Angl. Smaal Stair-Case. Petiv. Gall. La  
sauffe escalata. Dav.*

Testa exumbilicata turrata,  
anfractibus contiguus, fasciis  
longitudinalibus membra-  
neis.

Die thurmformige Schale  
hat von einander entfernte Ge-  
winde, und häutige nach der  
Länge laufende Klammern,  
ohne Nabelloch.

α niuea, unicolor.

α schneeweiß, einfärbig.

β niuea, maculis dispersis pur-  
pureis.

β schneeweiß, mit zerstreuten  
purpurrothen Flecken.

γ grisea, clathris niueis.

γ lichtgrau, mit schneeweißen  
Klammern.

Bonan,



*Bonan. Recr. cl. 3. f. III.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 5. f. 51.*

*Gualt. Test. t. 58. f. H.*

*Klein. Meth. Ostr. t. 3. f. 66.*

*Ginan. adr. II. t. 6. f. 54.*

*Knor. Vergn. I. II. t. 5. f.*

— — — — *IV. 20. t. 4 — 6. f.*

*Mart. Konch. Kab. IV. 157. t. 1484 f.*

L. IV. 3. Turbo Uua. L. IV. 3. Das Bienenkörbchen.

*Linn. S. N. Sp. 638.*

*Belg. Gebakerde Kindje. Gall. Enfant au maillot. Dav.*

Testa umbilicata, ouata, anfractibus contiguus, plicis longitudinalibus, columella uniplicata.

Die genabelste eysförmige Schale hat aneinander genäher- te Windungen, mit nach der Länge laufenden Falten, und einer Falte an der Spindel.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 140.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 5 f. 47.*





*Petiv. Gaz. t. 27. f. 2.*

*Gualt. Test. t. 58. f. D.*

*Seb. Thes. III. t. 55. f. 12.*

*Knor. Vergn. VI. 25. t. 4. f.*

*Mart. Konch. Konch IV. 153. t. 139. f.*

L. IV. 4. Turbo Lin-  
cina.

L. IV. 4. Der Breit-  
rand.

*Linn. S. N. Sp. 639.*

Testa umbilicata oblonga,  
anfractibus decussatim striatis,  
aperturae limbo dilatato.

Die genabelte längliche  
Schale hat gleichbreite kreuz-  
weise gestreifte Windungen,  
mit einem erweiterten Mün-  
dungsrande.

*Petiv. Gaz. t. 118. f. 11.*

*Klein. Meth. Ostr. t. 3. f. 71.*

*Berlin. Mag. IV. 3. t. 3. f.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

L. V. Turriti.

L. V. Getbürmte.

L. V. 1. Turbo imbri-  
catus.

L. V. 1. Die bunte  
Schraube.

*Linn.*



*Linn. S. N. Sp. 640.*

Testa turrita, anfractibus  
deorsum imbricatis.

Die Gewinde der gethürm-  
ten Schale sind niederwärts  
ziegelförmig gefalten.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 5. f. 61.*

*Gualt. Test. t. 58. f. E.*

*Seb. Tbes. III. t. 56. f. 34.*

*Knor. Vergn. VI. 25. t. 2. f.*

*Mart. Konch. Kab. IV. 152. t. 1422. f.*

L. V. 2. Turbo acut-  
angulus.

*Linn. S. N. Sp. 642.*

L. V. 2. Die Scharf-  
ribbe.

Testa turrita, anfractuum ca-  
rina unica majore, acuta.

Die Gewinde der gethürm-  
ten Schale haben einen grö-  
ßeren und scharfschneidigen  
Querfel.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 117.*

*Gualt. Test. t. 58. f. B.*

*Mart. Konch. Kab. IV. 67. t. 742. 743. f.*

L. V. 3. Turbo dupli-  
catus.

L. V. 3. Die Doppel-  
ribbe.

*Linn.*



*Linn. S. N. Sp. 643.*

Testa turrita , anfractuuum  
carinis duabus acutis.

Die Gewinde der gethürm-  
ten Schale haben zween scharfe  
Querkiele.

*List. angl. t. 3. f. 7.*

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 114.*

*Gualt. Test. t. 58. f. C.*

*Seb. Thes. III. t. 56. f. 7. 8.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

L. V. 4. Turbo exole-  
tus.

L. V. 4. Die alte  
Schraube.

*Linn. S. N. Sp. 644.*

Testa turrita , anfractibus  
longitudinaliter rugosis, cari-  
nis duabus obtusis margina-  
libus.

Die Gewinde der gethürm-  
ten nach der Länge gerunzelten  
Schale haben zween stumpfe  
am Rande stehende Querkiele.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 5. f. 53.*

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 113.*

*Argenv. Conch. Pl. 14. f. C.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

L. V. 5.



L. V. 5. Turbo torcularis.

L. V. 5. Die gestreifte Trommelschraube.

Testa turrita, anfractibus transuersim striatis, carinis duabus obtusis submarginalibus,

Die Gewinde der gethürmten Schale sind in die Quere gestreift, und mit zween stumpfen vom Rande etwas entfernten Querkieleu umgeben.

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa turrita. Anfractus circiter duodeni transuersim striati, carinis cincti duabus distantibus, obtusis, margini cuius propinguis. Apertura allinium. Color albus, maculis longitudinalibus undulatis fuscis.

Die Schale ist gethürmt. Die Gewinde deren ungefähr zwölf, sind der Quere nach gestreift, und mit zween stumpfen Querkieleu umgeben, die nicht weit von jedem Rande entfernt stehen. Die Mündung ist wie an den anverwandten Arten. Die Farbe weiß mit wellenförmigen nach der Länge laufenden Flecken.

L. V. 6. Turbo Terebra.

L. V. 6. Die Trommelschraube.

*Linn. S. N. Sp. 645.*

*Belg. Trommel-Schroef.*

Testa turrita, anfractuum carinis sex, acutis.

Die Gewinde der gethürmten Schale haben sechs scharfe Querkiele.

So.



*Bonan. Recr. cl. 3. f. 115.*

*Rumph. amb. t. 30. f. M.*

*Petiv. amb. t. 13. f. 18.*

*Gualt. Test. t. 58. f. A.*

*Adans. Seneg. Pl. 10. f. 6.*

*Argenv. Conch. Pl. 11. f. D.*

*Seb. Thes. III. t. 56. f. 40.*

*Knor. Vergn. I. 8. t. 6. f.*

*Mart. Konch. Kab. IV. 152. t. 1425. f.*

L. V. 7. Turbo bidens. L. V. 7. Die gefleckte  
Zahnschraube.

*Linn. S. N. Sp. 649.*

Testa turrita, pellucida, Die gethürmte durchsichtige  
anfractibus contrariis, prope Schale hat linksgewundene  
futuram maculatis, apertura an der Muth gefleckte Windun-  
g postice bidentata, gen, und hinten an der Mün-  
dung zween Zähnen.

*List. Hist. Conch. l. 1. f. 39.*

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 41.*

*Gualt. Test. t. 4. f. C.*

*Argenv. Conch. Pl. 28. f. 20.*

*Murr. Fund. Test. t. 1. f. 2.*

*Schroet. Erdkonch. I. t. 4. f.*





L. V. 8. Turbo quin-  
quedentatus.

L. V. 8. Die fünfzäh-  
nige Schraube.

Testa turrata subpellucida,  
labio tridentato, labro bipli-  
cato.

Die gethürmte halbdurchsich-  
tige Schale hat an der Spindel-  
leſſe drey, an der Schalen-  
leſſe zwey Falten.

*Mus. Caes. Vindobon.*

Simillima praecedenti. Testa cy-  
lindraceo turrata. Anfractus duo-  
decim. Columella subumbilicata.  
Labium plicis membranaceis tri-  
bus; labrum binis. Color albidus.

Die Schale ist der vorhergehen-  
den am ähnlichsten, von gethürm-  
ter walzenförmiger Gestalt. Der  
Gewinde sind zwölf an der Zahl.  
Die Spindel ist einigermaßen ge-  
nabelt. Die Spindel-leſſe ist mit  
drey, die Schalenleſſe mit zwey  
dünnen Falten besetzt. Von weiß-  
licher Farbe.

L. V. 9. Turbo detri-  
tus.

L. V. 9. Die eysförmig-  
e Schraube.

*Müll. Hist. Verm. II. Sp. 300.*

Testa ovata, laevi, colu-  
mella subimperfiorata, aper-  
tura ovata.

Die Schale ist eysförmig,  
und glatt; die Spindel eini-  
germaßen durchbohret, die  
Mündung eysförmig.



*List. Hist. Conch. l. 1. f. 1. f. 2.*

*Gualt. Test. t. 5 f. N.*

*Berlin. Magaz. III. 5. t. 53. f.*

*Schroet. Erdkonch. 1. t. 1. f.*

## M. Cornu.

## M. Die Hornschnecke.

Testa elongato conica Die verlängerte kegelförmige gedrehte Schale  
volutata. Anfractus cylindrici distantes. Aper- hat walzenförmige frey-  
tura elabiata, imperfora- hende Gewinde, und eine  
ra. Mündung ohne Lefzen und  
Nabelloch.

## M. 1. Cornu Copiae. M. 1. Das Füllhorn.

Testa conico turrata, anfra- Die kegelförmig gethürmte  
tibus duobus, apertura or- Schale hat zwey Gewinde,  
biculata. und eine ganz runde Mündung.

*Index Mus. Caes. Vindobon. 1.*

*Mus. Caes. Vindobon.*



Testa conico turrita dextrorsum  
volutata. Anfractus duo continua-  
ti, teretes, distantes, infimo remo-  
tissimo. Apex obtusus. Apertura  
orbicularis latere interno patumper  
revoluta, sine columella, labio, &  
umbilico. Color lutescens, fasciis  
tribus longitudinalibus dorso, fuscis.  
Hinc ab affine specie *Sebae* (\*)  
*Argenville* (\*\*) & vix non  
*Othon. Mülleri* (\*\*\*) distincta.

Die Schale ist kegelförmig und  
gethürmet, nach der Rechten gedre-  
het. Die zwei Gewinde sind un-  
terbrochen, walzenförmig, und  
stehen von einander frey entfernt,  
davon das letzte am weitesten ab-  
stehet. Die Spitze ist stumpf. Die  
Mündung scheibenrund, an der  
inneren Seite etwas wenig aus-  
wärts übergeschlagen, ohne Spin-  
del, Lesze, und Nabelloch. Von  
gelblicher Farbe, mit drey nach  
der Länge des Rückens laufenden  
schwarzbraunen Bändern. Da-  
durch unterscheidet sie sich als eine  
besondere Art von jener, welcher  
*Seba* (\*) und *Argenville* (\*\*) und  
vielleicht auch von der, wel-  
cher *Otho Müller* (\*\*\*) gedenket.

## N. Helix

Testa spiralis, anfra-  
ctibus contiguis, columel-  
la elabiata, apertura co-  
arctata.

## N. Die Schnirkel- schnecke.

Die schnirkelförmige  
Schale hat verwachsene  
Gewinde, an der Spin-  
del keine Lesze, und an  
der Mündung keinen Ein-  
schnitt.

(\*) *Thes. III. t. 40 f. 27.*

(\*\*) *Conch. II. Pl. 9. f. 2.*

(\*\*\*) *Hist. Verm. II. Sp. 313.*



N. I. Testa ancipiti.

N. I. Mit zweyschneid'ger Schale.

N. I. 1. *Helix Scarabaeus*.

N. I. 1. Die Käferschnecke.

*Linn. S. N. Sp. 655.**Belg.* Toover Slak. *Angl.* River ragged Mouth. *Pet. Gall.* Gueule de Loup. *Dav.*

Testa ovata, ancipiti; apertura dentata.

Die eysförmige zweyschneidige Schale hat eine gezähnte Mündung.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 5. f. 31. 32.**Bonan. Recr. cl. 3. f. 44. 385.**Petiv. Gaz. t. 4. f. 10.*

— amb. t. 12. f. 3.

*Rumph amb. t. 27. f. 7.**Gualt. Test. t. 4. f. S.**Argenv. Conch. Pl. 9. f. T.**Klein. Meth. Ostr. t. 1. f. 23.**Berlin. Mag. III. 6. t. 67. f.**Knor. Vergn. VI. 19. t. 2. 3. f.*

N. II. Anfractibus carinatis.

N. II. Mit kelförmigen Gewölben.

N. II. 1. *Helix Lapicida*.

N. II. 1. Der Steinspicker.



*Linn. S. N. Sp. 656.*

*Belg. Steenbikker. Angl. Land Cheese Shell. Pet. Gall. Le Planorbe terrestre. Geof.*

*Testa carinata, orbiculari, umbilica a, utrinque conuexa, apertura marginata, transuersa, ouata.* Die gekielte scheibenrunde genabelte Schale ist beiderseits runderhaben, mit einer eingesäumten, querliegenden, eysförmigen Mündung.

*List. angl. t. 2 f. 14.*

—— ——— *Hist. Conch. l. I. f. 8. f. 68.*

*Petiv. Gaz. t. 92. f. II.*

*Berlin. Magaz. II. 3 t. 15. f.*

*Slotterb. Aët. helv. V. 3 t. 36 f.*

*Schroet. Erdk. 2 t. 23 f.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

*N. II. 2. Helix algira. N. II. 2. Der Wachs-*  
*schnecke.*

*Linn. S. N. Sp. 660.*

*Testa subcarinata, complanata, anfractibus teretibus, supra reticulatim striatis, umbilico peruito.* Die einigermaßen gekielte flache Schale hat runde Gewinde, die oben kreuzförmig gestreift sind, mit einem tiefen Nabel.

*Mus. Caes. Vindobon.*

*N. II. 3.*





N. II. 3. *Helix Plano-*  
bis.

N. II. 3. Die Schei-  
benschnecke.

*Linn. S. N. Sp. 662.*

Testa carinata, umbilicata,  
plana, supra concava apertu-  
ra utrinque acuta.

Die gefielte, genabelte flas-  
che Schale, ist oben ausge-  
höhlet, und mit einer beider-  
seits scharfen Mündung verse-  
hen.

*List. angl. t. 2 f. 27.*

— *Hist. Conch. l. 2. p. I. f. 24.*

*Petiv. Gaz. t. 10. f. 11.*

*Gualt. Test. t. 4. f. EE.*

*Klein. Meth. Ostr. t. I. f. 8.*

*Gev. Belust. 4. t. 21. 23. f.*

*Berlin. Magaz. IV. 8. t. 18. f.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

N. II. 4. *Helix margi-*  
nata.

N. II. 4. Der einge-  
säumte Kegelschnecken.

*Müll. Hist. Verm. II. Sp. 241.*

Testa umbilicata, carinata,  
depresso conica, oblique stria-  
ta, apertura transuersa, tri-  
angulari.

Die genabelte und gefielte,  
flachkegelförmige Schale ist  
schieß gestreift, und mit einer  
querliegenden dreieckigen Mün-  
dung versehen.



Alba, fasciis transuersis rufis.

Weiß, mit rotbraunen Quer-  
bändern,

*Mus. Caes. Vindobon.*

N. II. 5. *Helix plicata*.  
ra.

N. II. 5. Der Faltens-  
mund.

Testa umbilicata, carinata,  
depressoconica, subtus con-  
nexa gibba, aperura qua-  
drangulari, fauce plicata.

Die genabelte, gekielte, flach-  
kegelförmige Schale ist unten  
erhaben rund, und höckerig,  
und inner der viereckigen Mün-  
dung mit Falten besetzt.

*Knor. Vergn. VI. 26. t. 5. f.*

Testa depressa conica. Anfractus  
supra sex, subtus vnicus, gibbus,  
margine acute carinato. Umbili-  
cus centralis, spiralis, peruius.  
Apertura quadrangularis, margine  
reflexo. Fauz prope columellam  
plicata transversa solitaria elonga-  
ta, prope labrum plicis duabus  
marginalibus acutis. Color rufus.

Die Schale ist flachkegelförmig.  
Oben stehen sechs Gewinde, unten  
ein höckeriges, welches mit einer  
scharfen Kiele umgeben ist. Der  
schneckenförmige, tiefe Nabel durch-  
dringt die Mitte. Die Mündung  
viereckig, und eingesäumt. Inner  
derselben steht an der Spindel ein  
einzelne verlängerte Quersalte, am  
Rande der Schalenöffnung aber zwei.  
Von brauner Farbe.

N. II. 6. *Helix obuer-*  
sa.

N. II. 6. Der Flach-  
wirbel.

Testa



Testa imperforata turbinata, anfractibus supra planis, marginato carinatis, columella imperforata.

Die Gewinde der zusammenge-  
gedrückten birnförmigen Scha-  
le, sind oben flach, und an  
der Kiele geändert, die Spin-  
del undurchbohret.

*Gualt. Test. t. 68. f. E.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa turbinata subtus conuexa, supra plana, plicis transversis, & obliquis undique decussata. Anfractus quinque, supra plani, limbo carina marginata cincti. Aper-  
tura transversa, subtus arcuata Co-  
lumbellae labrum tenuissimum, re-  
plicatum, imperforatum. Color  
a bus.

Die Schale ist einigermaßen birn-  
förmig, unten erhabenrund, oben  
flach, mit schief und querlaufenden  
Runzeln besetzt. Die fünf Ge-  
winde sind oben flach, mit einer  
eingesäumten Kiele umgeben. Die  
Mündung steht in die Quere, und  
ist unten gekrümmt. Die Spin-  
delle ist übergeschlagen, sehr dünn  
und undurchbohret. Von weißer  
Farbe.

N. II. 7. Helix torna-  
ta.

N. II. 7. Der gedrehte  
Regel.

Testa subimperforata, tro-  
chiformi, anfractibus imbrici-  
catis, apertura triangulari.

Die kaum durchbohrte trau-  
seltförmige Schale hat ziegelför-  
mig übereinander liegende Ge-  
winde, und eine dreyeckige  
Mündung.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 8. f. 61.*

*Mus. Caes. Vindobon.*



Testa trochiformis. Anfractus sex imbricatum declives, oblique substriati, infimo margine acuto transuersum carinato, subtus connexo. Apertura transuersa, triangularis. Labrum extrorsum marginatum. Columella reflexa, obtegens foramen obsoletum, tenue. Color extus fuscus, faucis niueus.

Die Schale ist trichterförmig. Die sechs ziegelförmig übereinanderliegende Gewinde sind schief gestreift, das untere ist der Quere nach scharf gekielt, unten bäuchig erhaben. Die dreieckige Mündung steht in die Quere. Die Schalenleiste ist auswärts gesäumt. Die übergeschlagene Spindelkeule bedeckt ein unvollkommenes dünnes Nabelloch. Die Farbe ist außen braun, der Schlund schneeweiß.

N. II. 8. *Helix ringens*.

N. II. 8. Das verkehrte Mundstück.

*Linn. Sp. N. Sp. 664.*

Testa subcarinata, imperforata, apertura resupinata, utrinque dentata.

Die einigermaßen gekielte, undurchbohrte Schale hat eine aufwärts gekehrte beiderseits gezähnte Mündung.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 330. 331.*

*List. Hist. Conch. l. I. f. II. f. 100.*

*Argenv. Conch. Pl. 28. f. 13. 14.*

*Berlin. Mag. II. 4. t. 42. f.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

N. II. 9. *Helix finuata*.

N. II. 9. Die ausgeschnittene Schnirkelschnecke.

*Müll.*



Müll. Hist. Verm. Sp. 217.

Testa subcarinata, imperforata, apertura transuersa, undurchbohrte Schale hat eine labro extus triplicato, intus quadridentato. Die einigermaßen gefielte querliegende Mündung, die an der Schalenleiste mit drey, an der Spindelkeule mit vier Zähnen besetzt ist.

List. Hist. Conch. l. I. f. 99.

Mus. Caes. Vindobon.

N. II. 10. Helix Carocolla.

N. II. 10. Die Bastardlampe.

Linn. S. N. Sp. 665.

Gall. La Lampe antique. Argenv.

Testa carinata, imperforata, utrinque conuexa.

Die gefielte undurchbohrte Schale ist beiderseits erhabenrund.

List. Hist. Conch. l. I. f. 10. f. 87.

Argenv. Conch. Pl. 8. f. D.

Mus. Caes. Vindobon.

N. II. 11.





N. II. 11. *Helix Cornu militare.*

N. II. 11. Die Kar-  
falschnecke.

*Linn. S. N. Sp. 666.*

Belg. Karkal.

Testa subearinata, imper-  
forata, conuexa, apertura  
patula, emarginata.

Die einigermaßen gekielte  
undurchbohrte runderhabene  
Schale hat eine erweiterte,  
eingesäumte Mündung.

Niuea, futuris emarginatis,

Schneeweiß, mit getänderten  
Gewinden.

*Gualt. Test. t. 3. f. 7.*

*Knor. Vergn. VI. 32. t. 2. f.*

N. II. 12. *Helix macu-  
lata.*

N. II. 12. Der gefleck-  
te Schnirkel.

Testa perforata, subearinata,  
depressa, oblique striata, sub-  
tus conuexa.

Die etwas gekielte und fla-  
che Schale ist schief gestreift,  
und unten runderhaben.

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa



Testa rotundata depressa, subtu-  
sonuexa. Anfractus sex, teretes,  
oblique striati, extus obsolete ca-  
rinati. Apertura lunata. Labrum  
marginatum. Columella perforata.  
Color albidus, maculis latis disfor-  
mibus fulvis.

Die rundliche etwas flache Schale  
ist unten erhabenrund. Die sechs  
runde schief gestreifte Gewinde sind  
etnigermassen gekielet. Die Mün-  
dung mondförmig. Die Schalen-  
lesze gesäumt. Die Spindel durch-  
bohret. Von weißer Farbe mit  
breiten unformigen rothgelben Fle-  
cken.

## N. II. 13. *Helix punctata*.

## N. II. 13. Der punk- tirte Zahnwübel.

Testa subcarinata, rotunda-  
ta, subperforata, labio increas-  
sato sinuato, labro tridentato.

Die stumpffüßige, rundliche,  
fast undurchbohrte Schale hat  
eine verdickte ausgeschnittene  
Spindellesze, wie drey Zäh-  
nen an der Schalenlesze.

## *Mus. Caes. Vindobon.*

Testa rotundata, subcompressa.  
Anfractus quinque conuexi, infimus  
carina obsolete cinctus. Apertura  
transuersa, oblonga. Labri margo in-  
crassatus, antice sinuatus. Labrum  
marginatum denticulis obtusis, mar-  
ginalibus, tribus. Columella forami-  
ne tenui subobtectio. Color fuscus,  
cingulo dorsali tenui, punctisque  
circa suturam radiantibus luteis.  
Apertura rubescens,

Die rundliche, etwas zusammen-  
gedrückte Schale hat fünf rund er-  
habene Gewinde, deren äußeres  
mit einem unvollkommenen Riele  
umgeben ist. Die längliche Mün-  
dung steht in die Quere. Die Spin-  
dellesze hat einen verdickten, vorne  
ausgeschnittenen Rand. Die Scha-  
lenlesze ist gesäumt und am Ran-  
de mit drey stumpfen Zähnen be-  
setzt. Die Spindel hat ein dün-  
nes bennabe gedektes Nabelloch.  
Die Farbe braun, mit einer schma-  
len Querbände um den Rücken,  
und nach der Naht strahlförmig  
stehenden Punkten von hellgelber  
Farbe. Die Mündung ist rötlich.

## N. III.



N. III. Umbilicatae, anfractibus  
rotundis.

N. III. Genabelte, mit runden  
Gewinden.

N. III. 1. Helix cor-  
nea.

N. III. 1. Das Walde-  
horn.

Linn. S. N. Sp. 671.

Belg. Europäische Post-hoorn. Angl. Great River Cheese-Shell.  
Petiv. Gall. Le grande Planorbe. Geof.

Testa umbilicata plana, an-  
fractibus quatuor teretibus.

Die genabelte flache Scha-  
le hat vier runde Gewinde.

List. angl. t. 2. f. 26.

Bonan. Recr. cl. 3. f. 316.

List. Hist. Conch. l. 2. p. 1. f. 40.

Petiv. Gaz. t. 92. f. 5.

Gualt. Test. t. 4. f. DD.

Gev. Belust. 3. t. 18. 19. f.

Seb. Thes. III. t. 39. f. 17.

Argenv. Conch. Pl. t. 27. f. 8.

Ginan. adr. II. t. 2. f. 12.

Berlin. Mag. IV. 8. t. 17. f.

Knor. Vergn. V. 22. t. 6. f.

Da Cost. Elem. Pl. 3. f. 10.

N. III. 2. Helix poly-  
gyrata.

N. III. 2. Die Schnir-  
felscheibe.

Testa



Testa orbiculata, supra plana, subtus concava, anfractibus teretibus decem,

Die schelbenförmige und unten hohle Schale besteht aus zehn runden Gewinden,

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa orbiculata. Supra plana, subtus concava. Anfractus decem teretes tenuissime oblique striati. Apertura rotundato oblonga. Labrum emarginatum. Color lutescens, fascia transversa fulva.

Die Schale ist schelbenförmig, oben flach, unten hohl. Die zehn runden Gewinde sind sehr fein schief gestreift. Die Mündung ist länglicht rund. Die Schalenfuge gesäumt. Von gelblicher Schale, mit einer rothgelben Querbinde.

N. III. 3. *Helix Cornuarietis.*

N. III. 3. Das Widderhorn.

*Linn. S. N. Sp. 674.*

*Belg. Rams-Hoorn. Angl. Great girdled Brasile cheese Shell. Petiv.*

Testa umbilicata, planiusculo, anfractibus teretibus senis, apertura ovali.

Die genabelte, etwas flache Schale hat sechs runde Gewinde, und eine eysförmige Mündung.

*Nivea, fasciis transversis rufis.*

Schneeweiß, mit braunrothen Querbinden.



*Petiv. Gaz. t. 92. f. 4.*

*Seb. Thes. III. t. 39. f. 14 — 15.*

*Klein. Meth. Ostr. t. 1. f. 7.*

*Gev. Belust. 3 t. 12. 13. f.*

*Knor. Vergn. I. 2. t. 4. 5. f.*

N. III. 4. *Helix ampul-  
lacea.*

N. III. 4. Die Schlamms-  
schnecke.

*Linn. s. N. Sp. 676.*

*Belg. Slyk - Slek. Angl. Smooth girdled Snail - Shell. Petiv.*

*Testa perforata, subglobosa,  
anfractibus teretibus, prope su-  
turam complanatis; apertura  
oblonga.*

Die durchbohrte kugelförmige Schale hat runde an der Naht plattgedrückte Windungen, mit einer länglichen Mündung.

*Rumph. amb. t. 27. f. Q.*

*Petiv. amb. t. 12. f. 14.*

*Gualt. Test. t. 1. f. R.*

*Seb. Thes. III. t. 38. f. 1 — 7. 58. 59.*

*Gev. Belust. 27. t. 289. 291. f.*

*Berlin. Mag. III. 6. t. 68. f.*

*Knor. Vergn. V. 5. t. 2. f.*





N. III. 5. *Helix Pomatia*.

N. III. 5. Die gemeine Weinbergsschnecke.

*Linn. S. N. Sp. 677.*

*Belg.* Wyngards - Slak. *Angl.* Wine - Gard Snail. *Gall.* Le Vigneron. *Geof.*

Testa perforata subglobosa, Die durchbohrte einiger  
fasciis transuersis obsoletis, maßen kugelförmige Schael  
apertura rotundato lunata, hat undeutliche Querbinden,  
mit einer rundlichen mondför-  
migen Mündung.

*Bonon. Recr. cl. 3. f. 316.*

*List. angl. t. 2. f. I.*

— *Hist. Conch. l. I. f. 46.*

*Gualt. Test. t. I. f. A.*

*Argenv. Conch. Pl. 28. f. I.*

— *Zoom. Pl. 9. f. 4.*

*Gev. Belust. 29. t. 330 — 342. f.*

*Berlin. Mag. II. I. t. I. f.*

*Schroet. Erdk. I. t. 10. f.*

N. III. 6. *Helix Pomaria*.

N. III. 6. Die linksge-  
wundene Weinbergsschnecke.



Müll. Hist. Verm. Sp. 244.

Testa perforata, subglobosa, sinistrosa, rufescente, fasciis transuersis obsoletis.

Die durchbohrte, einigermaßen kugelförmige, links gewundene Schale ist von braunschlicher Farbe, mit matten Querbändern.

Mus. Caes. Vindobon.

N. III. 7. Helix cretaea.

N. III. 7. Die Kreidschnecke.

Müll. Hist. Verm. (nemoralis) Sp. 157.

Testa perforata subglobosa, laeui, albida, fasciis transuersis fuscis.

Die durchbohrte einigermaßen kugelförmige glatte Schale ist von weißlicher Farbe mit braunen Querbändern.

Mus. Caes. Vindobon.

N. III. 8. Helix glauca.

N. III. 8. Das Kuhauge.

Linn. S. N. Sp. 678.

Testa umbilicata, subrotunda, acuminata; labro marginato, apertura ovali.

Die genabelte, rundlichte spizwirlige Schale hat an der eyförmigen Mündung eine gesäumte Schalenleiste.

Seb.



*Seb. Thes. III. t. 38. f. 8.*

*Gev. Belust. 3. t. 20. f.*

*Knor. Vogn. V. 5. t. 5. f.*

N. III. 9. *Helix citrina*,

N. III. 9. Die Nabelschnecke.

*Linn. S. N. Sp. 679.*

*Belg. Navel-Slak.*

Testa perforata rotundata, compressa, laevi, fascia transuersa diuersicolore,

Die durchbohrte rundlichte flachgedrückte glatte Schale ist mit einem gefärbten Bande umgeben.

$\alpha$  subpellucida, pallide sulphurea, fasciis duabus opacis niveis, suprema tenuiore,

$\alpha$  halbdurchsichtig, blaßschwefelgelb mit zwey schneeweißen Bändern, davon das obere schmale riss.

*Gev. Belust. . 26. t 285. f.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

$\beta$  lactea, fascia dorsali rufa, niveae opacae superne contiguous.

$\beta$  schneeweiß mit einem rothbraunen Querbände, unter welchem nahe eine schneeweiße undurchsichtige Binde liegt.

*Mus. Caes. Vindobon.*



♂ butyracea, spira apice & fascia ♂ butterfarbig, mit einer rothfarbigen  
dorsali ferrugineis. Schnirkelspitze, und Querbande  
an den Rücken.

*Gualt. Test. t. 2. f. D.*

*Argenv. Conch. Pl. 28. f. 10.*

*Seb. Thes. III. t. 39. f. 1 — 6.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

♀ ferruginea, fascia dorsali alba. ♂ rothfarbig, mit einer weißen  
Querbinde.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 1. f. 57.*

*Gualt. Test. t. 3. f. E.*

*Gev. Belust. 26 t. 277 f.*

*Knor. Vergn. V. 22. t. 7. f.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

N. III. 10. *Helix zona-* N. III. 10. Die Gürtel-  
ria, schnecke.

*Linn. S. N. Sp. 681.*

*Belg. Gebandeerde Post-hoorn. Gall. Cornet de Postilon bandé.*

Testa



Testa umbilicata, depressa, Die genabelte flache Schale  
 apertura transuersa, labro hat an der querliegenden Mün-  
 candido reflexo. dung eine weiße übergeschlagene  
 Schalenleffe.

α alba, undis niueis, fasciis trans- α weiß, mit schneeweißen Wellen,  
 ueris tribus rufis, infima latio- und drey rothbraunen Querbän-  
 re. den, davon die untere schmäler ist.

β alba, fasciis octo inaequalibus ru- β weiß, mit acht ungleich breiten  
 fis. rothbraunen Querbändern.

*List. Hist. Conch. l. 1. f. 72.*

*Gualt. Test. t. 3. f. L.*

*Seb. Thes. III. t. 40. f. 52. 53. 55.*

*Knor. Verg. V. 21. t. 3. 4. f.*

N. III. 11. Helix Vol-  
 uulus.

N. III. 11. Das Wir-  
 belhorn.

*Müll. Hist. Verm. Sp. 280.*

Testa trochiformi, umbilica- Die kräuselartige genabelte  
 ta, mucronata; apertura ro- spizwirlbige Schale hat an der  
 tunda, labro reflexo. runden Mündung eine überge-  
 schlagene Schalenleffe.

*Petiv. Gaz. t. 77. f. 6.*

*Seb. Thes. III. t. 40. f. 18. 19.*





N. III. 12. *Helix un-*  
*gulina.*

N. III. 12. Das Schlan-  
genhorn.

*Linn. S. N. Sp. 682.*

*Belg. Slangetje. Rumph. Angl. Thick-lipt Cake-Shell. Pet. Gall.*  
*Cornet de Chasseur. Dav.*

Testa utrinque umbilicata,  
subglobosa, apertura lunata,  
labro reflexo albo.

Die beiderseits genabelte, ei-  
nigermassen kegelförmige Scha-  
le hat an der mondformigen  
Mündung eine übergeschlagene  
weiße Schalenleffe.

*Basıs obtuse carinata.*

Der Grund hat eine stumpfe  
Querleiste.

*Rumph. amb. t. 27 f. R.*

*Petiv. amb. t. 12. f. 13.*

*Klein. Meth. Ostr. t. I. f. II.*

*Gev. Belust. 7. t. 7. f.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

N. III. 13. *Helix Pi-*  
*leus.*

N. III. 13. Der Huth-  
schirke.

*Müll. Hist. Verm. Sp. 277.*

Testa perforata, conica, alba;  
fasciis transuersis rufis, aper-  
tura transuersa, labro reflexo.

Die durchbohrte kegelförmige  
weiße Schale ist mit roth-  
braunen Querbändern umge-  
ben, und an der querliegen-  
den Mündung mit einer überge-  
schlagenen Schalenleffe versehen.

*Mus. Caes. Vindobon.*

N. III. 13.



N. III. 14. *Helix mam-*  
*millaris.*

N. III. 14. Der War-  
zenschnirkel.

*Linn. S. N. Sp. 685.*

Testa umbilicata, ouata;  
apertura oblonga, apici ad-  
nata.

Die genabelte eiförmige  
Schale hat eine länglichte mit  
der Schnirkelspitze verwachsene  
Mündung.

*List. Hist. Conch. l. 2. f. 36.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

N. III. 15. *Helix per-*  
*uerfa.*

N. III. 15. Der verkehr-  
te Schnirkel.

*Linn. S. N. Sp. 688.*

*Belg. Top - Slak. Gall. L' Unique.*

Testa subperforata, ouato  
oblonga, sinistrorsa, labro  
reflexo albo.

Die einigermaßen durchbohr-  
te, länglichte eiförmige links-  
gewundene Schale, hat eine  
übergeschlagene weiße Schalen-  
leiste.

« aurantia, linea longitudinali una  
alteraue purpurea.

« orangengelb, mit einer, oder  
mehrern nach der Länge herablau-  
fenden purpurrothen Linien.



*Bonan. Recr. el. 3. f. 116.*

*List. Hist. Conch. l. 1. f. 33.*

*Gualt. Test. t. 5. f. P.*

*Argenv. Conch. Pl. 9. f. G. interior.*

*Seb. Tbes. III. t. 40. f. 37.*

*Berlin. Mag. III. 28. t. 4. 5. f.*

β viridis, fasciis citrinis.

β grün, mit zitronengelben Bändern.

*List. Hist. Conch. l. 1. f. 34.*

*Gualt. Test. t. 5. f. P.*

*Knor. Vergn. V. 23. t. 4. f.*

γ alba, maculis longitudinalibus rufis.

γ weiß, mit nach der Länge herablaufenden rothbraunen Flecken.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 8. f. 64.*

*Petr. Gaz. t. 76. f. 5.*

*Gualt. Test. t. 5. f. O.*

*Knor. Vergn. V. 23. t. 5. f.*

N. III. 16. *Helix janthina.*

N. III. 16. Die blane Schnirkelschnecke.

Linn.



*Linn. S. N. Sp.* 689.

*Belg. Kwallen - Bootje.*

*Testa subimperforata sub-* Die einigermaßen genabelte  
*rotunda, obtusa, fragili, apertu-* fast runde, stumpfwirblige, dün-  
*ra dilatata, labro marginato.* ne Schale hat eine erweiterte  
 Mündung, mit einer überge-  
 schlagenen Schalenleiste.

*Rumph. amb. t.* 20. f. 2.

*Gualt. Test. t.* 64. f. 0.

*Berlin. Magaz. II.* 2. t. 2. f.

*Knor. Vergn. II.* 30. t. 2, 3. f.

*N. III. 17. Helix viui-*  
*para.*

*N. III. 17. Die leben-*  
*dig gebährende Schnirkel-*  
*schnecke.*

*Linn. S. N. Sp.* 690.

*Testa subimperforata, ouato* Die einigermaßen durchbohr-  
*oblonga, ventricosa, fasciis* te länglichte eysförmige bäuchi-  
*transuersis fuscis; apertura* ge Schale hat braune Quer-  
*rotunda.* bänder, und eine runde Mündung.

*List. angl. t.* 2. f. 18.

— *Hist. Conch. l.* 2. f. 26.



*Petiv. Gaz. t. 99. f. 16.*

*Gualt. Test. t. 5. f. A.*

*Argenv. Zoom. Pl. 8. f. 2.*

*Seb. Thes. III. t. 93. f. 34.*

*Ginan. adr. II. t. 2. f. 8.*

*Berlin. Mag. IV. 7. t. 4—9. f.*

*Müll. Linn. Naturf. VI. 1. B. 18. t. 4. f.*

N. III. 18. *Helix vi-*  
*trea.*

N. III. 18. Der Glas-  
schirkel.

Testa subimperfiorata ouata,  
subpellucida, ventricosa, spi-  
rae anfractibus carinatis.

Die einigermaßen durchbohr-  
te eysförmige, halbdurchsichti-  
ge Schale hat keilsförmig erha-  
bene Schirkelgewinde.

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa ouata, fragilissima, sub-  
pellucida, laevis. Anfractus quin-  
que, infimus ventricosus, conue-  
xus; superiores spirales carinati.  
Apertura ouato oblonga. Columel-  
la perforata, foramine tenui subob-  
tecto. Color luteo fuscus; fasciis  
longitudinalibus undulatis sulphu-  
reis.

Die Schale ist eysförmig und sehr  
gebrechlich, halbdurchsichtig und  
glatt. Sie bestehet aus fünf Ge-  
winden, davon das unterste häu-  
sig, und runderhaben, die oberen  
aber, welche den Schirkel bilden,  
keilsförmig erhaben sind. Die Mün-  
dung ist länglicht eysförmig; Die  
Spindel durchbohret, mit einem  
dünnen halbgedeckten Nabelloch. Von  
gelblich brauner Farbe mit nach  
der Länge herablaufenden wellen-  
förmigen schwefelgelben Bändern.

N. IV.





N. IV. Rodundatae, imperforatae.

N. IV. Rundlichte, undurchbohrte.

N. IV. I. *Helix nemoralis*.

N. IV. I. Die Waldschnecke.

*Linn. S. N. Sp. 691.*

*Testa imperforata, rotundata, labro fusco.*

Die undurchbohrte rundlichte Schale hat eine braune Mündung.

$\alpha$  lutea unicolor.

$\alpha$  gelb, einfärbig.

*List. Hist. Conch. l. I. f. 54.*

*Petiv. Gaz. t. 91. f. 9.*

*Gev. Belust. 32. t. 398. f.*

$\beta$  lutea, fascia transversa fusca.

$\beta$  gelb mit einer rothbraunen Quersbinde.

*Petiv. Gaz. t. 91. f. 10.*

*Gualt. Test. t. 2. f. D.*

*Sep. Thes. III. t. 39. f. 18.*

*Gev. Belust. 32. t. 403. f.*

*Schroet. Erdk. 2. t. 38. f.*

$\gamma$  lutea, fasciis tribus fuscis, infima & media latissima.

$\gamma$  gelb, mit drey braunen Quersbinden, davon die unterste und mittlere die breitesten sind.

Gev,



*Gev. Belust. 32. t. 407. f.*

♂ lutea, fasciis quatuor fuscis.

♂ gelb, mit vier braunen Querbändern.

*Gev. Belust. 32. t. 408 f.*

*Berlin Magaz. II. 3. t. 30. f.*

*Schlott. Aët. helv. V. 3. t. 9. f.*

♀ lutea, fasciis quatuor fuscis, inferioribus subaequalibus, suprema angustiore.

♀ gelb, mit vier braunen Querbändern, davon die oberste schmäler, die unteren gleichbreit sind.

*Berlin. Mag. II. 3. t. 27. 28. 29. f.*

*Schlott. Aët. helv. V. 3. t. 2. 3. f.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

♂ lutea, fasciis quinque fuscis, sursum decrescentibus.

♂ gelb, mit fünf braunen Querbändern.

*Seb. Thes. III. t. 39. f. 12.*

*Gualt. Test. t. 2. f. F.*

*Berlin. Mag. II. 3. t. 31. 32. f.*

*Schlott. Aët. helv. V. 3. t. 10. f.*

*Schroet. Erakonch. I. t. 17. f.*

η rosea,



η rosea, fasciis quinque transuer- η rosenroth, mit fünf braunen  
sis fuscis, binis, infimis latiori- Querbändern.  
bus.

*Mus. Caes. Vindobon.*

N. IV. 2. *Helix hortensis.*

N. IV. 2. Die Gartenschnecke.

Testa imperforata, subglobosa, labro albo.

Die undurchbohrte rundliche Schale, hat eine weiße Mündung.

Lutea, fasciis quinque transuer-  
sis fuscis, sursum decrescentibus.

Gelb, mit fünf braunen Querbändern, davon die oberen schmaler sind.

*Gev. Belust. 31. t. 374. 375. f.*

N. IV. 3. *Helix picta.*

N. IV. 3. Die gemalte Schnirkelschnecke.

Testa imperforata, subglobosa, obtusa, laeui, columella anfractuuumque marginibus coloratis.

Die undurchbohrte rundlichte glatte Schale, ist an der Spindel, und an dem Rande der Gewinde gefärbet.

Testa subglobosa, laevis. Anfractus quatuor conuexi, infimus ventricosus, spirales obtusi, complanati. Apertura lunata. Columella spiralis, patens.

Die Schale ist einigermaßen kugelförmig, und glatt. Die vier Gewinde sind erhabenrund, davon das unterste bäuchig, die aber den Schnirkel ausmachen, stumpf und flach gedrückt sind. Die Mündung ist mondformig. Die Spindel schnirkelförmig und offen.

α gri-



♂ grisea, columella lineaque futu- ♂ lichtgrau, mit brauner Spindel,  
rali & transuersa dorſi fusca. und einer braunen Querlinie  
nachst der Naht, und um die  
Mitte des Rückens.

*Mus. Caes., Vindobon.*

♂ rosea, columella lineaque futu- ♂ rosenroth, mit brauner Spindel,  
rali & transuersa dorſi fusca. und einer braunen Querlinie  
nachst der Naht, und um die  
Mitte des Rückens.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 5.*

*Knor. Vergn. I. 10. t. 2. f.*

γ sulphurea, columella lineaque γ schwefelgelb, mit brauner Spin-  
futrali anfractuum rubra. del, und rothen Linie an den  
Bändern der Gewinde.

*Mus. Caes. Vindobon.*

N. IV. 4. *Helix verli-*  
*color.*

N. IV. 4. Die bunte  
Schnirkelschnecke.

Testa imperforata subglobo-  
sa niuea, columella rosea, li-  
neis transuersis fasciisque in-  
termediis discoloribus.

Die undurchbohrte, rundlich-  
te Schale hat eine rothe Spin-  
del, dünne Querlinien, mit  
dazwischen liegenden Bändern  
von verschiedenen Farben.

*Mus. Caes. Vindobon.*



Testa subglobosa laevis. Anfractus convexi, infimus ventricosus, spirales obtusi. Apertura lunata. Columella spiralis, imperforata. Color niveus, lineis transversis parallelis fuscis, fasciisque intermediis sulphureis, roseisque; columella rosea.

Die Schale ist rundlich, und glatt. Die sechs gewinde sind erhabenrund, das unterste bäuchig, die den Schnirkel bilden stumpf. Die Mündung ist eyförmig. Die Spindel schnirkelförmig, unurchbohret. Von schneeweißer Farbe mit braunen gleichweitstehenden Quertlinien, mit safrangelben, und rosenrothen Zwischenbändern. Die Spindel ist rosenroth.

N. IV. 5. *Helix aperta*.

N. IV. 5. Die offene Schnirkelschnecke.

Testa imperforata, subglobosa, spira obtusa, minima, columella spirali aperta.

Die undurchbohrte rundliche Schale hat einen stumpfen kleinen Schnirkel, und eine schnirkelförmige offene Spindel.

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa subglobosa, tenuis, longitudinaliter obsolete striata. Anfractus tres, infimus ventricosus, superiores spirales obtusi, breves, complanati. Apertura lunata. Columella imperforata, spiralis, aperta. Color fuscus.

Die Schale ist einigermaßen kegelförmig, dünn, und nach der Länge sehr fein gestreift. Sie bestehet aus drey Gewinden, davon das unterste bäuchig, die oberen Schnirkelgewinde aber stumpf, kurz, und flach gedrückt sind. Die Mündung ist mondformig. Die Spindel undurchbohret, schnirkelförmig, und offen. Die Farbe braun.

N. IV, 6.





N. IV. 6. *Helix Haemastragus*.

N. IV. 6. Das Blut-  
ohr.

Testa conuexo trochiformi, castanea, fascia transversa alba; apertura transversim elongata rosea.

Die runderhabene kräuselförmige kastanienbraune Schale hat ein weißes Querband und eine querliegende länglichte rosenrothe Mündung.

*List. Hist. Conch.* l. 2. f. 3.

*Seb. Thes.* III. t. 40. f. 6. 7.

*Gev. Belust.* 28. t. 328. 329. f.

Testa trochiformis. Anfractus quinque conuexi, uniformiter de crescentes, & eleuati in spiram conicam obtusam. Suturae contiguae crenulatae. Apertura transversim elongata auriformis. Columella imperforata complanata. Color castaneus, fascia infra medium dorsi transversa alba. Apertura, & spirae apex rosea.

Die Schale ist kegelförmig. Die fünf Gewinde sind erhabenrund, und nehmen gleichförmig ab in einen kegelförmigen Schnirkel. Die Nuthen sind an einander verwachsen und gekerbet. Die Mündung ist in die Quere verlängert und ohrförmig. Die Spindel undurchbohret und flach. Von kastanienbrauner Farbe, mit einem weißen Querbande unter der Mitte des Rückens. Die Mündung und die Schnirkelspitze sind rosenroth.

N. IV. 7. *Helix Melanotragus*.

N. IV. 7. Das Schwarz-  
ohr.

Testa



Testa convexa, trochiformi, castanea, fasciis duabus transversis niueis; apertura transversim elongata nigra.

Die runderhabene kauselförmige kastanienbraune Schale hat zwey schneeweiße Querbänder und eine in die Quere verlängerte schwarze Mündung.

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa simillima priori: parum depressior, castanea, fascia transversa niuea, prope futuram tenui, lata vero infra medium dorsi. Apertura ex fusco nigra.

Die Schale ist der vorhergehenden am ähnlichsten: nur etwas flacher, von kastanienbrauner Farbe, mit zwey schneeweißen Querbändern, davon das schwälere nächst der Naht, das breite aber unter der Mitte des Rückens liegt. Die Mündung schwarzbraun.

N. V. Turritae.

N. V. Gethürmte.

N. V. I. Helix decollata.

N. V. I. Die abgestuzte Schnirkelnadel.

*Linn. S. N. Sp. 695.*

Testa turrita, subperforata; vertice obtuse truncato, apertura ovata-

Die gethürmte, einigermaßen durchbohrte Schale hat eine stumpf abgestuzte Schnirkelspize; mit einer eysförmigen Mündung.



*Bonan. Recr. cl. 3. f. 56.*

*List. Hist. Conch. l. I. f. I. f. 12.*

*Petiv. Gaz. t. 66. f. I.*

*Gualt. Test. t. 4. f. O. P. Q.*

*Argenv. Conch. Pl. 27. f. 5.*

*Knor. Vergn. VI. 12. t. 3. f.*

*Murr. Fund. Test. t. I. f. 3.*

N. V. 2. *Helix calca-*  
*rea.*

N. V. 2. Die Marmor-  
nadel.

Testa turrita, longitudinali-  
ter striata, alba; anfractibus  
decem, apertura ovata.

Die gethürmte nach der Län-  
ge feingestreifte weiße Schale  
hat eine stumpf abgestuzte  
Schnirkelspize mit einer eyför-  
migen Mündung.

*List. Hist. Conch. l. I. f. I. f. 9.*

*Gualt. Test. t. 6. f. J.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa priori simillima: at triplo  
major, nitens, longitudinaliter te-  
nuissime striata. Anfractus decem,  
teretes, vniformiter decrescetes.

Die Schale ist der vorigen am  
ähnlichsten: aber dreyimal größer,  
glatt, und nach der Länge sehr  
fein gestreift. Die zehn Gewinde  
Aper-



Apertura ovata. Columella torta, sind rund, und nehmen gleichförmig ab. Die Mündung ist eiförmig. Die Spindel gedreht, und mit einer ausgebreiteten dünnen Leiste gedeckt. Von weißer Farbe.

An prioris varietas perfecta?

Vielleicht eine vollkommene Abänderung der vorigen Art.

N. V. 3. *Helix plicata*.

N. V. 3. Die gefaltene Schnirkelnadel.

Testa subulata, anfractibus plicis longitudinalibus coronatis.

Die ahlförmige Schale ist an den Gewinden mit erhabenen nach der Länge herablaufenden Falten gekrönt.

Gualt. Test. t. 6. f. H.

Berlin. Magaz. IV. 10. t. 51. f.

Mus. Caes. Vindobon.

Testa subulata subpellucida. Anfractus decem convexi, prope futuram superiorem plicis elevatis longitudinalibus coronati. Apertura ovata. Columella elabiata.

Die Schale ist ahlförmig und halb durchsichtig. Die zehn Gewinde sind erhabenrund, und an der obern Naht mit nach der Länge herablaufenden Falten gekrönt. Die Mündung ist eiförmig. Die Spindel ohne Leiste.



N. V. 4. *Helix maculata*.

N. V. 4. Die gefleckte Schnirkelnadel.

Testa subulata laeui, picta undis longitudinalibus rufis.

Die ahlförmige glatte Schale ist mit nach der Länge herablaufenden rothbraunen Wellen bemalet.

Gualt. Test. t. 6. f. G.

Mus. Caes. Vindobon.

Testa subulata, laevis, striis transversis subtilissimis circumdata. Anfractus circiter duodecim conuexi. Apertura ovata. Labium laeve. Color pallidus, fasciis undularis longitudinalibus rufis.

Die Schale ist ahlförmig und glatt, mit sehr feinen Quersstreifen umgeben. Die Gewinde deren beyläufig zwölf, sind erhaben und Die Mündung eiförmig. Die Spindelstelle glatt. Von bloßer Farbe mit nach der Länge laufenden rothbraunen Wellen bemalet.

N. V. 5. *Helix fusca*ius.

N. V. 5. Die braune Schnirkelnadel.

Testa subulata laeui, anfractibus teretibus,

Die ahlförmige glatte braune Schale hat flachrunde Gewinde.

Liszt. Hist. Conch. l. 2. f. 10.

Gualt. Test. t. 6. f. E.

Mus. Caes. Vindobon.

Testa





Testa subulata laevis, transuersim  
subtilissime striata, Anfractus de-  
cem teretes. Apertura ouata. La-  
bium laeue. Faux cinerea. Color  
ex luteo fuscus.

Die Schale ist eysförmig und  
glatt, in die Quere sehr fein ge-  
streift. Die zehn Gewinde sind  
flachrund. Die Mündung eysfö-  
rmig. Die Spindelstelle ist glatt.  
Der Schlund aschengrau. Die Scha-  
le außen gelblichbraun.

N. VI. Ouatae, imperforatae.

N. IV. Eysförmige, undurchbohrte,

N. VI. 1. Helix Ama-  
rula.

N. VI. 1. Die Fluß-  
Papstkrone.

Linn. S. N. Sp. 702.

Belg. Rivier Pause - Kroon, Rumph. Angl. River - Mitter - Shell.  
Petiv. Gall. La tiare fluviale. Dav.

Testa ouata imperforata, ni-  
gra; anfractibus sursum spino-  
so. dentatis.

Die eysförmige undurchbohr-  
te schwarze Schale ist oben an  
den Gewinden mit zahnsförmig-  
en Stacheln besetzt.

Dorsum notatum cicatricibus oua-  
libus, margine albo cinctis, quem-  
admodum Nerita pulligera.

Der Rücken ist nach Art der  
bruttragenden Schwimmschnecken,  
mit eysförmigen Narben besetzt, die  
mit einem weißen Saume eingefaßt  
sind.

List. Hist. Conch. l. 2. p. 1. f. 33.

Rumph. amb. t. 33. f. F. F.



*Petiv. amb. t. 4. f. 3.*

*Gualt. Test. t. 6. f. B*

*Argenv. Conch. Pl. 27. f. post 6tam.*

*Seb. Thes. III. t. 53. f. 24. 25.*

*Berlin. Magaz. IV. 9. t. 38. f.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

N. VI. 2. *Helix stagna-*  
lis.

N. IV. 2. Das Teichs-  
horn.

*Linn. S. N. Sp. 703.*

Testa ovato subulata, im-  
perforata, subangulata, ven-  
tricosa; apertura ovata.

Die eysförmige ahlförmig zu-  
gespizte Schale ist bäuchig und  
etwas eckig, mit einer eysförm-  
igen Mündung.

*List. angl. t. 2. f. 21.*

—— *Hist. Conch. l. 4. p. 1. f. 21.*

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 55.*

*Gualt. Test. t. 5. f. 7.*

*Argenv. Conch. Pl. t. 27. f. 6.*

—— *Zoom. Pl. 8. f. 5.*

*Seb. Thes. III. t. 39. f. 41 — 46. 52. 53.*

*Klein. Meth. Ostr. t. 3. f. 69.*

*Slotterb. Aët. helv. V. t. 3 f. 25. 26.*

Ginan.



*Ginan. adr. II. p. 2. t. 1. f. A. B. C.*

*Berlin. Mag. IV. 9. t. 33. 35. 36. f.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

N. VI. 3. *Helix auricularia.*

N. VI. 3. Das Ohrhorn.

*Linn. S. N. Sp. 708.*

*Gall. La Conque spherique.*

Testa subimperforata ampullacea, spira mucronata breui, apertura ampliata.

Die undurchbohrte aufgeblasene Schale hat kurze, verdünnte Schnirkelspitze, und eine weite Mündung.

*List. angl. t. 2. f. 23.*

—— *Hist. Conch. l. 1. p. 1. f. 23.*

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 54.*

*Gualt. Test. t. 5. f. F. G.*

*Argenv. Conch. Pl. 27. f. 7.; Pl. 28. f. 22.*

*Schlott. Act. helv. V. 3. t. 27. 28.*

*Ginan. adr. II. p. 2. t. 1. f. 3.*

*Berlin. Mag. III. 5. t. 66. f.*

—— ——— *IV. 11. t. 59. f.*

*Schroet. Erdk. I t. 3 f.*

*Murr. Fund. Test. t. 1. f. 4.*

*Mus. Caes. Vindobon.*



N. VI. 4. *Helix solidida*.

N. VI. 4. Die dickschalige Schnirkelichnecke.

Testa ovato oblonga, imperforata solida, glabra; anfractibus conuexis, columella incrassata.

Die eysförmig länglichte und durchbohrte Schale ist dicht und glatt, mit erhabenrunden Gewinden, und einer verdickten Spindel.

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa oblonga, solida, glabra. Anfractus sex conuexi, continui. Apertura rotundato oblonga. Columella imperforata, labio incrassato, breui. Color roseus, lineis transuersis tenuissimis rubro alboque articulatis.

Die Schale ist länglicht, dicht, und glatt. Die sechs Gewinde sind an einander verwachsen, und erhabenrund. Die Spindel ist undurchbohret, mit einer verdickten Lefze. Von rosenrother Farbe, mit sehr feinen roth und weiß unterbrochenen Querlinien.

N. VI. 5. *Helix halioidea*.

N. VI. 5. Die Milchschale.

Linn. S. N. Sp. 713.

Belg. Witte Oor-Schulp. Angl. White Ear. Pet. Gall. Oreille de Venus. Dav.

Testa



Testa elliptica, complanata, imperforata; apertura ad apicem usque hiante.

Die elliptische, plattgedrückte undurchbohrte Schale hat eine bis in die innerste Wirbelspitze offene Mündung.

*Liss. Hist. Conch. l. 4. f. 5. f. 21.*

*Petiv. amb. t. 16. f. 29.*

*Rumph. amb. t. 40. f. R.*

*Gualt. Test. t. 69. f. F.*

*Argenv. Conch. Pl. 5. f. C.*

*Adans. Seneg. Pl. 2. f. 2.*

*Klein. Meth. Ostr. t. 7. f. 114.*

*Knor. Vergn. VI. 39. t. 5. f.*

*Mart. Conch. Kab. I. 15. t. 151. 152. f.*

*Da Cost. Elem. Pl. 3. f. 8.*

N. VI. 6. *Helix ambigua.*

*Linn. S. N. Sp. 714.*

N. VI. 6. Der Halbmond.

Testa subimperforata, rotundata, solida; apertura semiorbiculari; labio incrassato.

Die undurchbohrte, runde, dichte Schale hat eine halbrunde Mündung mit einer verdickten Spindellese.

*Labium citrinum.*

Die Spindellese ist zitrongelb.





*List. Hist. Conch. l. 4. f. 5. f. 39. 40.*

*Adans. Seneg. Pl. I. f. 6. 7.*

*Gev. Belust. 28. t. 319. 320. f.*

*Knor. Vergn. VI. 23. t. 5. 6. f.*

## O. Nerita.

## O. Die Schwimmschnecke.

*Linn. Syst. Nat. Gen. 329.*

Testa spiralis. Aper-  
turae labio transverso pla-  
niusculo.

Die Schale ist schnecken-  
förmig. Die Mündung  
hat eine flachgedrückte  
querliegende Spindelform.

O. I. Umbilicatae.

O. I. Genabelte.

O. I. I. Nerita Can-  
rena.

O. I. I. Der Knoten-  
nabel.

*Linn. S. N. Sp. 715.*

*Belg. Navel-Slak. Angl. Dice Nerit.*

Testa umbilicata, laevi;  
spira mucronata; umbilico  
gibbo bifido.

Die genabelte, glatte, spitz-  
wirlige Schale hat einen hö-  
ckerigen zweitheiligen Nabel.



α. albida, punctis adspersis ferrugineis. α. weißlich, mit rostfarbigen Punkten.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 228.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 5. f. II.*

*Gualt. Test. t. 67. f. Q. S.*

*Adams. Seneg. Pl. 13. f. 3.*

*Seb. Thes. III. t. 38. f. 60. 61.*

*Knor. Vergn. I. 10. t. 3. f.*

*Murr. Fund. Test. t. 1. f. 23.*

β. albida, seriebus transversis macularum ferruginearum. β. weißlich, mit Querbändern von rostfarbigen Flecken.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 224.*

*Gualt. Test. t. 67. f. R.*

*Seb. Thes. III. t. 38. f. 62. 63.*

*Gev. Belust. 27. t. 303. 304. f.*

γ. albida, lineis longitudinalibus angularis ferrugineis. γ. weißlich, mit nach der Länge laufenden rostfarbigen Winkelzügen.



*List. Hist. Conch. l. 4. f. 5. f. I.*

*Gualt. Test. t. 67. f. X.*

*Gev. Belust. 27. t. 295. 302. f.*

*Argenv. Conch. Pl. 7. f. C.*

*Adams. Seneg. Pl. 13. f. 4.*

*Seb. Thes. III. t. 38. f. I. 54.*

*Regenf. Samml. I. 3. t. 34. f.*

*Knor. Vergn. I. 10. t. 4. f.*

♂ grisea, fasciis transuerfis albo ♂ gelbgrau, mit weiß und braun  
fuscoque articulatis. unterbrochenen Querbändern.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 5. f. 3. 4. 8.*

*Gualt. Test. t. 67. f. V.*

*Seb. Thes. t. 38. f. 27. 28. 51. 52. 64. 65.*

*Gev. Belust. 27. t. 294. f.*

*Knor. Vergn. I. 10. t. 5. f.*

—— — II. 10. t. 5. f.

—— — III. 15. t. 4. f. ; 20. t. 4. f.

O. I. 2. *Nerita glau-*  
*cina.*

O. I. 2. Die dicklippige  
Schwimmuschnecke.

*Linn. S. N. Sp. 716.*

*Belg.*



*Gall. Limacon du Rivage.*

Testa umbilicata laevi, Die genabelte glatte stumpf-  
spira obtusa, umbilico semi-wirblice Schale hat einen halb-  
clauso; labio gibbo decolore, gedeckten Nabel, mit einer hö-  
ckerigen gefärbten Lippe.

*List. angl. t. 3 f. 10.*

— *Hist. Conch. l. 4. f. 5. f. 10.*

*Rumph. amb. t. 22. f. C.*

*Petiv. amb. t. 10. f. 11.*

*Gualt. Test. t. 67. f. M. P. T.*

*Adans. Seneg. Pl. 13. f. 4.*

*Seb. Tbes. III. t. 38. f. 33.*

*Knor. Vergn. VI. 13. t. 7. f.*

O. I. 3. *Nerita rufa.*

O. I. 3. Die braune  
*Nerite.*

*Angl. Twin girdled Nerit. Petiv.*

Testa umbilicata, laevi, Die genabelte glatte stumpf-  
spira obtusa, umbilico bis- wieblice Schale, hat einen  
do, zweispaltigen Nabel.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 6. f. 34.*

*Rumph. amb. t. 22. f. D.*

*Petiv.*



*Petiv. amb. t. II. f. 3.*

*Argenv. Conch. Pl. 7. f. Z.*

*Seb. Thes. III. t. 39. f. 30.*

*Gev. Belust. 27. t. 296. f.*

Testa subglobosa, laevis. Anfractus quatuor, infimus ventricosus, superiores efformantes spiram complanatam, obtusam. Apertura semirotonda. Labium reflexum, glabrum, non claudens umbilicum. Umbilicus profundus, costa elevata bipartitus.

Die Schale ist einigermaßen genabelt und glatt. Von den vier Gewinden ist das unterste bäuchig, die obern bilden einen zusammengedrückten stumpfen Schnirkel. Die Mündung ist halbrund. Die Spindelstelle ist übergeschlagen, und glatt, mit einem offenen tiefen Nabel, welcher durch eine erhabene Rippe in zwei getheilet wird.

O. I. 4. *Nerita Vitellus.*

*Linn. S. N. Sp. 717.*

O. I. 4. *Der Eiersdotter.*

*Belg. Strand - Doijer. Angl. Doyer Velk. Nerit- Pet. Gall. Jaune d'oeuf. Dav.*

Testa umbilicata subglobosa laevi, umbilico aperto aequali.

Die genabelte einigermaßen kugelförmige glatte Schale hat einen offenen glatten Nabel.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 5. f. 12.*

*Rumpb. amb. t. 22. f. A.*

*Petiv. amb. t. 10. f. 13.*

*Gualt. Test. t. 67. f. L.*

*Argenv. Conch. Pl. 7. f. D.*

*Gev. Belust. 27. t. 292 f.*





*Seb. Thes. III. t. 38. f. 30. 31.*

*Knor. Vergn. I. 7. t. 2. f.*

— — — II. 8. t. 5. f.

O. I. 5. *Nerita Albu-*  
*men.*

O. I. 5. Der geschobene  
Eyerdotter.

*Linn. S. N. Sp. 718.*

*Belg. Platte Doyer. Angl. Velk Nerit. Gall. Jaune d'oeuf applati. Dav.*

Testa umbilicata conuexa,  
umbilico subcordato, labio ex-  
planato.

Die genabelte erhabenrunde  
Schale hat einen etwas herz-  
förmigen Nabel, mit einer aus-  
gebreiteten Spindellippe.

*Rumph. amb. t. 22. f. B.*

*Petiv. amb. t. 10. f. 14.*

*Gualt. Test. t. 67. f. A. B.*

*Argenv. Conch. Pl. 7. f. T.*

*Gev. Belust. 28. t. 309. f.*

*Regenf. Samml. I. 5. t. 54. f.*

*Knor. Vergn. II. 11. t. 1. f.*

— — — IV. 7. t. 4. 5. f.

O. I. 6. *Nerita Mam-*  
*milla.*

O. I. 6. Der Warzen-  
dotter.

*Linn.*



Linn. S. N. Sp. 719.

Belg. Sleek-hoorn. Angl. White Nent. Petiv. Galt. Mammelon blanc. Day.

Testa umbilicata, ouata, Die genabelte, eysförmige,  
glabra; umbilico obtesto, a- glatte Schale hat einen gedeck-  
pertura ouata. ten Nabel, mit einer eysförmig-  
gen Mündung.

List. Hist. Conch. I. 4. f. 5. f. 22.

Rumph. amb. t. 22. f. F.

Petiv. amb. t. 10. f. 15.

Gualt. Test. t. 67. f. C. D.

Argenv. Conch. Pl. 7. f. X.

Seb. Thes. III. t. 38. f. 9. 10.

Gev. Belust. 28. t. 306. f.

Knor. Vergn. I. 6. t. 6. 7. f.

— — — IV. 8. t. 4. f.

— — — VI. 40. t. 2. 3. f.

O. I. 7. Nerita fulca-  
ta.

O. I. 7. Die gefurchte  
Schwimmuschnecke.

Testa subglobosa, sulcis Die einigermaßen kugelför-  
longitudinalibus, obliquatis; mige Schale hat nach der Län-  
umbilico bifido, ge herab, etwas schief laufen-  
de Strahlen, und einen zweys-  
spaltigen Nabel.

Knor.

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa subglobosa. Anfractus quatuor. Spira mucronata. Sulci seu plicae incisae secundum longitudinem descendentes. Umbilicus perforatus, costa elevata bipartitus. Color lacteus.

Die Schale ist einigermassen kugelförmig. Der Gewinde sind vier. Der Schnitzel ist zugespitzt. Nach der Länge herab und etwas schief laufen ausgeschnittene Furchen oder Falten. Der Nabel ist offen, und mit einer erhabenen Rille in zwei getheilet. Von schneeweisser Farbe.

O. II. Imperforatae, labio. edentulo.

O. II. Undurchbohrte, ohne Zähnen an der Spindelstelle.

O. II. 1. Nerita Radula.

O. II. 1. Die rauhe Schwimmschnecke.

Linn. S. N. Sp. 721.

Testa transuersim sulcata, costis intermediis acute tuberculatis.

Die Schale ist der Quere nach gefurchet, und auf den Zwischenribben mit spitzigen Röhren besetzt.

Gev. Belust. 23 t. 241 f.

*Mus. Caes. Vindobon.*

O. II. 2. Nerita littoralis.

O. II. 2. Die Strandnerite.

Linn. S. N. Sp. 723.



Testa laevis, vertice obtusiusculo, labio acuto edentulo.

Die glatte etwas stumpfwirblige Schale hat eine scharfe Schalenleiste ohne Zähnen.

List. angl. t. 2. f. 2.

— Hist. Conch. l. 4. f. 6. f. 35 — 38.

Gev. Belust. 24. t. 250. 252 257. f.

Picturis, & coloribus innumeris varians.

Davon giebt es der Farbe und Zeichnung nach unzählbare Spielarten.

### O. II. 3. Nerita lacustris.

### O. II. 3. Die Sumpferite.

Linn. S. N. Sp. 725.

Testa laevis, apice exquiritato, labiis edentulis.

Die glatte Schale hat eine hervorragende Wirbelspitze, und ungezähnelte Rissen.

List. Hist. Conch. l. 2. p. 1. f. 38. ; l. 4. f. 6. f. 43

Petiv. Gaz. t. 91. f. 3.

Gualt. Test. t. 4. f. M. LL.

Gev. Belust. 24. t. 258 — 265. f.

Berlin. Mag. IV. 8. t. 27. 28. f.

O. III. Imperforatae, labio dentato.

O. III. Undurchbohrte mit ungezählter Spindelkeule.

### O. III. 1. Nerita pulcherrima.

### O. III. 1. Die bruttragende Nerite.

Linn. S. N. Sp. 726.

Belg. Roed-Oog. Angl. Red Nerite.

Testa



Testa laeui, spirae apice Die glatte Schale hat eine na-  
excauato umbilicato, labio beßförmig ausgehöhlte Schnir-  
crenulato. kelspize, und eine glatte fein-  
gekerbte Spindelkeßze.

*Lifst. Hist. Conch. l. 2. p. I. f. 37.*

*Petiv. Gaz. t. II. f. 4.*

— amb. t. II. f. 4.

*Rumph. amb. t. 22. f. H.*

*Gualt. Test. t. 4. f. HH.*

*Seb. Thes. III. t. 41. f. 23 — 26.*

*Gev. Belust. 31. 23. t. 242. f.*

*Berlin. Mag. IV. S. t. 31. f.*

*Knor. Verg. VI. 13. t. 3. f.*

O. III. 2. *Nerita cor-  
nea.*

O. III. 2. Die Horn-  
nerite,

*Linn. S. N. Sp. 722.*

Testa rotundata, obsoleta  
striata, labiis edentulis.

Die rundlichte mattgestreifte  
Schale hat an den Lippen kei-  
ne Zähne.

Nigra, punctis fasciisque trans-  
uersis, luteis.

Schwarz, mit gelben Punkten  
und Querbändern.

*Argenv. Conch. Pl. 6. f. M.*

*Gev. Belust. 22. t. 226. f.*

O. III. 3. *Nerita viri-  
dis.*

O. III. 3. Die grüne  
Schwimmuschnecke.

D d 2

*Linn.*





*Linn. S. N. Sp. 729.*

Testa laeui viridi, labio  
crenulato.

Die glatte grüne Schale hat  
eine feingekerbte Schalenleiste.

*Mus. Caes. Vindobon.*

O. III. 4. *Nerita virgi-*  
*nea.*

O. III. 4. Der Blutz  
zahn.

*Linn. S. N. Sp. 730.*

*Belg. Floedige Tand. Gall. Quenotte.*

Testa laeui, ouata, labio  
gibbo, crenulato.

Die glatte eysförmige Schale  
hat eine höckerige feingekerbte  
Schalenleiste.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 204.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 6. f. 25. 26.*

*Petiv. Gaz. t. II. f. 3.*

*Argenv. Conch. Pl. 7. f. P.*

*Gev. Belust. 24. t. 251. f.*

*Knor. Vergn. V. 3. t. 2. f.*

O. III. 5. *Nerita pen-*  
*nata.*

O. III. 5. Die gestieder-  
te Schwimmschnecke.

Testa



Testa rotundata, laeui, labio plano crenulato.

Die rundliche glatte Schale hat eine flache feingekerbte Schalenleſze.

*Liſt. Hiſt. Conch. l. 4. ſ. 6. f. 29.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa rotundata, laevis. Anfractus circiter quatuor, infra futuram complanati. Spira obtusa; Apex erosus. Apertura semicircularis. Labrum acutum. Labium complanatum, crenulatum. Color olivaceus alboque varius, maculis transversis pennatis nigris.

Die Schale iſt rundlich und glatt. Die Gewinde, deren ungeſt vier ſind, an der Naſch zuſammengedrückt. Der Schnitzel iſt ſtumpf; die Spitze ausgefreſſen. Die Mündung halbrund. Die Schalenleſze ſcharfrandig. Die Spindelſeſze flach, und gekerbet. Die Farbe olivengrün, und weiß geſpott, mit federförmigen querliegenden ſchwarzen Flecken.

O. III. 6. Nerita polita.

O. III. 6. Die glatte Schwimmiſchnecke.

*Linn. S. N. Sp. 731.*

Testa laeui, obtusa, labio dentato, labro crenulato.

Die Schale iſt glatt und ſtumpfwirblig, die Spindelſeſze gezähnt, die Schalenleſze gekerbet.

α fusco alboque nebulosa, fasciis transversis rubris.

α braun und weiß nebelicht, mit rothen Querbändern.



*List. Hist. Conch. l. 4. f. 6. f. 17.*

*Gualt. Test. t. 66. f. G.*

*Regenf. Samml. l. 4. t. 43. f.*

*Seb. Thes. III. t. 59. f. 1. 3.*

*Gev. Belust. 22. t. 223. 224. f.*

β a'bo, fuscoque nebulosa,

β weiß, und braun nebelicht

*Rumph. amb. t. 22. f. 7.*

*Petiv. amb. t. 11. f. 20.*

*Gualt. Test. t. 66. f. H.*

*Argenv. Conch. Pl. 7. f. K.*

*Gev. Belust. 22. t. 220 — 221. f.*

γ griseo rubroque nebulosa, fasciis γ lichtgrau, und rothnebelicht,  
transuersis niueis. mit schneeweißen Querbändern.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 221.*

*Gev. Belust. 24. t. 245. f.*

O. III. 7. Nerita Peloronta.

O. III. 7. Der Peloront Nerite.

*Linn. S. N. Sp. 732.*

*Belg. Poelorontje. Rumph. Angl. Poeloroon Nerit. Petiv.*

Testa



Testa striata, labiis den- Die gestreifte Schale hat  
tatis, interiore planiusculo gezähnte Lippen, deren innere  
rugoso. flach, und runzelicht ist.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 6. f. II.*

*Rumph. amb. t. 22. f. K.*

*Petiv. amb. t. II. f. 6.*

*Gev. Belust. 27. t. 299. f.*

*Knor. Vergn. III. 1. t. 4. f.*

O. III. 8. Nerita Albi-  
cilla.

O. III. 8. Die stumpfe  
Schwimmuschnecke.

*Linn. S. N. Sp. 733.*

Testa striata, spira obtu- Die gestreifte Schale hat  
fissima, labiis dentatis, inte- einen sehr stumpfen Wirbel,  
riore tuberculato. und gezähnte Lippen, deren  
innere mit Körnern besetzt ist.

*Rumph. amb. t. 22. f. 8.*

*Gev. Belust. 23. t. 229. f.*

*Knor. Vergn. VI. 13. t. 4. f.*

O. III. 9. *Nerita plicata*.O. III. 9. Die faltene  
nerite.*Linn. S. N. Sp. 735.*

Testa sulcata, labiis den- Die gefaltene Schale hat  
tatis, interiore rotundato, gezähnte Lippen, deren innere  
exte iore utrinque dentibus rundlicht, die äussere aber bei-  
acutis. derseits mit spizigen Zähnen be-  
setzet ist.

*Knor. Vergn. V. 15. t. 4. f.**Mus. Caes. Vindobon.*O. III. 10. *Nerita grossa*.O. III. 10. Die geribbte  
Schwimmschnecke.*Linn. S. N. Sp. 736.*

Testa sulcata, labiis den- Die gefurchte Schale hat  
tatis, interiore conuexo ru- gezähnte Lippen, deren innere  
goso. runderhaben, und runzelicht  
ist.

*Rumph. amb. t. 22. f. N.**Petiv. amb. t. 5. f. 8.**Gev. Belust. 22. t. 228. f. ?**Mus. Caes. Vindobon.*

O. III. 9.





O. III. 11. *Nerita Chamaeleon*.

*Linn. S. N. Sp. 737.*

*Pelg. Kamelotje. Rumph. Angl. Camel Nerit. Petiv.*

Testa fulcis viginti, labiis dentatis, interiore rugoso, tuberculato.

O. III. 11. Das Kamelotchen.

Die Schale hat zwanzig Furchen, und gezähnte Lippen, deren innere mit Runzeln und Körnern besetzt ist.

*Rumph amb. t. 22. f. L.*

*Petiv. amb. t. 11. f. 7.*

*Gev. Belust. 23. t. 231. f.*

*Regenf. Samml. I. 3. t. 26. f.*

*Knor. Vergn. II. 9. t. 1. f.*

O. III. 12. *Nerita undata*.

*Linn. S. N. Sp. 738.*

Testa fulcis triginta, labiis dentatis, interiore rugoso, tuberculato.

O. III. 12. Die Wellen-nerite.

Die Schale hat dreißig Runzeln, und gezähnte Lippen, deren innere mit Runzeln und Körnern besetzt ist.

*Bonan. Recr. cl. 2. f. 215.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 6. f. 6.*

*Rumph. amb. t. 22. f. 4.*



*Gev. Belust.* 22. t. 227. f.

*Knor. Vergn.* VI. 13. t. 2. f.

O. III. 13. *Nerita Exuvia.*

O. III. 13. Die breit-  
furchige Schwimmschnecke.

*Linn. S. N. Sp.* 739.

*Belg. Geworte Alykruyk. Angl. Deep-rigd Nerit. Petiv.*

*Testa sulcata, labiis dentatis, interiore tuberculato.* Die gefurchte Schale hat gezähnte Lippen, deren innere mit Körnern besetzt ist.

*Bonan. Recr. cl.* 3. f. 220.

*List. Hist. Conch. l.* 4. f. 6. f. 14.

*Petiv. Gaz. t.* 100. f. 6.

—— *amb. t.* 11. f. 9.

*Rumph. amb. t.* 22. f. M.

*Gualt. Test. t.* 66. f. CC.

*Argenv. Conch. Pl.* 7. f. 7.

*Seb. Thes. III. t.* 59. f. 4—9.

*Gev. Belust.* 23. t. 239. 240. f.

*Knor. Vergn. III. 1. t.* 3. f.

*Da Cost. Elem. Pl.* 3. 14. 15. f.



P. Haliotis.

P. Die Ohrschnecke.

Testa auriformis, foraminibus secundum longitudinem digestis. Spira occultata laterali.

Die Schale ist ohrförmig und der Länge nach mit Lochern durchbohret. Der Schnirkel stehet verborgen an der Seite.

P. 1. Haliotis Midæ.

P. 1. Das Hohlohr.

Linn. S. N. Sp. 740.

Belg. Groot Holzeoor. Angl. The great Ear-Shell. Hill. Gall. La grande Oreille de Mer.

Testa subrotunda, rugosa, limbo lato.

Die beinahe runde und runzelichte Schale hat einen breiten Rand.

Liszt. Hist. Conch. 1. 4. f. 7. f. 5.

Gualt. Test. t. 96. f. B.

Valent. Abb. 12. t. 102. f.

Argenv. Conch. Pl. 3. f. A.

Hill. Hist. of. Anim. Pl. 7.

Knor. Vergn. V. 20. t. 3. f.

Mart. Conch. Kab. I. 14. t. 136. f.

P. 2.

P. 2. *Haliotis striata*.P. 2. Das gestreifte  
Ohr.*Linn. S. N. Sp. 742.**Belg. Gestrepte Zeeohr. Gall. Oreille de mer striée.*

Testa ovata, transuersim Die eysförmige Schale ist  
rugosa, longitudinaliter stria- nach der Quere gerunzelt, und  
ta. in die Länge gestreift.

*Knor. Vergn. I. 20. t. 5. f.**Mart. Konch. Kab. I. 14. t. 138. f.*P. 3. *Haliotis marmo-  
rata*.

P. 3. Das Marmorohr.

*Linn. S. N. Sp. 741.**Gall. Oreille marbrée.*

Testa ovata, striis longitu- Die eysförmige Schale ist der  
dinalibus, transuersis, obsole- Länge nach gestreift, und in  
tis. die Breite mit matten Strei-  
fen besetzt.

*List. Hist. Conch. I. 4. f. 7. f. 6.**Argenv. Conch. Pl. 3. f. B.**Knor. Vergn. II. 17. t. 4. 5. f.**Mart. Konch. Kab. I. 14. t. 139. f.*



P. 4. *Haliotis asinina*. P. 4. Das Eselohr.

*Linn. S. N. Sp. 745.*

*Belg.* Lange Parlemoor - Schulp. *Angl.* Long Sea Ear. *Hill. Gall.* Oreille d'âne. *Dav.*

*Testa* ovato oblonga, glabra, Die eysförmige, länglichte  
*marginē* subsulcata, dorso glatte Schale ist am Rande  
*friato.* einigermaßen gefurchet, und  
 auf dem Rücken gestreift.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 7. f. 1.*

*Rumph. amb. t. 40 f. E. F.*

*Petiv. amb. t. 16. f. 34.*

*Gualt. Test. t. 69. f. D.*

*Argenv. Conch. Pl. 3. f. E.*

*Hill. Hist. of. Anim. Pl. 7.*

*Regenf. Samml. III. 9. t. 29. f.*

*Knor. Vergn. III. 15. t. 1. f.*

*Mart. Konch. Kab. I. 16. t. 150. f.*





Q. Patella.

Q. Die Napfschnecke.

Testa fornicata, subconica, absque spira.

Die Schale ist gewölbet, kegelförmig, ohne Schnitzfel.

Q. I. Labio interno.

Q. I. Mit einer Lippe in der inneren Wölbung.

Q. I. I. Patella equestris.

Q. I. I. Die Fische-  
weiberhaube.

Linn. Sp. N. Sp. 747.

Belg. Vjschhuifje. Rumph. Angl. Beaked Limper. Hill. Gall. Le Cabochon. Dav.

Testa conica, vertice obliquo, labio subverticali cancellulato.

Die kegelförmige Schale hat einen schiefen Wirbel, und eine rinnenförmige nahe unter dem Wirbel stehende Lippe.

Bonan. Recr. cl. I. f. 12.

List. Hist. Conch. l. 4. f. I. f. 39.

Rumph. amb. t. 40. f. P. O.

Petiv. amb. t. 16. f. 28.

Gualt. Test. t. 9. f. Z.

Hill.



Hill. Hist. of. Anim. Pl. 7.

Dav. Cat. syst. I. Pl. 2. f. B. b.

Mart. Konch. Kab. I. 13. t. 117 — 110. f.

Murr. Fund. Test. t. 1. f. 5.

Walch Naturf. IX. 3. t. 1. 2. f.

Q. I. 2. Patella fornicata,      Q. I. 2. Der Pantosel.

Linn. S. N. Sp. 751.

Belg. Pantoseltje. Angl. Small indian Canoe-Shell. Gall. Le Sandale. Dav.

Testa ouata, vertice marginali, mucronato, incuruo, labio interno concauo. Die eiförmige Schale hat an einem Ende einen spizigen gekrümmten Wirbel, mit einer hohlen Lippe.

List. Hist. Conch. l. 4. f. 1. f. 33.

Argenv. Conch. Pl. 2. f. N.

Adans. Seneg. Pl. 2. f. 8.

Knor. Vergn. VI. 21. t. 8. f.

Mart., Konch. Konch I. 13. t. 129. 130. f.

Q. II.



Q. II. Margine angulato.

Q. II. Mit eckigem Rande.

Q. II. 1. Patella saccharina.

Q. II. 1. Die Sternpatelle.

Linn. S. N. Sp. 754.

Belg. Bonnetje. Angl. White rib'd Limpet. Pet. Gall. Astrolepas. Dar.

Testa margine angulato, Die Schale hat einen eckigen Rand, und scharfkantige Rippen.  
costis carinatis acutis.

List. Hist. Conch. l. 4. f. I. f. 10.

Rumph. amb. t. 40. f. B.

Petiv. amb. t. 3. f. 3.

Gualt. Test. t. 9. f. M. O.

Argenv. Conch. Pl. 3. f. M.

Klein. Meth. Ostr. t. 8. f. 4.

Knor. Vergn. III. 29. t. 3. f.

Mart. Konch. Kab. I. 9. t. 76. f.

Murr. Fund. Test. t. 1. f. 6.

Q. II. 2. Patella barbara.

Q. II. 2. Die Mütze.

Linn. S. N. Sp. 755.

Belg. Grasje.

Testa



Testa angulata , costis viginti undatis , tuberculatis.

Die eckige Schale hat zwanzig wellenförmige knorlige Rippen.

*Knor. Vergn. V. 13. t. 5. f.*

Q. II. 2. Patella plicata.

O. II. 2. Die Faltenpatelle.

*Gall. La tete de Meduse, Dav.*

Testa angulata , costis triginta obtusis , undulosis , transversim rugosis.

Die eckige Schale hat dreyßig stumpfe , wellenförmige , in die Quere gerunzelte Rippen.

*Knor. Vergn. III. 30. t. 1. f.*

*Dav. Cat. syst. I. Pl. 3. f. D.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa ovata. Margo dentatus, dentibus 30 - 34. Costae totidem dorsales, undatae, transversim rugosae. Vertex subcentralis, obtusus. Color albus, maculis fuscis.

Die Schale ist eiförmig. Der Rand mit 30 — 34 Zähnen umgeben. Auf dem Rücken liegen eben so viele wellenförmige und in die Quere gerunzelte Rippen. Der stumpfe Wirbel steht nahe am Mittelpunkt. Weiß mit braunen Flecken.



Q. II. 3. *Patella granularis*.

Q. II. 3. Die Festung.

*Linn. S. N. Sp. 756.*

*Belg. De Fortresse. Angl. The Fortresse. Gall. La Forteresse. Dav.*

*Testa angulata, dorso squamis angulatis imbricato, fundo fusco.*

Die eckige Schale hat auf dem Rücken ziegelförmig gestellte eckige Schuppen, und einen braunen Boden.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 1. f. 13.*

*Gualt. Test. t. 9. f. F.*

*Argenv. Conch. Pl. 2. f. G.*

*Hill. Hist. of. Anim. Pl. 7.*

*Regenf. Samml. I. 9. t. 31. f.*

*Knor. Delic. nat. I. t. B. V. f. 8.*

—— *Vergn. I. 30. t. 2. f.*

*Mart. Konch. Kab. I. 9. t. 71.*

Q. II. 4. *Patella Oculus*.

Q. II. 4. Das Bocksaug.

*Angl. Goat's Eye Limpet. Da Cost. Gall. L'oeil de bouc. Argenv.*

*Testa*





Testa angulata , costis carinatis , vertice fundoque albo.

Die eckige Schale hat riefenförmige Ribben, den Wirbel und Grund von weißer Farbe.

Gualt. Test. t. 9. f. H. 1

Argenv. Conch. Pl. 2. f. B.

Mart. Konch. Kab. I. 10. t. 86. f.

Da Cost, Elem. Pl. 2. f. 1.

Testa similis priori, a qua differt: colore fundi verticisque albo, squamarumque defectu.

Eine Art die der vorhergehenden ähnlich ist, von der sie sich durch die weiße Farbe des Wirbels und Grundes, und durch den Mangel der Schuppen unterscheidet.

Q. II. 5. Patella granatina.

Linn. S. N. Sp. 757.

Q. II. 5. Das Körnerschild.

Belg. Gedoornd Kapje. Gall. Lepas granuleux.

Testa multifulcata, punctis elevatis muricata, margine dentato.

Die Schale ist mit vielen Furchen und erhabenen Punkten beiset, und mit einem erhabenen Rande versehen.



*List. Hist. Conch. l. 4. f. 1. f. 15.*

*Bonan. Mus. Kirch. cl. 2. f. 22.*

*Argenv. Conch. Pl. 2. f. H.*

*Regenf. Samml. I. 2. t. 14. f.*

*Mart, Conch. Kab. I. 8. t. 61.*

Q. II. 6. *Patella coerulea.*

Q. II. 6. Die blaue Napfsschnecke.

*Linn. S. N. Sp. 759.*

Testa inaequaliter fulcata, cauitate coerulescente, margine subangulato.

Die Schale ist mit ungleichen Furchen besetzt, in der Höhlung bläulich, und am Rande einigermaßen eckig.

*Mus. Caes. Vindobon.*

Q. II. 7. *Patella miniata.*

Q. II. 7. Der Sonnenschirm.

*Belg. Geltraalte Kapje. Gall. Le Parasol. Dav.*

Testa ovata, striis inaequalibus decussatis, margine subangulato.

Die eiförmige Schale ist mit ungleichen Strichen durchkreuzet, und am Rande einigermaßen eckig.

*List.*



*List. Hist. Conch. l. 4. f. I. f. 21.*

*Knor. Vergn. V. 8. t. 4 — 6. f. ; 19. t. 2. 3. f.*

*Marr. Konch. Kab. I. 7. t. 52. f. ; 8. t. 63. f.*

Testa ovata. Margo obsolete anguatus. Dorsum striis longitudinalibus transuersisque decussatim striatum. Vertex obtusus. Color albus, punctis minutis, radiisque roseis.

Die Schale ist eiförmig. Der Rand hat vollkommene Ecken. Der Rücken ist der Länge und Quere nach mit feinen Streifen durchkreuzet. Der Wirbel stumpf. Weiß mit kleinen Punkten und Strahlen von rosenrother Farbe.

Q. II. 8. Patella Cochlear.

Q. II. 8. Der Löffel.

*Gall. La Cuilliere.*

Testa ovata, complanata, postice attenuata, margine subangulato.

Die Schale ist eiförmig und plattgedrückt, hinten verschmälert, und am Rande einigermaßen eckig.

*Knor. Vergn. II. 26. t. 3. f.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa ovalis. Margo crenatus. Dorsum antice planiusculum, postice attenuatum, utrinque compressum.

Die Schale ist eyrund. Der Rand gekerbet. Der Rücken vorne etwas flach, hinten verlängert, an beiden Seiten



sum. Striatum, striis longitudinalibus inaequalibus. Cavitas posteriorum canaliculata. Color albus, cavitas macula lata purpureo coerulea.

den Seiten zusammengedrückt, mit ungleichen Streifen der Länge nach besetzt. Die Höhlung ist rückwärts rinnenartig ausgekehlet. Weiß, mit einem breiten purpurblauen Flecke in der Höhlung.

Q. II. 9. Patella pentagona.

Q. II. 9. Der spanische Huth.

Testa pyramidata subquingula, margine explanato inaequali.

Die pyramidenförmige einigermassen fünfeckige Schale hat einen ausgebreiteten runden Rand.

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa pyramidata, angulis quinque obtusis, latere uno ampliore. Basis explanata quingula, crenata. Verex centralis obtusus. Color albidus, fundi rubellus.

Die Schale ist pyramidenförmig mit fünf stumpfen Ecken, und einer breiteren Seite. Der Rand ist ausgebreitet, und gekerbet. Der stumpfe Wirbel steht in der Mitte. Die Farbe ist weißlich, der Boden röthlich.

Q. III. Vertice acuminato curvato.

Q. III. Mit einem gespaltenen krummen Wirbel.

Q. III. I. Patella ungarica.

Q. III. I. Die Matrosenfappe.

*Linn. S. N. Sp. 761.*

Belg.



Belg. Lots - Kap, Rumph. Gall. Bonnet de Dragon. Dav.

Testa conica, vertice acuminato spiraliter curuato.

Die kegelförmige Schale hat einen zugespitzten schnirkelförmig gekrümmten Wirbel.

Bonan. Mus. Kirch. cl. 2. f. 13.

Gualt. Test. t. 9. f. W.

Klein. Meth. Ostr. t. 8. f. 10.

Knor. Vergn. VI. 16. t. 3. f.

Mart. Konch. Kab. I. 12. t. 107. 108. f.

Q. III. 2. Patella deflexa.

Q. III. 2. Die einseitige Napfsschnecke.

Testa ovata, longitudinaliter sulcata, vertice dextror-um curuato.

Die Schale ist eysförmig, der Länge nach gestreift, mit einem nach der linken Seite gekrümmten Schnirkel.

Helbl. Abb. e. Priv. Ges. in Boehm. IV. 1. t. 9. 10. f.

Testae ambitus ovatus. Dorsum cornicatum, utrinque compressum, longitudinaliter sulcatum. Vertex obtusus, compressus, in latus dextrum decurvatus. Color fuscus, striae radiantes & fundus albus.

Der Umfang ist eysförmig. Der Rücken gewölbet, beiderseits zusammengedrückt, und der Länge nach gesurchet. Der Wirbel ist stumpf, zusammengedrückt, und nach der rechten Seite gekrümmt. Von schwarzer Farbe mit weißen Strahlen und Wirbelboden.





Q. III. 3. *Patella millaris*.

Q. III. 3. Die Koppstas-  
telle.

*Linn. S. N. Sp. 764.*

*Belg. Getepelte Patelle.*

*Testa integra, conica, striata, vertice reflexo laevi.*

Die ganzrandige, kugelförmige, gestreifte Schale hat einen zurückgebogenen glatten Wirbel.

*Liss. Hist. Conch. l. 4. f. I. f. 17.*

*Klein. Meth. Ostrac. t. 8. f. I.*

*Adans. Seneg. Pl. 2. f. 5.*

*Mart. Konch. Kab. I. 7. t. 58. 59. f.*

Q. III. 4. *Patella tricarinata*.

Q. III. 4. Die dreyspitzige Napfschnecke.

*Linn. S. N. Sp. 764.*

*Testa reticulato striata, antice tricarinata, vertice recurvo.*

Die netzförmig gestreifte Schale hat vorne drey Riele, mit einem zurückgebogenen glatten Wirbel.

*Mus. Caes. Vindobon.*

Q. III. 5.



Q. III. 5. *Patella pectinata*.

Q. III. 5. Die Kamm-  
patelle.

*Linn. S. N. Sp. 765.*

Testa integra, ouata, membranacea, squamis imbricatis, vertice reflexo submarginali.

Die ganzrandige, eysförmige, dünnhäutige Schale ist mit hohlen Schuppen ziegelförmig bedeckt, und nahe am Rande mit einem zurückgebogenen Wirbel versehen.

*Mus. Caes. Vindobon.*

Q. III. 6. *Patella lutea*.

Q. III. 6. Der gelbe  
Huth.

*Linn. S. N. Sp. 766.*

Testa integra, ovali, striata, vertice submarginali reflexo mucronato.

Die ganzrandige eysförmige gestreifte Schale, hat nahe am Rande einen zurückgebogenen gespitzten Wirbel.

*Mus. Caes. Vindobon.*



Q. IV. Integerrimae , vertice  
obtus.

Q. IV. Mit ganz glatten Rand,  
und stumpfen Wirbel.

Q. IV. 1. Patella pellu-  
cida.

Q. IV. 1. Die Glas-  
patelle.

*Linn. S. N. Sp. 770.*

Testa ouata , ventricosa,  
membranacea pellucida , ra-  
diis coeruleis.

Die eysförmige , bäuchige ,  
dünnhäutige , und durchsichtige  
Schale , hat blaue Strahlen.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 1. f. 27.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

Q. IV. 2. Patella testu-  
dinaria.

Q. IV. 2. Der Schild-  
krötennapf.

*Linn. S. N. Sp. 771.*

*Belg. Getygerd Schild, Gall. Bouclier de Tortue. Dav.*

Testa integerrima ouata ,  
glabra, fusco maculata.

Die ganzrandige , eysförmig-  
e , glatte Schale ist braun  
gefleckt.

*List.*



*List. Hist. Conch. L. 4. f. 1. f. 9.*

*Gualt. Test. t. 8. f. B.*

*Argenv. Conch. Pl. 2. f. P.*

*Knor. Vergn. I. 21. t. 1. f.*

*Mart. Conch. Kab. I. 6. t. 45 — 48. f.*

*Walch Naturf. VIII. 4. t. 2. 3. f.*

Q. IV. 3. *Patella radiata*,

Q. IV. 3. Die Strahlpatelle.

Testa integerrima, ovata, striata, vertice radiisque fuscis.

Die ganzrandige, ensörmige, gestreifte Schale hat einen braunen Wirbel, mit gleichfarbigen Strahlen.

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa ovata. Margo integerrimus. Dorsum longitudinaliter striatum. Vertex subcentralis. Color albidus. Cavitas margaritacea. Fundus & fasciae radiantes fuscae.

Die Schale ist ensörmig. Der Rand ganz glatt. Der Rücken der Länge nach gestreift. Der Wirbel steht beinahe in der Mitte. Von weißlicher Farbe. Die Höhlung hat einen Perlschmuck. Der Boden und die strahligen Bänder sind braun.

Q. IV. 4.



Q. IV. 4. Patella compressa.

Q. IV. 4. Der Strohhuth.

*Linn. S. N. Sp. 772.*

*Belg. Geele Kapje.*

Testa integerrima, oblonga striata, dorso utrinque compresso.

Die ganzrandige längliche gestreifte Schale hat einen beiderseits zusammengedrückten Rücken.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 1. f. 25.*

*Knor. Vergn. VI. 28. t. 1. f.*

*Walch Naturf. VIII. 4. t. 1. f.*

Q. IV. 5. Patella rustica.

Q. IV. 5. Die Bauernschuppe.

*Linn. S. N. Sp. 773.*

Testa integerrima, conica sulcato striata, obtusa.

Die Schale ist ganzrandig kegelförmig, stumpfwirblig, mit Furchen und Streifen besetzt.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 1. f. 1.*

*Gualt. Test. t. 8. f. P.; t. 9. f. C.*

*Mart.*





*Mart. Konch. Kab. I. 5. t. 35. f. ; 6. t. 43. f.*

*Da Cost. Elem. Pl. I. f. 1. 2.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

Q. IV. 6. *Patella fusca.*      Q. IV. 6. Die Trink-  
schale.

*Linn. S. N. Sp. 774.*

*Gall. l'Entonnoir,*

Testa ouata, multi sulcata, Die eysförmige Schale ist  
cauitate margaritacea, fundo mit vielen Furchen besetzt, in  
fusco, der Höhlung perlsfarbig, und  
am Grunde braun.

*Bonan. Recr. cl. 1. f. 4.*

*Knor. Vergn. IV. 9. t. 1. 2. f.*

*Mart. Konch. Kab. I. 5. t. 40. f.*

G. V. *Perforatae.*

Q. V. Durchbohrte Napfschnecken.

Q. V. 1. *Patella Fissura.*      Q. V. 1. Die Spalte.

*Linn. S. N. Sp. 778.*

*Angl. Crack'd Barnstable Limpet. Petiv.*

Testa



Testa ovata reticulato striata, antice fissä, vertice recuruo.

Die eysförmige nezartig gestreifte Schale, ist vorne gespalten, mit einem zurückgebo- genen Schnitzel.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 1. f. 28.*

*Petiv. Gaz. t. 75. f. 2.*

*Mart. Konch. Kab. I. 12. t. 109, 110. f.*

*Müll. Zool. Dan. t. 24. f. 7.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

Q. V. 2. *Patella graeca.*

Q. V. 2. Das Runzelgitter.

*Linn. S. N. Sp. 780.*

*Belg. Griechsche Patelle. Angl. Thimble Limpes. Pet. Gall. Le Treillis. Dav.*

Testa ovata, costata, decussatim striata, vertice perforato.

Die eysförmige geribbte, in die Quere gestreifte Schale hat einen durchbohrten Wirbel.

*Bonan. Recr. cl. I. f. 6.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 1. f. 1.*

*Petiv. Gaz. t. 80. f. 11.*

Klein.



*Klein. Meib. Ostr. t. 8. f. 3.*

*Gualt. Test. t. 9. f. N.*

*Argenv. Conch. Pl. 2. f. 7.*

*Adans. Seneg. Pl. 2. f. 7.*

*Regenf. Samml. I. 2. t. 23. f.*

*Knor. Vergn. I. 30. t. 3. f.*

*Mart. Konch. Kab. I. II. t. 98. 99. f.*

Q. V. 3. *Patella nim-  
bosa.*

Q. V. 3. Das Strahl-  
gitter.

*Linn. S. N. Sp. 781.*

*Testa ouata longitudinali-  
ter sulcata, transversim stria-  
ta, vertice perforato.*

Die eysförmige Schale ist  
nach der Länge gesurget, und  
in die Quere gestreift, mit  
einem durchbohrten Wirbel.

*Bonan. Recr. cl. 1. f. 3.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 1. f. 4.*

*Gualt. Test. t. 9. f. Q. R. S. T.*

*Argenv. Coch. Pl. 6. f. C.*

*Adans. Seneg. Pl. 2. f. 6.*

*Mart. Konch. Kab. I. II. t. 91. 92. f; 12. t. 105. f.*

*Da Cost. Elem. Pl. 1. f. 3.*

Q. V. 4.

Q. V. 4. *Patella nodosa*.

Q. V. 4. Das Knottengitter.

*Angl.* Wart - rib'd Limpet.*Testa ovata sulcata, costis nodosis, vertice perforato.*

Die eysförmige gesurchte Schale hat knottige Ribben, und einen durchbohrten Wirbel.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 1. f. 6.**Petiv. Gaz. t. 153. f. 5.**Mart. Conch. Kab. I. II. t. 94. f.**Testa ovata. Dorsum longitudinaliter sulcatum, costis intermediis nodosis. Vertex subcentralis, pertusus; foramine oblongo. Color rubellus.*

Die Schale ist eysförmig. Der Rücken der Länge nach gesurcht, mit knottigen Zwischenribben. Der durchbohrte Wirbel steht an der Mitte. Die Oefnung ist länglicht. Von röthlicher Farbe.

R. Dentalium.

R. Die Zahnschnecke.

*Linn. Syst. Nat. Gen. 332.**Testa conico tubulosa, libera, utrinque pervia.*

Die freye Schale ist kegelförmig, hohl, und an beiden Enden offen.

R. I.



R. 1. Dentalium ele-  
phantinum.

R. 1. Der Elephanten-  
zahn.

*Linn. S. N. Sp.* 783.

*Belg.* Oliphants - tand. *Rumph.* *Angl.* Elephant's - Tooth. *Pet. Gall.*  
*Dentale. Dav.*

*Testa decemangula, subar-  
cuata, striata.*

Die Schale ist zehneckig,  
etwas gekrümmt, und gestrei-  
fet.

*Bonau. Recr. cl.* 1. f. 8.

*Lift. Hist. Conch.* 1. 4. f. 2. f. 1.

*Rumph. amb. t.* 41. f. 7.

*Petiv. amb. t.* 16. f. 33.

*Gualt. Test. t.* 10. f. 7.

*Argenz. Conch. Pl.* 3. f. H.

*Ginan. adr. II. p.* 2. t. 1. f. 1.

*Knor. Vergn.* 1. 19. t. 3. f.

*Mart. Konch. Kab.* 1. 1. t. 5. f. A.

*Müll. linn. Naturf.* VI. 1. B. 19. t. 1. f.

R. 2. Dentalium stria-  
tum.

R. 2. Das gestreifte  
Zähnen.

F. f

*Angl.*





*Angl. The striated Tooth - Shell. Hill.*

Testa octangula, subarcuata,  
ta, dense striata.

Die Schale ist achteckig, etwas gekrümmt, und mit Streifen dicht besetzt.

*Gualt. Test. t. 10. f. G.*

*Hill. Hist. of. Anim. Pl. 7.*

*Mart. Konch. Kab. I. 1. t. 5. f. B.*

*Præcedente crassitie minus dennis numerosis.*

Diese Art unterscheidet sich von der vorigen durch ihre Dünne, und die vielen gedrängt an einander stehenden Streifen.

R. 3. Dentalium Dentalis.

R. 3. Der Wolfszahn.

*Linn. S. N. Sp. 785.*

*Gall. La dent de loup. Dav.*

Testa subarcuata, longitudinaliter sulcata, tenui, rubella.

Die röthliche dünne Schale ist etwas gekrümmt, und nach der Länge gefurchet.

*Rumph.*



*Rumph. amb. t. 41. f. 6.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

**R. 4. Dentalium Enta-**  
lis.

**R. 4. Der Hundszahn.**

*Linn. S. N. Sp. 786.*

*Belg. Witte Wolfstand. Augl. The Dog - tooth Shell. Pet. Gall. Antale. Dav.*

*Testa subarcuata, laevissima.*

Die Schale ist etwas gekrümmet, und ganz glatt.

*Bonan. Recr. cl. 1. f. 9.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 2. f. 2.*

*Petiv. Gaz. t. 65. f. 9.*

*Rumph. amb. t. 41. f. 5.*

*Gualt. Test. t. 10. f. E.*

*Argenv. Conch. Pl. 3. f. K. K.*

*Ginan. adr. II. t. 1. f. 2.*

*Knor. Vergn. I. 29. t. 4. f.*

*Mart. Konch. Kab. I. 1. t. 1. 2. f.*

**R. 5. Dentalium poli-**  
tum.

**R. 5. Der Polirzahn.**



*Linn. S. N. Sp. 788.*

Testa subarcuata , striis  
annularibus confertissimis.

Die etwas gekrümmte Schale ist in die Quere mit gedrängt stehenden Streifen umgürtet.

*Gualt. Test. t. 10. f. F.*

*Mart. Konch. Kab. I. 1. t. 3. f. A.*

S. *Serpula*.

S. Die Röhrenschnecke.

*Linn. S. N. Gen. 333.*

Testa tubulosa , adnata , saepius isthmis intercepta.

Die Schale ist röhrig, und angewachsen, auch öfters durch Scheidewände abgetheilet.

S. I. *Serpula triquetra*.

S. I. Die dreneckige Röhre.

*Linn.*



*Linn. S. N. Sp. 795.*

*Gall. Vermiculaire blanc & triangulaire.*

*Testa repente, flexuosa, Die dreneckige Schale ist in  
triquetra. einander geschlungen, und fle-  
bei auf andern Körpern fest.*

*Gualt. Test. t. 10. f. P.*

*Bast. subf. I. t. 9. f. 2.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

*S. 2. Serpula filograna. S. 2. Die Flechtenröh-  
re.*

*Linn. S. N. Sp. 797.*

*Testis capillaribus, fascicu- Mehrere haarförmige, bü-  
latis, ramosis, confluentibus. schelweise und ästig an einan-  
der verwachsene Schalen.*

*Seb. Thes. III. t. 100. f. 8.*

*Koelr. Nov. Comm. Petr. VII, t. 16. f. 3.*



S. 3. *Serpula contor-*  
*tuplicata.*

S. 3. Der Fischdarm.

*Linn. S. N. Sp. 799.*

*Gall. L'assemblage des bojaux.*

*Testa rugosa, flexuosa, ca-*  
*rinata.*

Die Schale ist runzelicht,  
geschlungen und gekerbt.

*Bonan. Recr. cl. I. t. 20. f. G.*

*Argenv. Conch. Pl. 4. f. D.*

*Mart. Konch. Kab. I. 3. t. 24. f.*

*Da Cost. Elem. Pl. 2. f. 6.*

S. 4. *Serpula glome-*  
*rata.*

S. 4. Der Vogelbarm.

*Linn. S. N. Sp. 800.*

*Gall. Bojaux des oiseaux. Dav.*

*Testa decussatim striata, con-*  
*torta, glomerata.*

Die Schale ist kreuzweise  
gestreift, und klumpenweise  
in einander geschlungen.

*Bonan. Recr. cl. I. f. 20. E.*

*Gualt. Test. t. 10. f. T.*

*Mart. Konch. Kab. I. 3. t. 23. f.*

*Da Cost. Elem. Pl. 2. f. 7.*





S. 5. *Serpula lumbricallis*.

S. 5. Die Hornschlange.

*Linn. S. N. Sp. 801.*

*Belg. Zeeslangetje. Gall. Vilebrequin. Dav.*

*Testa flexuosa, apice spirali.*

Die geschlungene Schale hat eine schnirkelförmig gewundene Endspitze.

*α solitaria.*

*α einzeln.*

*Bonan. Recr. cl. 1. f. 20. A.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 3. f. 1.*

*Rumph. amb. t. 41. f. 1.*

*Petiv. amb. t. 22. f. 1.*

*Gualt. Test. t. 10. f. Q. V.*

*Argenv. Conch. Pl. t. 4. f. 7.*

*Ginan. adr. II. t. 2. f. 14.*

*Knor. Vergn. II. 13. t. 1. f.*

— — — IV. 17 t. 2. f.

*Mart. Conch. Kab. I. 2. t. 12. f. B.*

*β testis aggregatis.*

*β mit angehäuften Schalen.*

*Adans. Seneg. Pl. II. f. 1.*

S. 6. *Serpula polythalamia*.

S. 6. Die Sandpfeife.



*Linn. S. N. Sp. 802.*

*Angl. The chambered Vermiculus. Da Cost.*

Testa ponderosa, tereti, con-  
camerata, bifurcata.

Die Schwere, runde Schale  
ist in Kammern abgetheilt,  
und zweitheilig.

*Seb. Thes. III. t. 49. f. I.*

*Mart. Konch. Kab. I. 1. t. 6. f.*

*Da Cost. Elem. Pl. 2. f. 5.*

S. 7. *Serpula arenaria.* S. 7. Der Löffendarm.

*Linn. S. N. Sp. 803.*

*Belg. Hondsdarm. Rumph. Angl. Ovenshell. Pet.*

Testa supra angulata, subtus  
planiuscula.

Die Schale ist oben eckig,  
und unten flach.

*Bonan. Rect. cl. 1. f. 20. B.*

*Rumph. amb. t. 41. f. L.*

*Gualt. Test. t. 10. f. L. N.*

*Argenv. Conch. Pl. 4. f. H.*

*Adans. Seneg. Pl. II. f. 5.*

*Mart. Konch. Kab. I. 3. t. f. 19.*



S. 8. *Serpula anguina*. S. 8. Der Hühnerdarm.

*Linn. S. N. Sp.* 804.

*Belg.* Hornslangezje. *Rumph.*

Testa tenera, rima longitu- Die runde Schale hat na-  
dinali, apice cylindrico spi- rer Länge eine Spalte, und eine  
rali. warzenartige schnitzelförmig  
gebrochne Endspitze

*a* laevis.

*a* glatt.

*Lisf. Hist. Conch. l. 4. f. 3. f. 2.*

*Rumph. Amb. t. 41. f. 2.*

*Mart. Konch. Kab. l. 2. t. 13. f.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

*β* angulata, & muricata.

*β* mit eckigen, und stach-  
ligen Schale.

*Rumph. Amb. t. 41. f. 11.*

*Mart. Konch. Kab. l. 2. t. 13. f. B.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

S. 9. *Serpula Penis*. S. 9. Die Gießkanne.

*Linn. S. N. Sp.* 806.

*Belg.* Venus-Schagt. *Rumph. Angl.* The wattering Pot. Gall. L'arro-  
foir. *Dav.*



Testa tereti, extremitate Die runde Schale ist an  
lata, tubulis cylindricis per dem breiten Ende mit walzen-  
tula. förmigen Röhrchen durchsto-  
chen.

*Bonar. Mus. Kirch. cl. 1. f. 38.*

*Liss. Hist. Conch. 1. 4. f. 3. f. 3.*

*Rumph. amb. t. 41. f. 7.*

*Valent. Abb. t. 10. f. 87.*

*Petiv. amb. t. 12. f. 17.*

*Gualt. Test. t. 10. f. M.*

*Argenv. Conch. Pl. 3. f. 9.*

*Kuor. Vergn. IV. 28. t. 2. f.*


— — VI. 40. t. 1. f.

*Mart. Conch. Kab. I. 1. t. 7. f.*

— berl. Beschaeft. II. 11. t. 1 — 5. f.

*Müll. linn. Naturf. VI. 1. B. 3. f.*

*Da Cost. Elem. Pl. 2. f. 8.*



N O M I N A  
T R I V I A L I A  
O R D I N E A L P H A B E T I C O.

---

Benennungen  
d e r  
S o n c h y l i e n  
in alphabetischer Ordnung.

---

NOMENCLATOR GERMANICVS.  
Deutsche Benennungen.

|                 | Seite.         |
|-----------------|----------------|
| Ubrikofenstein  | 60. K. III. 5. |
| Uchatbirne      | 319. I. V. 16. |
| Admiralente     | 134. C. II. 2. |
| Uentenbrut      | 6. B. 6.       |
| Uftersturmhaube | 245. G. IV. 2. |

Ufter.



# NOMENCLATOR GERMANICVS.

|                          | Seite.          |
|--------------------------|-----------------|
| Astervenus blaustreifige | 53. K. II. 11.  |
| Agatmuschel              | 50. K. II. 8.   |
| Arche Noah               | 73. N. II. 1.   |
| Argus doppelter          | 158. D. I. 4.   |
| Argus Weibchen           | 172. D. IV. 1.  |
| Affel                    | 181. D. IV. 15. |
| Affelschnecke            | 276. H. II. 8.  |
| Auster gemeine           | 99. O. VI. 4.   |
| —— gezähnte              | 99. O. IV. 5.   |

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| <b>B</b> abelsturm     | 308. I. V. 1.   |
| Baffanmuschel          | 20. F. I. 5.    |
| Bandnadel braune       | 216. F. IV. 6.  |
| Band rothes            | 189. E. II.     |
| Bandspindel            | 321. I. V. 19.  |
| Bartarche              | 74. N. II. 2.   |
| Bartkneifer            | 12. D. 4.       |
| Bastardarche           | 75. N. III. 1.  |
| Bastardargus           | 156. D. I. 1.   |
| Bastardbauernmusik     | 134. C. II. 1.  |
| Bastarddrachenhöpfchen | 171. D. III. 3. |

Bastard.

# Deutsche Benennungen.

|                           | Seite.          |
|---------------------------|-----------------|
| Bastardlampe              | 379. N. II. 10. |
| Bastardmuschel gestumpfte | 103. P. 4.      |
| Bastardtelline            | 24. F. II. 6.   |
| Bastardvenus              | 45. K. I. 3.    |
| Bauernkappe               | 444. Q. IV. 5.  |
| Bauernmüß                 | 142. C. II. 12. |
| Beetken gekrühtes         | 239. G. II. 10. |
| Bernstein Muster          | 103. P. 3.      |
| Befangssegel              | 278. H. III. 3. |
| — — aufgewickelte         | 279. H. III. 4. |
| Befangsspindel gezackte   | 328. I. VI. 7.  |
| Bettzeug                  | 305. I. IV. 8.  |
| Bezoar grauer             | 241. G. III. 2. |
| — — glatter               | 242. G. III. 3. |
| Bienenkörbchen            | 364. L. III. 3. |
| Birne getrocknete         | 297. I. III. 8. |
| Birnwalze                 | 224. F. IV. 16. |
| Bischofsmütze             | 217. F. IV. 8.  |
| Blase offene              | 187. E. 7.      |
| Blasentafche              | 95. O. III. 3.  |
| Blasenwalze               | 205. F. III. 1. |
| Blätterkamm               | 107. Q. I. 2.   |
| Blaulippe                 | 56. K. II. 17   |

# MONENCLATOR GERMANICVS.

|                                | Seite.          |
|--------------------------------|-----------------|
| Blutohr                        | 400. N. IV. 6.  |
| Blutzahn                       | 420. O. III. 4. |
| Bocksaug                       | 434. Q. II. 5.  |
| Bockschnecke                   | 347. L. II. 1.  |
| Bohne                          | 208. F. III. 4. |
| Bohrer gefurchter              | 146. C. III. 3. |
| — — punktirter                 | 145. C. III. 1. |
| Bootshacke                     | 267. H. I. 3.   |
| Böcherbohrer                   | 192. E. 14.     |
| Brandstee                      | 176. D. IV. 7.  |
| Brandhorn                      | 291. I. II. 5.  |
| Brandnadel braune              | 214. F. IV. 2.  |
| Braunlippe                     | 51. K. II. 9.   |
| Breitrand                      | 365. L. IV. 4.  |
| Brunette                       | 151. C. III. 9. |
| Buchstabennadel                | 327. I. VI. 6.  |
| Buchstabenporzellane arabische | 157. D. I. 3.   |
| Bund türkischer                | 340. KII. 4.    |
| Butterwecke gelbe              | 139. C. II. 9.  |

**E**auris gefleckte

174. D. IV. 4.

Dach

# Deutsche Benennungen.

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| <b>D</b> ach Chinesisches | 350. L. II. 5.  |
| Delphin geribbter         | 361. L. III. 7. |
| — gezackter               | 360. L. III. 6. |
| Dianenflügel              | 272. H. II. 3.  |
| Dicklippe                 | 339. K. II. 3.  |
| Distelschnecke            | 304. I. IV. 7.  |
| Doppelribbe               | 366. L. V. 3.   |
| Dornspindel gefurchte     | 325. I. VI. 4.  |
| Dose gefurchte            | 39. O. II. 15.  |
| — gewölbte                | 93. O. II. 14.  |
| Dosenschnecke             | 245. G. IV. 3.  |
| Drachenhaupt              | 174. C. IV. 5.  |
| Dreneck                   | 41. I. 1.       |
| Dünnribbe                 | 46. K. I. 4.    |
| Dünnschale                | 164. D. I. 12.  |

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| <b>E</b> ckhorn | 252. G. VII. 1. |
| Eichelmuschel   | 69. M. 5.       |
| Eichenholztutte | 140. C. II. 10. |
| Eismuschel      | 94. O. III. 1.  |
| Elephantenzahn  | 449. R. 1.      |

# NOMENCLATOR GERMANICVS.

|                           | Seite.            |
|---------------------------|-------------------|
| Elster                    | 357. L. III. 3.   |
| Erbfenschotte             | 15. E. 3.         |
| Erdbeere rothe            | 33. G. 10.        |
| Eselchen                  | 170. D. III. 2.   |
| Eselohr                   | 429. P. 4.        |
| Estrich                   | 131. C. I. 8.     |
| En                        | 183. E. 1.        |
| Eyerdotter                | 414. O. I. 4.     |
| — geschobener             | 415. O. I. 5.     |
|                           |                   |
| Fahne                     | 118. R. 5.        |
| Fahnenmadel               | 214. E. IV. 3.    |
| Faltenklappe              | 65. L. 2.         |
| Faltenmund                | 376. N. II. 5.    |
| Faltenmadel               | 264. G. VIII. 13. |
| Faltenmerite              | 424. O. III. 9.   |
| Faltenpatelle             | 433. Q. II. 5.    |
| Faltenschnecke nezförmige | 212. F. III. 10.  |
| Faß                       | 231. G. I. 5.     |
| Feige                     | 190. E. 1.        |
| —— linksgewundene         | 313. I. V. 8.     |



# Deutsche Benennungen

|                           | Seite.          |
|---------------------------|-----------------|
| Feile                     | 95. O. III. 2.  |
| Felsengienmuschel         | 71. M. 8.       |
| Fensterseibe              | 105. P. 7.      |
| Festung                   | 434. Q. II. 4.  |
| Fischdarm                 | 454. S. 3.      |
| Fischernez                | 139. C. II. 8.  |
| Fischweiberhaube          | 430. Q. I. 1.   |
| Flachwirbel               | 376. N. II. 6.  |
| Flechtenröhre             | 453. S. 2.      |
| Fledermaus                | 219. F. IV. 11. |
| Fleischhorn               | 273. H. II. 1.  |
| — — — unächtes            | 314. I. V. 9.   |
| Fleischlinse              | 26. F. III. 3.  |
| Flügelschnecke gebänderte | 274. H. II. 6.  |
| Flußrabstkrone            | 405. N. VI. 1.  |
| Flußperlmuschel           | 11. D. 3.       |
| Frieselporzellane         | 179. D. IV. 12. |
| Froschschnecke            | 294. I. III. 2. |
| Fuchs                     | 160. D. I. 7.   |
| Fuchsthurm                | 215. F. IV. 5.  |
| Füllhorn                  | 371. M. 1.      |
| Fußhorn                   | 296. I. III. 6. |

# NOMENCLATOR GERMANICVS.

Seite.

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>G</b> artenbeetchen     | 238. G. II. 9.   |
| Gartenschnecke.            | 397. N. IV. 2.   |
| Gelbschmuz                 | 177. D. IV. 8.   |
| Gespens                    | 152. C. IV. 1.   |
| Gienmuschel niereenförmige | 69. M. 6.        |
| Gieskanne                  | 457. S. 9.       |
| Gitterhorn                 | 254. G. VII. 4.  |
| Gittervenus                | 57. K. II. 18.   |
| Glasbohrmuschel            | 104. P. 6.       |
| Glaschnirkel               | 394. N. III. 18. |
| Glaspatelle                | 442. Q. IV. 1.   |
| Goldmund                   | 349. L. III. 4.  |
| Gondel                     | 226. F. V. 2.    |
| Gurke glatte               | 208. F. III. 5.  |
| Gürtelschnecke             | 388. N. III. 10. |
| Gürtelspindel              | 317. I. V. 14.   |
| Gürtelvenus                | 58. K. III. 2.   |

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| <b>H</b> ahnenherz | 38. G. 18.     |
| Hahnenkamm         | 106. Q. I. 1.  |
| Halbmond           | 409. N. VI. 6. |

Hams

# Deutsche Benennungen

|                    | Seite.          |
|--------------------|-----------------|
| Hammer polnischer  | 97. O. IV. 1.   |
| Harfe              | 246. G. V. 1.   |
| Hausschnecke       | 297. I. III. 7. |
| Hermelinschwanz    | 141. C. II. 11. |
| Herz dreysseitiges | 30. G. 5.       |
| — gelbes           | 35. G. 13.      |
| — gelbmündiges     | 34. G. 12.      |
| — glattes          | 35. G. 14.      |
| — knottiges        | 32. G. 8.       |
| — schuppiges       | 29. G. 4.       |
| Herzmuschel breite | 37. G. 16.      |
| — geribbte         | 28. G. 1.       |
| — große            | 34. G. 11.      |
| — kammähnliche     | 37. G. 17.      |
| Herztute           | 123. C. I. 1.   |
| Hexenmeister       | 334. K. I. 5.   |
| Hochrücken         | 185. E. 4.      |
| Hohlohr            | 427. P. 1.      |
| Holzspindel        | 320. I. V. 18.  |
| Hornnerite         | 419. O. III. 2. |
| Hornschlange       | 455. S. 5.      |
| Hühnerdarm         | 457. S. 8.      |
| Hundszahn          | 451. R. 4.      |

# NOMENCLATOR GERMANICVS.

Seite.

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Huth spanischer | 438. Q. II. 10.  |
| —— gelber       | 441. Q. III. 6.  |
| Huthschnirkel   | 190. N. III. 13. |

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| <b>J</b> ägertasche | 83. O. I. 5.   |
| Jakobsmuschel       | 61. O. I. 2.   |
| Joch                | 184. E. 3.     |
| Jfabelle            | 169. D. II. 7. |
| Jujubenkräusel      | 342. K. II. 7. |

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| <b>K</b> äfermuschel kleine | I. A. 2.         |
| —— schuppige                | I. A. I.         |
| Käferschnecke               | 341. N. I. I.    |
| Kammauster                  | 98. O. IV. 3.    |
| Kammblat                    | 18. Q. I. 3.     |
| Kamelschnecke               | 276. H. III. 1.  |
| Kame'otchen                 | 425. O. III. 11. |
| Kammuschel scharfribbig     | 91. O. II. 12.   |
| Kammpatelle                 | 441. Q. III. 5.  |
| Kampfhahn                   | 271. H. II. 2.   |

Kamm

# Deutsche Benennungen.

Seite.

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Kammvenus                   | 61. K. III. 8.  |
| Kanarienschnecke breite     | 280. H. III. 6. |
| — — — höckerige             | 275. H. II. 7.  |
| — — — knottige              | 281. H. III. 7. |
| Kanarienvogel               | 251. G. VI. 2.  |
| Karkasschnecke              | 380. N. II. 11. |
| Käsetutte                   | 131. C. I. 8.   |
| Kastanie große              | 301. I. IV. 2.  |
| Kätzchen geflecktes         | 148. C. III. 6. |
| Käsenzunge                  | 17. F. I. 1.    |
| Kegel gedrehter             | 377. N. II. 7.  |
| Kegelschmirkel eingesäumter | 375. N. II. 4.  |
| Keil                        | 43. I. 1.       |
| Kiebitz                     | 187. E. 8.      |
| Kinkhorn gefurchtes         | 251. G. VI. 3.  |
| — — körniges                | 243. G. III. 4. |
| Klasmuschel bäuchige        | 10. D. 1.       |
| Klappmuschel gezackte       | 63. L. 1.       |
| Klauemmuschel               | 112. Q. III. 5. |
| Klebbaufter                 | 102. P. 1.      |
| Kleid attalisches           | 235. G. II. 5.  |
| Klöppelküssen               | 129. C. I. 5.   |
| Knöpfchen glattes           | 182. D. IV. 17. |



# NOMENCLATOR GERMANICVS.

|                             | Seite           |
|-----------------------------|-----------------|
| Knottenbund                 | 341. K. II. 5.  |
| Knottengitter               | 448. Q. V. 4.   |
| Knottennabel                | 410. O. I. 1.   |
| Knottenschelle              | 2 32. G. II. 1. |
| Knottenschnecke runzelichte | 303. I. IV. 6.  |
| Knottensturmhaube           | 235. G. II. 4.  |
| Kofferhörnchen weißes       | 244. G. IV. 1.  |
| Kompassmuschel              | 82. O. I. 4.    |
| Königsmantel                | 84. O. II. 1.   |
| Kopfspatelle                | 440. Q. III. 3. |
| Korallenmuschel             | 85. O. II. 2.   |
| Korbmuschel fahle           | 40. H. 2.       |
| — — sprenglerische          | 39. H. 1.       |
| Korbvenus                   | 52. K. II. 10.  |
| Kornelkirsche               | 206. F. III. 2. |
| — — eingestümmte            | 207. F. III. 3. |
| Körnerschild                | 435. Q. II. 6.  |
| Kornknöpfchen               | 182. D. IV. 16. |
| Krabbschnecke               | 269. H. I. 5.   |
| Krauschnecke                | 289. I. II. 3.  |
| Kräusel geförntes           | 343. K. II. 8.  |
| Kräuselschnecke gebänderte  | 396. K. I. 8.   |
| Kreidenschnecke             | 386. N. III. 7. |

# Deutsche Benennungen.

|                   | Seite.          |
|-------------------|-----------------|
| Kronenbacke       | 154. C. IV. 4.  |
| Krontute          | 125. C. I. 2.   |
| — — schwarzbraune | 126. C. I. 3.   |
| — — weisse        | 130. C. I. 6.   |
| Kröte             | 166. D. II. 4.  |
| Krötschnecke      | 292. I. III. 1. |
| Kuhaug            | 386. N. III. 8. |

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| <b>L</b> agermuschel | 53. K. II. 12.  |
| Lagervenus punktirte | 60. K. III. 6.  |
| Lagerwalze           | 197. F. II. 2.  |
| Landcharte           | 156. D. I. 2.   |
| Langohe              | 197. F. I. 2.   |
| Lanzennadel          | 261. G. VII. 9. |
| Laus                 | 179. D. IV. 13. |
| Livreeschnecke       | 298. I. III. 9. |
| Löffel               | 437. Q. II. 9.  |
| Lorbeerblatt         | 97. O. IV. 2.   |
| Löwentute            | 144. C. II. 14. |
| Luchoneserschnecke   | 274. H. II. 5.  |

# NOMENCLATOR GERMANICVS.

Seite.

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| <b>M</b> ahlermuschel | 11. D. 2.        |
| Mangosnadel           | 324. I. VI. 2.   |
| Mantel bandirter      | 87. O. II. 5.    |
| —— bunter             | 88. O. II. 7.    |
| —— gefleckter         | 90. O. VI. 9.    |
| —— gefurchter         | 86. O. II. 4.    |
| —— gewölbtter         | 84. O. I. 6.     |
| —— glatter            | 89. O. II. 8.    |
| —— goldgelber         | 91. O. II. 11.   |
| —— langer             | 86. O. VI. 3.    |
| —— menningrothe       | 88. O. II. 6.    |
| Marmornadel           | 402. N. V. 2.    |
| Marmorohr             | 428. P. 3.       |
| Masernporzellane      | 168. D. I. 11.   |
| Matrosenkappe         | 438. Q. III. 1.  |
| Maul krummes          | 299. I. III. 11. |
| Maulbeere gezackte    | 300. IV. 1.      |
| —— lange              | 302. I. IV. 4.   |
| Maulwurf              | 162. D. I. 9.    |
| —— — graue            | 161. D. I. 8.    |
| Maus                  | 163. D. I. 10.   |
| Mennonitentute        | 130. C. I. 7.    |

Men-

# Deutsche Benennungen.

|                         | Seite.          |
|-------------------------|-----------------|
| Menschenherz            | 28. G. 2.       |
| Meereiche grosse        | 2. B. 1.        |
| Meertulpe               | 4. B. 2.        |
| Messerheft              | 14. E. 2.       |
| Midasohr                | 196. F. I. 1.   |
| Miesmuschel gefärbte    | III. Q. III. 4. |
| —— geferbte             | 110. Q. III. 2. |
| —— geribbte             | 113. Q. III. 6. |
| —— gemeine              | 110. Q. III. 3. |
| Milchporzellane         | 163. D. I. 11.  |
| Milchschale             | 408. N. VI. 5.  |
| Mittelherz              | 31. G. 6.       |
| Mohr bandirter          | 310. I. V. 4.   |
| Mohrenbauch             | 164. D. II. 1.  |
| Mohrenkrone             | 225. F. V. 1.   |
| Mönch                   | 137. C. II. 5.  |
| —— grauer               | 138. C. II. 6.  |
| Mondschncke aschengraue | 356. L. III. 1. |
| —— — gefielte           | 361. L. III. 8. |
| —— — knottige           | 257. L. III. 3. |
| —— — kräuselartige      | 355. L. II. 12. |
| —— — sturmhaubenartige  | 354. L. II. 11. |

# NOMENCLATOR GERMANICVS.

|                                | Seite.          |
|--------------------------------|-----------------|
| Morgenstern ausgeschchnittener | 307. I. IV. 10. |
| Mundstück verkehrtes           | 378. N. II. 8.  |
| Musik wilde                    | 221. F. IV. 12. |
| Muskatenblüthe                 | 70. M. 7.       |
| Muskatennuß                    | 253. G. VII. 2. |
| Münze guineische               | 172. D. IV. 2.  |
| Münze                          | 432. Q. II. 2.  |
| Münze polnische                | 237. G. II. 7.  |

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| <b>N</b> abelberg  | 29. G. 3.         |
| Nabels knecke      | 387. N. III. 9.   |
| Nadel aschengraue  | 262. N. VIII. 1.  |
| —— durchgestochene | 216. F. IV. 7.    |
| —— durchstochene   | 263. G. VIII. 2.  |
| —— geferbte        | 259. G. VIII. 6.  |
| —— gekrönte        | 258. G. VIII. 5.  |
| —— gestriegelte    | 260. G. VIII. 7.  |
| —— knottige        | 282. H. IV. 1.    |
| —— rostfarbige     | 258. G. VIII. 4.  |
| —— umwundene       | 261. G. VIII. 10. |



# Deutsche Benennungen.

|                    | Seite.           |
|--------------------|------------------|
| Nadel weiße        | 257. G. VIII. 3. |
| Nadelseile         | 329. F. IV. 2.   |
| Nadelwalze rauhe   | 213. F. VI. 8.   |
| Nagelherz          | 31. G. 7.        |
| Nähnadel           | 260. G. VIII. 8. |
| Napfſchnecke blaue | 436. Q. II. 7.   |
| — — — drenkielige  | 439. Q. III. 2.  |
| — — — einseitige   | 440. Q. III. 4.  |
| Narrenkappe        | 66. M. 1.        |
| Nassauer           | 347. L. II. 2.   |
| Neptungsdose       | 82. O. I. 3.     |
| Merite braune      | 413. O. I. 3.    |
| — — — bruttragende | 418. O. III. 1.  |
| Nezhorn            | 255. G. VII. 5.  |
| Nezſchnecke        | 299. I. III. 10. |
| Neztute bandirte   | 138. C. II. 7.   |
| Notenſchnecke      | 218. F. IV. 10.  |

**N**chsendarm

456. S. 7.

Dſenherz unächtes

49. K. II. 6.

# NOMENCLATOR GERMANICVS.

|                      | Seite.          |
|----------------------|-----------------|
| Deßkuchen eckiger    | 295. I. III. 6. |
| — — — geribbter      | 295. I. III. 4. |
| — — — knottiger      | 194. I. III. 3. |
| Deßkrug              | 353. L. II. 50. |
| Ohr gestreiftes      | 428. P. 2.      |
| Ohrhorn              | 407. N. VI. 3.  |
| Olivenkern           | 210. F. III. 7. |
| Olivenwalze          | 198. F. II. 2.  |
| Orangenkegel         | 133. C. I. 11.  |
| Orianiensopprer      | 147. C. III. 4. |
| Ost- und Westmuschel | 36 G. 15.       |

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| <b>P</b> abstrone  | 217. F. IV. 9.  |
| Pagodenschnecke    | 350. L. II. 6.  |
| Pantoffel          | 431. Q. I. 2.   |
| Papierhaube        | 236. G. II. 6.  |
| Papierrolle        | 188. E. 9.      |
| Papusmuschel       | 113. Q. III. 7. |
| Pelleronnerite     | 422. O. III. 7. |
| Perlmutter         | 108. Q. II. 1.  |
| Perspektivschnecke | 333. K. I. 3.   |

Pferz

# Deutsche Benennungen.

|                            | Seite.           |
|----------------------------|------------------|
| Pferdefuß                  | 67. M. 3.        |
| Pferdehuf dorniger         | 71. M. 9.        |
| Pharaoſchnecke             | 333. K. I. 4.    |
| Pilgrimsmuſchel            | 8. O. I. 1.      |
| Pimpelchen                 | 303. I. IV. 5.   |
| Platwirbel                 | 147. C. III. 5.  |
| Podagraſchnecke            | 268. H. I. 4.    |
| Polierzahn                 | 451. R. 5.       |
| Porzellanblaſe             | 193. E. 15.      |
| Poſthorn                   | 122. B. 2.       |
| Prinzenfahne               | 193. E. 16.      |
| Purpurhorn gehörntes       | 286. I. I. 5.    |
| Purpurchnecke dreyflüglige | 287. I. II. 1. ° |
| — — — dreyſeitige          | 288. I. III. 2.  |
| — — — vieleckige           | 292. I. II. 6.   |
| Pyramide glatte            | 330. K. I. 1.    |
| — — knottige               | 331. K. I. 2.    |

**M**autenkörbchen

76. N. III. 2.

Nebhum

229. G. I. 2.

Neisbrey Mondſchnecke

346. L. I. 2.

Neis

# NOMENCLATOR GERMANICVS.

|                        | Seite.          |
|------------------------|-----------------|
| Reiskorallenporzellane | 180. D. IV. 14. |
| Ring                   | 173. D. IV. 3.  |
| Rinne                  | 13. E. I.       |
| Röhre dreyeckige       | 452. S. I.      |
| Rostfleckchen          | 177. D. IV. 9.  |
| Rothmund               | 148. G. V. 3.   |
| Rübe                   | 191. E. 13.     |
| Rübe dicke             | 306. I. IV. 9.  |
| —— langschnabelige     | 312. I. V. 6.   |
| Rudolphsſchnecke       | 247. G. V. 2.   |
| Runzelbund             | 352. L. II. 8.  |
| Runzelgitter           | 446. Q. V. 2.   |
| Runzelklappe           | 100. O. IV. 6.  |

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| <b>S</b> afrankräusel | 343. K. II. 9.  |
| Säge                  | 42. I. 4.       |
| Salzkornporzellane    | 166. D. II. 3.  |
| Sammetmüſchel         | 78. N. IV. 2.   |
| Sandpfeife            | 455. S. 6.      |
| Sandtelline           | 25. F. III. 1.  |
| Sandrutte             | 143. C. II. 13. |

# Deutsche Benennungen.

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Sattel polnischer             | 101. O. IV. 7.   |
| Säumchen gefaltenes           | 241. G. III. 1.  |
| Scharfribbe                   | 366. L. V. 2.    |
| Scheibenschnecke              | 375. N. II. 3.   |
| Schellenhorn                  | 228. G. I. 1.    |
| Schellenschnecke französische | 195. E. 17.      |
| Schiffsboot dicker            | 121. B. 1.       |
| Schiffsfahne                  | 345. K. III. 2.  |
| Schildkrötennapf              | 442. Q. IV. 2.   |
| Schildkrötenpocke             | 5. B. 5.         |
| Schildkrötenporzellane        | 159. D. I. 5.    |
| Schildkrötentute              | 137. C. II. 3.   |
| Schilomuschel ächte           | 62. K. IV. 1.    |
| Schinken                      | 24. F. II. 5.    |
| Schinke edle                  | 116. R. 2.       |
| — — geräucherte               | 116. R. 1.       |
| — — lange                     | 117. R. 4.       |
| Schlammischnecke              | 384. N. III. 4.  |
| Schlangehaut                  | 353. L. II. 9.   |
| Schlangehorn                  | 390. N. III. 12. |
| Schlangekopf                  | 103. P. 5.       |
| — — — der grosse              | 165. D. II. 2.   |
| Schlauchdattel dicke          | 202. F. II. 3.   |
| Schminkpflasterchen           | 302. I. IV. 3.   |

Schnauz



# NOMENCLATOR GERMANICVS

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Schnauzennadel                    | 323. I. VI. 1.   |
| Schnepfenkopf dorniger            | 286. I. I. 4.    |
| — — — gezackter                   | 285. I. I. 3.    |
| Schnepfennadel gedörnte           | 326. I. VI. 5.   |
| Schnepfenschnabel                 | 282. I. I. 1.    |
| Schnirkel gefleckter              | 380. N. II. 12.  |
| — — verkehrter                    | 391. N. III. 15. |
| Schnirkelmondschnecke             | 355. L. II. 13.  |
| Schnirkelnadel abgestuzte         | 401. N. V. 1.    |
| — — — braune                      | 404. N. V. 5.    |
| — — — gefaltene                   | 403. N. V. 3.    |
| — — — gefleckte                   | 404. N. V. 4.    |
| Schnirkelscheibe                  | 382. N. III. 2.  |
| Schnirkelschnecke ausgeschnittene | 378. N. II. 9.   |
| — — blaue                         | 392. N. III. 16. |
| — — bunte                         | 398. N. IV. 4.   |
| — — dickschalige                  | 408. N. VI. 4.   |
| — — gemalte                       | 397. N. IV. 3.   |
| — — lebendig gebährende           | 393. N. III. 17. |
| — — offene                        | 399. N. IV. 5.   |
| Schnurbund                        | 342. K. II. 6.   |
| Schnurwalze                       | 212. F. IV. 1.   |
| Schraube alte                     | 567. L. V. 4.    |
| — — bunte                         | 365. L. V. 1.    |

Schup-

# Deutsche Benennungen.

|                                 | Seite.           |
|---------------------------------|------------------|
| Schuppenbezoar                  | 238. G. II. 8.   |
| Schüsselfchen                   | 90. O. II. 10.   |
| Schwalbe                        | 170. D. III. 1.  |
| Schwarzung                      | 178. D. IV. 11.  |
| Schwarzohr                      | 400. D. IV. 7.   |
| Schweizerhose gezackte          | 277. H. III. 2.  |
| Schwimmuschnecke breitspurchige | 426. O. III. 13. |
| — dicklippige                   | 412. O. I. 2.    |
| — gefiederte                    | 420. O. III. 5.  |
| — gespurchte                    | 416. O. I. 7.    |
| — geribbte                      | 424. O. III. 10. |
| — glatte                        | 421. O. III. 6.  |
| — grüne                         | 419. O. III. 3.  |
| — stumpfe                       | 423. O. III. 8.  |
| Seenuß                          | 68. M. 4.        |
| Seepocke                        | 3. B. 2.         |
| Seetonne                        | 344. K. III. 1.  |
| Segler breitkieliger            | 120. A. I. β.    |
| — papierner                     | 119. A. I.       |
| — schmalkieliger                | 119. A. I. α.    |
| Silbermund bunter               | 359. L. III. 5.  |
| — geribbter                     | 358. L. III. 4.  |
| — grüner                        | 348. L. II. 3.   |

# MONENCLATOR GERMANICVS.

|                          | Seite.          |
|--------------------------|-----------------|
| Skorpionschnecke         | 290. I. II. 4.  |
| Smaragdschnecke          | 249. G. V. 5.   |
| Sommersprosse            | 271. H. II. 1.  |
| Sonnenhorn               | 337. K. I. 10.  |
| Sonnenschirm             | 436. Q. II. 8.  |
| Sonnenstrahl gestreifter | 18. F. I. 3.    |
| — glatter                | 23. F. II. 4.   |
| — kleiner                | 25. F. II. 7.   |
| Spalte                   | 445. Q. V. 1.   |
| Spielmuschel             | 52. K. II. 7.   |
| Spindel französische     | 309. I. V. 3.   |
| — gefleckte              | 317. I. V. 13.  |
| — gezackte               | 312. I. V. 7.   |
| — javanische             | 309. I. V. 2.   |
| — indische               | 311. I. V. 5.   |
| — nordische              | 315. I. V. 11.  |
| — rothbraune             | 318. I. V. 15.  |
| — zweykeelige            | 314. I. V. 10.  |
| Spinne                   | 283. I. I. 2.   |
| Spizdattel               | 203. F. II. 4.  |
| Spizsäule                | 338. K. II. 1.  |
| Spizenrolle              | 150. C. III. 8. |
| Sporn                    | 351. L. II. 7.  |

# Deutsche Benennungen,

|                           | Seite,           |
|---------------------------|------------------|
| Stachelnadel höckerige    | 325. I. VI. 3.   |
| — schwarze                | 329. I. VI. 9.   |
| Staatenfahne              | 189. E. 10.      |
| Steinbohrer               | 7. C. 1.         |
| — geribbter               | 8. C. 2.         |
| Steinchen                 | 248. G. V. 4.    |
| Steinkern                 | 92. O. II. 13.   |
| Steinmuschel              | 109. Q. III. 1.  |
| Steckmuschel gedornzte    | 117. R. 3.       |
| Sternnadel                | 265. H. I. 1.    |
| Sternpatelle              | 432. Q. II. 1.   |
| Sternporzellane           | 178. D. IV. 10.  |
| Strahlgitter              | 447. Q. 5. 3.    |
| Strahlpatelle             | 443. Q. IV. 3.   |
| Strahlscheibe             | 61. K. III. 7.   |
| Strahlscheide blaue       | 15. E. 4.        |
| Strandmondschnecke        | 346. L. I. 1.    |
| Strandnerite              | 417. O. II. 2.   |
| Stricknadel               | 256. G. VIII. 1. |
| Strohhut                  | 444. Q. IV. 4.   |
| Stümpfchen                | 42. I. 3.        |
| Stumpfmuschel stachlichte | 41. I. 2.        |

# NOMENCLATOR GERMANICVS.

|                        | Seite.          |
|------------------------|-----------------|
| Sturmhaube dicklippige | 230. G. I. 3.   |
| — gefurchte            | 230. G. I. 4.   |
| — gestricke            | 233. G. II. 2.  |
| — rothe                | 234. G. II. 3.  |
| <br>                   |                 |
| Tasche rauhe           | 96. O. III. 4.  |
| — wellenförmige        | 94. O. II. 16.  |
| Täubchen               | 279. H. III. 4. |
| — brütendes            | 209. F. III. 6. |
| — traurendes           | 211. F. III. 9. |
| Taubeney               | 186. E. 6.      |
| Teichhorn              | 406. N. IV. 2.  |
| Tellmuschel blaßrothe  | 21. F. II. 1.   |
| — dreyeckige           | 27. F. III. 4.  |
| — dunkelrothe          | 22. F. II. 2.   |
| — eckige               | 19. F. I. 4.    |
| — runzelichte          | 18. F. I. 2.    |
| — scharfrandige        | 22. F. II. 3.   |
| — schuppige            | 26. F. III. 2.  |
| — unächte              | 20. F. I. 6.    |
| Tiegnadel              | 257. G. VII. 2. |



# Deutsche Benennungen.

## Seite.

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Tiegerporzellane | 167. D. II. 5.  |
| Tiegertute       | 127. C. I. 4.   |
| Tiegerzunge      | 158. K. III. 1. |
| Topf             | 227. F. V. 3.   |
| Treppe           | 250. G. VI. 1.  |
| Trinkschale      | 445. Q. IV. 6.  |
| Tritonschnecke   | 316. I. V. 12.  |
| Trommelschraube  | 368. L. V. 6.   |
| — gestreifte     | 368. L. V. 5.   |
| Tulpe            | 153. C. IV. 3.  |
| Tute guineische  | 136. C. II. 4.  |

## Vase

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| — gezackte         | 221. F. IV. 13. |
| — rothmündige      | 223. F. IV. 15. |
| — rothmündige      | 222. F. IV. 14. |
| Venusmuschel achte | 44. K. I. 1.    |
| — aderige          | 59. K. III. 4.  |
| — ausgefehlte      | 48. K. II. 4.   |
| — breitblättrige   | 48. K. II. 3.   |
| — gereifte         | 47. K. II. 2.   |
| — schiefe          | 49. K. II. 5.   |

# NOMENCLATOR GERMANICVS.

|                      | Seite.          |
|----------------------|-----------------|
| Venusmuschel warzige | 46. K. II. 1.   |
| — weißbackige        | 55. K. II. 5.   |
| — weitlippige        | 54. K. II. 13.  |
| — wellenförmige      | 54. K. II. 14.  |
| Vielfußschnecke      | 270. H. I. 16.  |
| Vogeldarm            | 454. S. 4.      |
| Vogelfuß             | 266. H. I. 2.   |
| Vogelmuschel         | 114. Q. III. 8. |
| Vortreppe            | 320. I. 5. 17.  |

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| <b>W</b> achsschnirkel | 374. N. II. 2.   |
| Wafelmuschel           | 56. K. II. 17.   |
| Waldhorn               | 383. N. III. 3.  |
| Waldschnecke           | 395. N. IV. 1.   |
| Walffischpoche         | 4. B. 4.         |
| Walzenporzellane       | 169. D. II. 8.   |
| Warzendotter           | 415. O. I. 6.    |
| Warzenschnirkel        | 391. N. III. 14. |
| Waschbecken            | 66. M. 2.        |
| Weberspuhl kleiner     | 184. E. 2.       |


# Deutsche Benennungen

|                           | Seite            |
|---------------------------|------------------|
| Weib altes                | 45. K. I. 2.     |
| Weibchen armes            | 210. F. III. 8.  |
| Weinbergsschnecke gemeine | 385. N. III. 5.  |
| — links gewundene         | 385. N. III. 6.  |
| Weißaug                   | 175. D. IV. 6.   |
| Weitaug                   | 160. D. I. 6.    |
| Wellenhorn                | 253. G. VII. 3.  |
| Wellenmerite              | 425. O. III. 10. |
| Wellenspindel             | 322. I. V. 20.   |
| Wendeltreppe achte        | 362. L. IV. 1.   |
| — gemeine                 | 363. L. IV. 2.   |
| Wirbelhorn                | 389. N. III. 11. |
| Wirbelschnecke            | 335. K. I. 7.    |
| Witderhorn                | 383. N. III. 3.  |
| Wolfesjahn                | 450. R. 3.       |
| Wolkenbacke               | 153. C. IV. 2.   |
| Wolkenrolle               | 149. C. II. 7.   |
| Wulst                     | 186. E. 5.       |
| Wulstknöpfchen            | 338. K. II. 2.   |
| Würfelträufel             | 336. K. I. 9.    |

# NOMENCLATOR GERMANICVS.


Seite.

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Zähnen gestreiftes     | 449. R. 2.      |
| Zahnschraube gestochte | 369. L. V. 7.   |
| Zahnwirbel             | 381. N. II. 13. |
| Ziegelherz             | 32. G. 9.       |
| Zirkelbohrer           | 145. C. III. 2. |
| Zirkelscheibe          | 59. K. III. 3.  |
| Zwibelschale           | 102. P. 2.      |
| Zwirntute              | 132. C. I. 10.  |



# NOMENCLATOR BELGICVS.

## Holländische Benennungen.



|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| <b>A</b>               | Pag.              |
| doublet, de griekische | 53. K. II. 12.    |
| Aardbesie              | 33. G. 10.        |
| Achaat - gaapcr        | 51. K. II. 8.     |
| Achaatje               | 200. F. II. 2. 7. |

Achaat-

# Hollandsche Benennungen.

|                       | Pag.             |
|-----------------------|------------------|
| Achaat-peor           | 319. I. V. 16.   |
| Achaat-toot           | 154. C. IV. 3.   |
| Adama-doublet         | 93. O. II. 14.   |
| Admiral, opper        | 134. C. II. 2.   |
| Alykruik              | 346. L. I. 1.    |
| — geworte             | 426. O. III. 13. |
| Arabische Lettershorn | 157. D. I. 3.    |
| Arakans-garen         | 132. C. I. 10.   |
| Arke Noachs foort.    | 74. N. II. 2.    |
| Argus, dubbelde       | 158. D. I. 4.    |
| Argus Oogen, gebande  | 295. I. III. 4.  |

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| <b>B</b> aardnyper    | 12. D. 4.      |
| Babilonfe Tooren      | 308. I. V. 1.  |
| Bacaffan doublet      | 20. F. I. 3.   |
| Bagyne-drolle         | 331. K. I. 2.  |
| Bak gekroonde         | 225. F. V. 1.  |
| Bakje bruingebandeerd | 193. E. 15.    |
| Bandpen               | 214. F. IV. 4. |
| — genobelde           | 216. F. IV. 6. |
| Banket hammetje       | 24. F. II. 5.  |



# NOMENCLATOR BELGICVS.

|                           | Pag.            |
|---------------------------|-----------------|
| Bastert - Argus           | 156. D. I. 1.   |
| Bastert - Oranje Admiral  | 146. C. III. 3. |
| Bastert - tygers katje    | 134. C. II. 1.  |
| Bastert - Wewers spoeltje | 184. E. 2.      |
| Beddetje, gestreepte      | 239. G. II. 10. |
| Belhorn, fransche         | 195. E. 17.     |
| — geknobbelde             | 232. G. II. 1.  |
| — geplekte                | 231. G. I. 5.   |
| — geribbde                | 228. G. I. 1.   |
| Bernsteen - Oester        | 103. P. 3.      |
| — paarsche                | 102. P. 3.      |
| Beuldouplet               | 15. E. 3.       |
| Bezaan Knop, getaakte     | 318. I. VI. 7.  |
| Bezaantje                 | 278. H. III. 3. |
| — opgerolde               | 279. H. III. 5. |
| Bezoar, geschubde         | 238. G. II. 8.  |
| — gevlackte               | 239. G. II. 9.  |
| Boerenjonge               | 252. G. VII. 1. |
| Boeren Myflik             | 142. C. II. 12. |
| Boetje                    | 210. F. III. 7. |
| Bokje                     | 347. L. II. 1.  |
| Bonne je                  | 432. Q. II. 1.  |
| Bonje                     | 208. F. III. 4. |

Boots-

# Holländische Benennungen

|                      | Pag.            |
|----------------------|-----------------|
| Bootshaak Wuifje     | 267. H. I. 3.   |
| Bostrappen           | 320. I. V. 17.  |
| Boterweg             | 140. C. II. 9.  |
| Brana Hoorn dubbelde | 291. I. II. 5.  |
| Brandvlakje          | 176. D. IV. 7.  |
| Broinet - toot       | 151. C. III. 9. |
| Buitslakje           | 338. K. II. 1.  |
| Bultje               | 279. H. III. 4. |
| — gevoord            | 250. G. VI. 1.  |

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| <b>C</b> altanje, bandeerde | 301. I. IV. 2. |
|-----------------------------|----------------|

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| <b>D</b> aadel   | 198. F. II. 2.  |
| — swarte         | 201. F. II. 2.  |
| Davids harp      | 246. G. V. 1.   |
| Diklip           | 339. K. II. 3.  |
| Dokje huifje     | 119. A. 1.      |
| Dolphyn, getakte | 360. L. III. 6. |
| Doyer, platte    | 415. O. I. 5.   |

Draakje

# NOMENCLATOR BELGICVS.

|                   | Pag.            |
|-------------------|-----------------|
| Draakje           | 175. D. IV. 5.  |
| Duifje, broedende | 209. F. III. 6. |
| Duizend been      | 270. H. I. 6.   |

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| <b>E</b> cken - houts toot | 140. C. II. 10. |
| Eende - Schulpe            | 6. B. 6.        |
| Ezeltje                    | 171. D. III. 2. |

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| <b>F</b> oelie - Bladeren | 70. M. 7.      |
| Fonteinbak                | 66. M. 2.      |
| Fortrefse                 | 434. Q. II. 3. |

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| <b>G</b> apper, eeviger | 8. C. 2.        |
| Gelsmetje               | 177. D. IV. 8.  |
| Geneefche toot          | 136. C. II. 4.  |
| Gnemoë hoorn            | 317. I. V. 13.  |
| Goldlaken               | 150. C. III. 8. |

Goud-

# Holländische Benennungen.

|          | Pag.             |
|----------|------------------|
| Goudmond | 349. L. II. 4. ° |
| Grasje   | 432. Q. II. 2.   |

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| <b>H</b> aanekam  | 106. Q. I. 1.    |
| — getakte         | 107. Q. I. 2.    |
| Hammetje, gedoord | 117. R. 3.       |
| Hart, blaafagtig  | 37. G. 16.       |
| Hart toot         | 124. C. I. 1. α. |
| — roodt           | 124. C. I. 1. β. |
| Hermelin Staart   | 141. C. II. 11.  |
| Holzeeor, groot   | 427. P. 1.       |
| Honds darm        | 456. S. 7.       |
| Hoogruggetje      | 186. E. 5.       |
| Hornslangetje     | 457. S. 8.       |

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| <b>J</b> aager - Weytafch   | 83. O. I. 5.  |
| Jacobs - doublet, fpaanfche | 81. O. I. 2.  |
| Jacobs Kruck                | 226. F. V. 2. |

# NOMENCLATOR BELGICVS.

|                  | Pag.           |
|------------------|----------------|
| Jacobs - schulp. | 81. O. I. 1.   |
| Jamboeze, witte  | 185. E. 4.     |
| Indian           | 311. I. V. 5.  |
| Jokje            | 185. E. 3. °   |
| Joppe - doublet  | 82. O. I. 3.   |
| Isabelle         | 169. D. II. 7. |
| Juffertje, rood  | 25. F. II. 7.  |

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| <b>K</b> aaphorn  | 156. D. I. 2.    |
| Kaas, groene      | 132. C. I. 9.    |
| Kamelhoorn        | 276. H. III. 1.  |
| Kamelotje         | 425. O. III. 11. |
| Kanartje, gebande | 275. H. II. 7.   |
| — geblomde        | 280. H. III. 6.  |
| — gebulde         | 281. H. III. 7.  |
| Kapje, gedooted   | 435. Q. II. 5.   |
| Kapje, geele      | 444. Q. IV. 4.   |
| — gestraalte      | 436. Q. II. 7.   |
| Karkal            | 380. N. II. 11.  |
| Kasket, graeuwe   | 241. G. III. 2.  |



# Holländische Benennungen.

|                           | Pag.              |
|---------------------------|-------------------|
| Katetonge                 | 18. F. I. 1.      |
| Katje, geplekte           | 148. C. III. 6.   |
| —— blaauwe                | 170. D. III. 1.   |
| Kauris blaauwe            | 173. D. IV. 3.    |
| —— gemeene geele          | 173. D. IV. 2.    |
| Kemphaantje               | 271. H. II. 2.    |
| Kievits - Ey              | 188. E. 8.        |
| —— witte                  | 187. E. 6.        |
| Kindje, gebakerde         | 364. L. IV. 3.    |
| Kinkhorn                  | 316. I. V. 12.    |
| Kliphorn, getygerde       | 167. D. II. 5.    |
| Knobbelhorn               | 321. I. V. 19.    |
| — bonte                   | 354. L. II. 10.   |
| Knoll, geknobbelde        | 306. I. IV. 9.    |
| — langestaarte gladde     | 312. I. V. 6.     |
| Knollhorn                 | 191. E. 13.       |
| Kofferhoortje             | 244. G. IV. 1.    |
| Kokhaan, bonte            | 38. G. 18.        |
| Kompas - Schulp           | 82. O. I. 4.      |
| Königs Mantel             | 84. O. II. 1.     |
| Koral - doublet           | 85. O. II. 2.     |
| Korelye - Knoopje         | 182. D. IV. 16.   |
| Kornoelkersje gestippelte | 207. F. III. 2.β. |

# NOMENCLATOR BELGICVS.

|                         | Pag.               |
|-------------------------|--------------------|
| Kornoeltje, gebandeerde | 206. F. III. 2. 2. |
| Kousdoublet, gestreepte | 45. K. I. 3.       |
| Krabbe, geele           | 269. H. I. 5.      |
| Kroon - hoorn           | 125. C. I. 2.      |
| — tuetee                | 126. C. I. 5.      |
| Knipers - Boor          | 192. E. 14.        |
| — gegranuleerde         | 145. C. III. 1.    |
| — gladde                | 251. G. VI. 2.     |
| — witte gevoorde        | 145. C. III. 2.    |
| Kwaker, gestraalde      | 52. K. II. 10.     |
| Kwalle-Bootje           | 393. N. III. 16.   |

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| <b>L</b> andcharten, westindische | 144. C. II. 14. |
| Laurierblad                       | 97. O. IV. 2.   |
| — gekamd                          | 108. Q. I. 3.   |
| Lazarus Klappen, getakte          | 64. L. I.       |
| Leger, turkische                  | 61. K. III. 6.  |
| Letterschulp, langaagtige         | 62. K. IV. 1.   |
| Livrey - hoorn                    | 298. I. III. 9. |
| Loboensche Hoorntje               | 274. H. II. 5.  |

# Holländische Benennungen

|                         | Pag.             |
|-------------------------|------------------|
| Lotskap                 | 439. Q. III. I.  |
| <b>M</b> aagt - Bloem   | 75. N. III. I.   |
| Malpriem                | 256. G. VIII. I. |
| Mantel, gebandeerde     | 87. O. II. 5.    |
| — — gestippelte         | 89. O. II. 7.    |
| Mauger Naalde           | 324. I. VI. 2.   |
| Mazelen                 | 168. D. II. 6.   |
| Mennonist - toot        | 130. C. I. 7.    |
| Meshammer               | 97. O. IV. 1.    |
| Messehecht              | 14. E. 2.        |
| Midas - Oor             | 196. F. I. 1.    |
| Modervlakje             | 244. G. III. 5.  |
| Moerberzie, langverpige | 302. I. IV. 4.   |
| Moerbey, getakte        | 300. I. IV. 1.   |
| — — graeuwe             | 276. H. II. 8.   |
| Mol                     | 162. D. I. 9.    |
| — graeuwe               | 161. D. I. 8.    |
| — roode                 | 161. D. I. 7.    |
| Monniks - Kappe         | 216. F. IV. 7.   |
| Mossel                  | 110. Q. III. 3.  |
| — breede purpuragtige   | 113. Q. III. 5.  |

# NOMENCLATOR BELGICVS.

|                | Pag.              |
|----------------|-------------------|
| Muis           | 163. D. I. 10.    |
| Munnik graeuwe | 201. F. II. 2. 2. |
| — —            | 137. C. II. 5.    |
| Musikhoorn     | 218. F. IV. 10.   |
| — — wilde      | 221. F. IV. 11.   |
| Muts poolfche  | 171. D. III. 3.   |
| — —            | 237. G. II. 7.    |

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| <b>N</b> aalde - pen      | 260. G. VIII 7. |
| Nagel doublet , gedoornte | 31. G. 7.       |
| Nagel - schulp            | 32. G. 9.       |
| Navel - Slak              | 387. N. III. 9. |
| — —                       | 410. O. I. 1.   |
| Net - toetje              | 138. C. II. 7.  |
| Noachs Arck , rechte      | 73. N. II. 7.   |
| Noote Moskat , getakte    | 253. G. VII. 3. |

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| <b>O</b> cean - hoorn | 289. I. II. 5. |
| Oester                | 99. O. IV. 2.  |

# Holländische Benennungen.

|                           | Pag.             |
|---------------------------|------------------|
| Oester gedraaide          | 72. N. I. 1.     |
| —— okergeele              | 71. M. 8.        |
| Offerhoorn, witte         | 224. F. IV. 16.  |
| Oistelhoortje             | 304. I. IV. 7.   |
| Olyfants, tand            | 449. R. 1.       |
| Olyhoorn, diklippige      | 230. G. I. 3.    |
| Olykock, gebulde          | 294. I. III. 3.  |
| Oorhoorn                  | 299. I. III. 11. |
| Oorschulp, witte          | 408. N. VI. 5.   |
| Oranje - Mantel           | 92. O. II. 12.   |
| Orgelpypen                | 13. E. 1.        |
| Ost en West - doublet     | 36. G. 15.       |
| Oude Wyfschulp gerimpelde | 45. K. I. 2.     |

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| <b>P</b> aadchoorn               | 292. I. III. 1. |
| Paardevoetje                     | 67. M. 3.       |
| Paertje                          | 182. D. IV. 17. |
| Pantofeltje                      | 431. Q. I. 2.   |
| Papier - turkse, zonder lippen   | 236. G. II. 6.  |
| — — — porcellain horn            | 164. D. I. 12.  |
| Papier-Kasket, volwasse turksche | 235. G. II. 4.  |



# NOMENCLATOR BELGICVS.

|                                | Pag.              |
|--------------------------------|-------------------|
| Papiere Nautilus, breed kielde | 120. A. I. β.     |
| Parlslakke                     | 121. B. 1.        |
| Patelle getepelte              | 440. Q. III. 3.   |
| — — griekifche                 | 446. Q. V. 2.     |
| Patrys horn                    | 229. G. I. 2.     |
| Paufe Kroon                    | 218. F. IV. 9.    |
| — — — westindifche             | 325. I. VI. 4.    |
| Pelicans - Poot                | 266. H. I. 2.     |
| Pen, gekartede                 | 258. G. VIII. 5.  |
| — — — omwondene                | 261. G. VIII. 10. |
| Pennhoorn                      | 217. F. IV. 8.    |
| — — — rauwe                    | 213. F. IV. 2.    |
| Peer, gedroyede                | 297. I. III. 8.   |
| Perle - moer fchulp            | 108. Q. II. 1.    |
| — — — — lange                  | 429. P. 4.        |
| Perspectiv - hoorn             | 333. K. I. 3.     |
| Petool - hoorn                 | 343. L. II. 2.    |
| Pickenier                      | 261. G. VIII. 9.  |
| Pimpeltje                      | 203. I. IV. 5.    |
| Piffeped                       | 181. D. IV. 15.   |
| Podagra - Krefst               | 268. H. I. 4.     |
| Poelorontje                    | 422. O. III. 7.   |
| Pofferdoubled, gerib'd         | 78. N. IV. 1.     |

# Holländische Benennungen.

|                            | Pag.              |
|----------------------------|-------------------|
| Pokje                      | 174. D. IV. 4.    |
| Porphyrr Daadel            | 197. F. II. 1.    |
| Porphyrrsteene Daadel      | 200. F. II. 2. 5. |
| Porcelain hoorn            | 183. E. 1.        |
| Posthoorentje              | 122. B. 2.        |
| Posthoorn , europische     | 382. N. III. 1.   |
| — — gebandeerde            | 388. N. III. 10.  |
| Prince Begræfenis          | 199. F. II. 2. 9. |
| Prince Robertshoorn        | 334. K. I. 4.     |
| Prince - Vlag              | 193. E. 16.       |
| Pruim                      | 209. F. III. 5.   |
| Purper - Hoorn gebandeerde | 287. I. I. 5.     |

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| <b>P</b> aap             | 312. I. V. 7.   |
| Ramshoorn                | 383. N. III. 3. |
| Raspdoublet              | 95. O. III. 2.  |
| Remies                   | 25. F. III. 1.  |
| Rivier Pauze Kroon       | 405. N. VI. 1.  |
| Rood . bandje            | 190. E. 11.     |
| Rood - Oog               | 418. O. III. 1. |
| Rootshoorn met Moesjeses | 302. I. IV. 3.  |

# NOMENCLATOR BELGICVS.

|                       | Pag.            |
|-----------------------|-----------------|
| Rorzdoulet            | 71. M. 9.       |
| Rys - Korrel          | 180. D. IV. 14. |
| Ryftenbry - hoorentje | 243. G. III. 4. |

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| <b>S</b> cheppertje         | 283. I. I. 1.    |
| Scherfje                    | 49. K. II. 5.    |
| Shild , getygerd            | 442. Q. IV. 2.   |
| Schildpad - hoorn           | 159. D. I. 5.    |
| Schildpad Luis              | 5. B. 5.         |
| Schildpad - toot            | 136. C. II. 4.   |
| Schildpastaert , gedoorende | 305. I. IV. 8.   |
| Schout by Nagt              | 125. C. I. I. 1. |
| Schwitzersbroek , capitaale | 222. F. IV. 14.  |
| — — — — getakte             | 223. F. IV. 15.  |
| Scorpioentje                | 290. I. II. 4.   |
| See - Noot                  | 78. N. IV. 2.    |
| Slange - Kop                | 165. D. II. 2.   |
| — — — — kleene              | 164. D. II. 1.   |
| Slangen Vellehoorn          | 352. L. II. 9.   |
| Slangetje                   | 390. N. III. 12. |

# Holländische Benennungen.

|                         | Pag.            |
|-------------------------|-----------------|
| Slek - hoorn            | 416. O. I. 6.   |
| Slet                    | 61. K. III. 7.  |
| Sluik - daadel          | 202. F. II. 3.  |
| Slyk - Slek             | 384. N. III. 4. |
| Snippckop , gedoornde   | 285. I. I. 3.   |
| — getakte               | 285. I. I. 4.   |
| Snuite - pen, gedoornde | 326. I. VI. 5.  |
| Soldat                  | 358. L. III. 3. |
| Sooftolatje             | 177. D. IV. 9.  |
| Speeldoubllet           | 50. K. II. 7.   |
| Speldewerk kuffen       | 129. C. I. 5.   |
| Spinnekop               | 284. I. I. 2.   |
| Spockje                 | 152. C. IV. 1.  |
| Spoor                   | 351. L. II. 7.  |
| Spraetje                | 271. H. II. 1.  |
| Staate Vlagetje         | 189. E. 10.     |
| Starre - pen , dikke    | 265. H. I. 1.   |
| Steenbikker             | 374. N. II. 1.  |
| Steen - moffel          | 109. Q. III. 1. |
| Steenfcheede            | 7. C. 1.        |
| Sterretje               | 178. D. IV. 10. |
| Stombje                 | 42. I. 3.       |
| Stormhoed , gebreide    | 233. G. II. 2.  |

# NOMENCLATOR BELGICVS.

|                                | Pag.           |
|--------------------------------|----------------|
| Stormhoed, geribd westindische | 236. G. II. 5. |
| — — — roode                    | 234. G. II. 3. |
| Strand - Doyer                 | 414. O. I. 4.  |

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| <b>T</b> abaks - pip             | 310. I. V. 3.    |
| Tand, ploedige                   | 420. O. III. 4.  |
| Teepel bak                       | 227. F. V. 3.    |
| Telline, platzydige              | 24. F. II. 5.    |
| Tellmoffel, roode with straalige | 23. F. II. 4.    |
| Toll, gevlake                    | 331. K. I. 1.    |
| — langleevende                   | 351. L. II. 6.   |
| Toornje                          | 215. F. IV. 5.   |
| Toover - Slak                    | 373. N. I. 1.    |
| Top - Slak                       | 391. N. III. 15. |
| Tovenaar                         | 334. K. I. 5.    |
| Transparant                      | 105. P. 7.       |
| Trommel - Schroef                | 368. L. V. 5.    |
| Tuitje, witte                    | 323. I. VI. 1.   |
| Tulbande                         | 340. K. II. 4.   |
| Tulband, gerimpelde              | 352. L. II. 8.   |
| Tulpen                           | 4. B. 3.         |

Tyger-



# Holländische Benennungen.

|                      | Pag.             |
|----------------------|------------------|
| Tyger - pen , dunne  | 257. G. VIII. 2. |
| Tyger - tong , wilde | 58. K. III. 1.   |

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| <b>V</b> aas , witte           | 221. F. IV. 13. |
| Vellhorn                       | 297. I. III. 7. |
| Venus - doublet , geribde      | 28. G. 1.       |
| Venus hart                     | 28. G. 2.       |
| — driezydig                    | 30. G. 5.       |
| Venus Schagt                   | 457. S. 9.      |
| Venus schulp , rechte met Hair | 44. K. I. 1.    |
| Vjsch huifje                   | 430. Q. I. 1.   |
| Vlagetje                       | 345. K. III. 2. |
| Vleermuis                      | 219. F. IV. 11. |
| Vleeshoorn                     | 273. H. II. 4.  |
| Vleugelhoorn , getakte         | 277. H. III. 2. |
| Vleugelhoorntje                | 287. I. II. 1.  |
| — geplekte                     | 288. I. II. 2.  |
| Vliegge schettje               | 143. C. II. 13. |
| Vloerken , italianfche         | 131. C. I. 8.   |
| Voethoorn                      | 196. I. III. 6. |
| Vogeltje                       | 114. Q. III. 8. |

# NOMENCLATOR BELGICVS.


|                                | Pag.            |
|--------------------------------|-----------------|
| Vorfchen - poppe               | 294. I. III. 2. |
| Vyg , fpaanfche                | 190. E. 12.     |
| <b>W</b> afelyfer              | 56. K. II. 17.  |
| Wenteltrap                     | 362. L. IV. 1.  |
| Wenteltrapje                   | 363. L. IV. 2.  |
| Whulk                          | 254. G. VII. 3. |
| — noordfche                    | 315. I. V. 11.  |
| Witooge                        | 175. D. IV. 6.  |
| Wit - rugge , cartageenfche    | 167. D. II. 4.  |
| Wolftand , witte               | 451. R. 4.      |
| Wolkbakje                      | 153. C. IV. 2.  |
| Wolkhoorn                      | 149. C. III. 7. |
| Wolkje                         | 154. C. IV. 4.  |
| Wydmonder                      | 247. G. V. 2.   |
| Wyd - Oog                      | 160. D. I. 6.   |
| Wyfje , kleene , van den Argus | 172. D. IV. 1.  |
| Wyngards - Slak                | 385. N. III. 5. |
| Wyzer                          | 272. H. II. 3.  |

# Holländische Benennungen.

|                     | Pag.            |
|---------------------|-----------------|
| <b>Z</b> laagertje  | 42. I. 4.       |
| Zadel, poolſche     | 101. O. IV. 7.  |
| Zandmoffel          | 114. Q. III. 7. |
| Zeeohr, geſtrepte   | 428. P. 2.      |
| Zeepocke            | 3. B. 2.        |
| Zeepuiſten          | 2. B. 1.        |
| Zeefchelling        | 4. B. 4.        |
| Zeeslangetje        | 455. S. 5.      |
| Zeeton              | 334. L. II. 3.  |
| Zee Vloog           | 179. D. IV. 13. |
| Zilverlaken         | 152. C. IV. 1.  |
| Zilvermond          | 348. L. II. 3.  |
| — — bonte           | 359. L. III. 5. |
| — — geplekte        | 358. L. III. 4. |
| Zoomtje, geſtreepte | 241. G. III. 2. |
| — gladde            | 242. G. III. 3. |
| Zooneltraal         | 19. F. I. 3.    |
| — rooſe roodt       | 16. E. 5.       |
| — violet blauwe     | 16. E. 4.       |
| Zotskap             | 66. M. 1.       |
| Zoute Koreltje      | 166. D. II. 3.  |

NOMENCLATOR GALLICVS.

Französische Benennungen.



|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| <b>A</b> dmiral, faux orange | 146. C. III. 3.  |
| — — — grand                  | 134. C. II. 2.   |
| Agate bossue                 | 202. F. II. 3.   |
| Agathine                     | 319. I. V. 16.   |
| Aigrette                     | 221. F. IV. 13.  |
| Aile d'ange                  | 271. H. II. 2.   |
| Aile de papillon             | 136. C. III. 4.  |
| Ailée bossue                 | 275. H. II. 7.   |
| — — — grande                 | 277. H. III. 2.  |
| Alene                        | 261. G. VIII. 9. |
| Amande                       | 62. K. III. 8.   |
| Amande a cils                | 74. N. II. 2.    |
| Ane, petit                   | 171. D. III. 2.  |
| Antale                       | 451. R. 4.       |
| Araignée femelle             | 267. H. I. 3.    |
| — male                       | 269. H. I. 5.    |
| Arche de Noe                 | 73. N. II. 1.    |

# Französische Benennungen.

|                      | Pag.            |
|----------------------|-----------------|
| Arculaire blanc      | 244. G. IV. 1.  |
| Argus a boutons      | 295. I. III. 4. |
| Argus, faux          | 157. D. I. 3.   |
| — — grand            | 158. D. I. 4.   |
| — — petit            | 172. D. IV. 4.  |
| Arlequine, la fausse | 157. D. I. 3.   |
| Arrofoir             | 457. S. 9.      |
| Assemblage de bojaux | 454. S. 3.      |
| Astrolepas           | 432. Q. II. 1.  |

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| <b>B</b> aquet bandé | 193. E. 15.     |
| Becasse epineuse     | 284. I. I. 2.   |
| Bigourneau           | 346. L. I. 1.   |
| Bistournée           | 72. N. I. 1.    |
| Bois de chene        | 140. C. II. 10. |
| Bonnet de Dragon     | 439. Q. III. 1. |
| — polonois           | 171. D. III. 2. |
|                      | 237. G. II. 7.  |
| Bouffue              | 185. E. 3.      |
| Bouche d' Argent     | 348. L. II. 3.  |
| — — — bariolée       | 358. L. III. 4. |

Bouche



# NOMENCLATOR GALLICVS.

|                    | Pag.            |
|--------------------|-----------------|
| Bouche d'or        | 349. L. II. 4.  |
| — — petite         | 186. E. 5.      |
| Bouclier de Tortue | 442. Q. IV. 2.  |
| Bout de Chandelle  | 130. C. I. 7.   |
| Bouton de Camifole | 334. K. I. 4.   |
|                    | 338. K. II. 1.  |
| Brocard de Soye    | 154. C. IV. 3.  |
| Brunette           | 151. C. III. 9. |
| Buccin unique      | 313. I. V. 8.   |
| Bulle d'eau        | 187. E. 6.      |

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| <b>C</b> abochon    | 430. Q. I. 1.   |
| Cadran              | 333. K. I. 3.   |
| Came coupée         | 41. I. 1.       |
| — marquée de Verges | 50. K. II. 7.   |
| — truitée           | 51. K. II. 8.   |
| Campement turque    | 61. K. III. 6.  |
| Carte géographique  | 156. D. I. 2.   |
| Casque Bezoard      | 241. G. III. 2. |
| — cannelé, gros     | 239. G. II. 10. |
| — pavé              | 238. G. II. 8.  |

Cas-

# Französische Benennungen.

|                       | Pag.             |
|-----------------------|------------------|
| Casque plume          | 236. G. II. 6.   |
| — trinangulaire       | 235. G. II. 4.   |
| — tricoté             | 233. G. II. 2.   |
| — truité              | 239. G. II. 9.   |
| — tuberculé           | 232. G. II. 1.   |
| Chagrin               | 18. F. I. 1.     |
| Chameau               | 276. H. III. 1.  |
| Chataigne a bandes    | 301. I. IV. 2.   |
| Chauße trappe         | 223. F. IV. 15.  |
| — — —                 | 289. I. II. 3.   |
| Chaeuve Souris        | 219. F. IV. 11.  |
| Chenille blanche      | 223. I. VI. 1.   |
| Chicorée              | 291. I. II. 5.   |
| Cloniffe              | 46. K. II. 1.    |
| Cloporte              | 181. D. IV. 15.  |
| Cloud                 | 256. G. VIII. 1. |
| Cocombre pointée      | 208. F. III. 4.  |
| Coeur allongée        | 69. M. 5.        |
| Cocur en Arche de Noe | 75. N. III. 1.   |
| Cocur de boeuf        | 66. M. 1.        |
| — epincux             | 31. G. 7.        |
| — tuillé              | 32. G. 9.        |
| Cocur enflé           | 37. G. 16.       |

# NOMENCLATOR GALLICVS.

|                                  | Pag.               |
|----------------------------------|--------------------|
| Coeur triangulaire               | 30. G. 5.          |
| — de Venus                       | 28. G. 2.          |
| Colique                          | 173. D. IV. 3.     |
| Conque anatifere                 | 6. B. 6.           |
| — exotique                       | 28. G. 1.          |
| — de St. Jaques, bariolée        | 81. O. I. 1.       |
| — perſique                       | 247. G. V. 2.      |
| — de Venus, a pointes            | 44. K. I. 1.       |
| Contre Admiral                   | 125. C. I. 1. γ.   |
| Coq bigaré                       | 38. G. 18.         |
| Coquette                         | 302. I. IV. 3.     |
| Coquille de St. Jaques d'Eſpagne | 81. O. I. 2.       |
| Coralline                        | 85. O. II. 2.      |
| Cornalline                       | 200. F. II. 2. γ.  |
| Corne d'Amon                     | 122. B. 2.         |
| Cornouille faſciée               | 206. F. III. 2. α. |
| — ponctuée                       | 207. F. III. 2. β. |
| Couronne d'ethiopie              | 225. F. V. 1.      |
| — — imperiale                    | 125. C. I. 2.      |
| Crapaud                          | 167. D. II. 4.     |
| Crete de Coq                     | 107. Q. I. 2.      |
| Cuiller de Neptune               | 226. F. V. 2.      |

# Französische Benennungen.

|                   | Pag.            |
|-------------------|-----------------|
| Cuillère          | 437. Q. II. 8.  |
| Culotte de Suisse | 294. I. III. 3. |

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>D</b> ail  | 7. C. i.          |
| Damier        | 127. C. I. 4.     |
| Datte         | 109. Q. III. 1.   |
| Dauphin       | 360. L. III. 6.   |
| Degrés bordés | 297. I. III. 8.   |
| Dent de loup  | 450. R. 3.        |
| Dentale       | 449. R. 1.        |
| Drap d'argent | 236. G. II. 5.    |
| — mortuaire   | 199. F. II. 2. 8. |
| — d'or        | 150. C. III. 8.   |
| — a réseau    | 139. C. II. 8.    |

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| <b>E</b> braïque  | 221. F. IV. 12. |
| — — —             | 142. C. II. 12. |
| — la fausse       | 134. C. II. 1.  |
| Ecaille de tortue | 136. C. II. 3.  |
| Ecorchée          | 149. C. III. 7. |

# NOMENCLATOR GALLICVS.

|                   |                |
|-------------------|----------------|
|                   | Pag.           |
| Ecriture arabe    | 62. K. IV. 1.  |
| — — grecque       | 53. K. II. 12. |
| l'Emeraude        | 249. G. V. 5.  |
| Enfant au maillot | 364. L. IV. 3. |
| Entonnoir         | 445. Q. IV. 6. |
| l'Eperon          | 351. L. II. 7. |
| l'Eventail        | 82. O. I. 4.   |

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| <b>F</b> aitiere  | 66. M. 2.        |
| Feuille           | 108. Q. I. 3.    |
| — de Choux        | 67. M. 3.        |
| — de Laurier      | 97. O. IV. 2.    |
| Figue             | 190. E. 12.      |
| Flamboyante       | 129. C. I. 5.    |
| Foret             | 260. G. VIII. 7. |
| Forteresse        | 434. Q. II. 3.   |
| Fraise rouge      | 33. G. 10.       |
| Fripiere          | 355. L. II. 12.  |
| Furie flamboyante | 77. N. III. 3.   |
| Fuséau            | 310. I. V. 3.    |
| — étoilé          | 265. H. I. 1.    |



# Französische Benennungen.

|                          | Pag.             |
|--------------------------|------------------|
| <b>G</b> ateau feuilleté | 70. M. 7.        |
| Gibeciere en Manteau     | 83. O. I. 5.     |
| Gland de mer rayé        | 3. B. 2.         |
| — — tulipè               | 2. B. 1.         |
| — — turban               | 4. B. 3.         |
| Gondolée rayée           | 189. E. 10.      |
| Gourgandine              | 51. K. II. 9.    |
| Grelée                   | 166. D. II. 3.   |
| Grenouillette            | 294. I. III. 4.  |
| Grimace                  | 299. I. III. 11. |
| Gueule de Loup           | 373. N. I. 1.    |
| — — noire                | 274. H. II. 5.   |
| — — de souris            | 115. Q. III. 6.  |
| Guilochée                | 26. F. III. 2.   |

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| <b>H</b> arpè   | 246. G. V. 1.   |
| Herisson        | 300. I. IV. 1.  |
| Hermine         | 132. C. I. 9.   |
| Hirondelle      | 114. Q. III. 8. |
| Huitre          | 99. O. IV. 4.   |
| — d'ambre jaune | 103. P. 3.      |

# NOMENCLATOR GALLICVS.

Pag.

Huitre ecailleuse a feuilles

couleur de citron

71. M. 8.

— électrique

102. P. 2.

— epineuse

64. L. 1.

**J**amaïque

60. K. III. 5.

Jambonneau epineux

117. R. 3.

Indienne

311. I. V. 5.

Isabelle

169. D. II. 7.

**L**ampe antique

379. N. II. 10.

Lanterne rouge rayonnée de blanc

16. E. 5.

Lard

305. I. IV. 8.

Leopard rouge

124. C. I. I. α.

Lepas granuleux

435. Q. II. 5.

Levantine

46. K. I. 4.

Lievre

159. D. I. 5.

**M**anche de Couteau

13. E. 1.

— — courbée

15. E. 3.

Mon-

# Französische Benennungen.

|                           | Pag.              |
|---------------------------|-------------------|
| Manche de couteau femelle | 13. E. 2.         |
| Monteau bandé             | 87. O. II. 5.     |
| — — ducal                 | 84. O. II. 1.     |
| — — d'orange              | 92. O. II. 12.    |
| — — pointillé             | 89. O. II. 7.     |
| Marteau                   | 97. O. IV. 1.     |
| Massue la grande          | 285. I. I. 3.     |
| — — d' Hercule            | 286. I. I. 4.     |
| — — lisse                 | 312. I. V. 6.     |
| Mere Perle                | 108. Q. II. 1.    |
| Mignature                 | 216. F. IV. 6.    |
| Milleped                  | 270. H. I. 6.     |
| Minaret                   | 216. F. IV. 6.    |
| Minime                    | 138. C. II. 6.    |
| Misaine roulée            | 279. H. III. 5.   |
| Monnoye de Guinée         | 173. D. IV. 2.    |
| Moresque                  | 201. F. II. 2. A. |
| Moskat                    | 253. G. VII. 2.   |
| Moule                     | 110. Q. III. 3.   |
| — arborifée               | 111. Q. III. 4.   |
| — des peintres            | 11. D. 2.         |
| — de la terre des Papous  | 114. Q. III. 7.   |
| Mure allongée             | 302. I. IV. 4.    |

# NOMENCLATOR GALLICVS.

|         | Pag.            |
|---------|-----------------|
| Muscade | 188. E. 8.      |
| Musique | 218. F. IV. 10. |

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| <b>N</b> appe d' Italie | 131. C. I. 8.         |
| Nassavienne             | 347. L. II. 2.        |
| Navet                   | 132. C. I. 10.        |
| — a longue queue        | 312. I. V. 7.         |
| Navette petite          | 184. E. 2.            |
| Nautile a cloisons      | 121. B. 1.            |
| Nautile papyracé        | 119. A. 1.            |
| — — a carene retrecie   | 119. A. 1. $\alpha$ . |
| — — a large carene      | 120. A. 1. $\beta$ .  |
| Noix de mer             | 78. N. IV. 2.         |

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| <b>O</b> belisc chinois | 328. I. VI. 3.            |
| Oeil de bouc            | 434. Q. II. 4.            |
| Oeuf                    | 183. E. 1.                |
| Olive                   | 198. F. II. 2.            |
| Olive de satin          | 201. F. II. 2. $\kappa$ . |
| — satinée a bandes      | 200. F. II. 2. $\zeta$ .  |

# Französische Benennungen.

|                  | Pag.           |
|------------------|----------------|
| Oreille d'ane    | 272. H. II. 3. |
| — — —            | 429. P. 4.     |
| — de Cochon      | 106. Q. I. 1.  |
| — — —            | 273. H. II. 4. |
| — de Geant       | 352. L. II. 9. |
| — de Mer, grande | 427. P. 1.     |
| — marbrée        | 428. P. 3.     |
| — striée         | 428. P. 2.     |
| — de Midas       | 196. F. I. 1.  |
| — de Venus       | 408. N. VI. 5. |
| l'Oublie         | 188. E. 9.     |

|                  |                |
|------------------|----------------|
| <b>P</b> agode   | 351. L. II. 7. |
| Parafole         | 436. Q. II. 5. |
| Patte de Crapaud | 290. I. VI. 4. |
| — — d'Oie        | 266. H. I. 2.  |
| Peau d'ane       | 174. D. IV. 4. |
| — — de Chagrin   | 144. C. II. 6. |
| — — de Tigre     | 167. D. I. 12. |
| Pelote de beurre | 140. C. II. 9. |
| Pelure d'oignon  | 102. P. 1.     |
| Perdrix          | 229. G. I. 2.  |



# NOMENCLATOR GALLICVS.

|                               | Pag.            |
|-------------------------------|-----------------|
| Perdrix a grosse levre        | 230. G. I. 3.   |
| Petrole sans Oreilles         | 78. N. I. 1.    |
| Pholade, grande de l'Amerique | 8. C. 2.        |
| Picotée                       | 148. C. III. 6. |
| Pie                           | 358. L. III. 3. |
| Pigeon couvant                | 209. F. III. 6. |
| Pigeonne                      | 279. H. III. 4. |
| Pince de Chirurgien           | 24. F. II. 5.   |
| Piquure de Mouche             | 143. C. II. 13. |
| Planorbe , grand              | 382. N. III. 1. |
| — — terrestre                 | 374. N. II. 1.  |
| Pointillage blanc             | 175. D. IV. 6.  |
| Poire seche                   | 297. I. III. 8. |
| Porcellaine étoilée           | 178. D. IV. 10. |
| — — marbrée                   | 164. D. I. 12.  |
| Porphyre                      | 197. F. II. 1.  |
| Pou de Baleine                | 4. B. 4.        |
| — de Men                      | 179. D. IV. 13. |
| Poulette                      | 104. P. 6.      |
| Pourpre a bandes              | 287. I. I. 5.   |
| — — tacheté                   | 288. I. II. 2.  |
| — — triangulaire ailé         | 287. I. II. 1.  |
| Prune                         | 209. F. III. 5. |

# Französische Benennungen.

Pag.

**Q**uacre rayonné

52. K. II. 12.

Quenotte

420. O. III. 4.

Queue d'Hermine

141. C. II. 12.

**R**acrocheufe

292. I. III. 1.

Radix

191. E. 13.

— le gros

306. I. IV. 9.

Ratiffoir

95. O. III. 2.

Rave

224. F. IV. 16.

Rezeau blanc

57. K. II. 18.

Rhinoceros

296. I. III. 6.

Ruban

193. E. 16.

**S**abot marbré

331. K. I. 1.

Sandale

431. Q. I. 2.

Scalata, fausse

363. L. IV. 2.

— — vraie

362. L. IV. 1.

Scarabée

103. P. 5.

# NOMENCLATOR GALLICVS.

|                  | Pag.           |
|------------------|----------------|
| Scie             | 42. I. 4.      |
| Scorpion         | 268. H. I. 4.  |
| Selle de Pologne | 101. O. IV. 7. |
| Soleil levant    | 15. E. 4.      |
| Sorciere         | 334. K. I. 5.  |
| Souris           | 163. D. 10.    |
| Spectre          | 152. C. IV. 1. |

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| <b>T</b> apis                      | 321. I. V. 19.  |
| Tarriere                           | 192. E. 14.     |
| — blanche et cerclée               | 145. C. III. 2. |
| — chagrinée                        | 145. C. III. 1. |
| Tasse de Neptune                   | 227. F. V. 3.   |
| Taupe                              | 162. D. I. 9.   |
| — rousse                           | 161. D. I. 7.   |
| Telescope                          | 344. K. III. 1. |
| Telline bariolée de violet & blanc | 20. F. I. 5.    |
| — fluviatile                       | 12. D. 3.       |
| — radiée                           | 19. F. I. 3.    |
| — rayée de couleur de chair        | 20. F. I. 5.    |


# Französische Benennungen.

|                  | Pag.            |
|------------------|-----------------|
| Tete de Becasse  | 283. I. I. I.   |
| — de Dragon      | 175. D. IV. 5.  |
| — de Meduse      | 433. Q. II. 2.  |
| — de Serpent     | 165. D. II. 2.  |
| — — —            | 271. H. II. 1.  |
| — — petite       | 164. D. II. 1.  |
| Tiare episcopale | 217. F. IV. 8.  |
| — papale         | 218. F. IV. 9.  |
| Tigre noir       | 124. C. I. 1.   |
| Tonne cannelée   | 228. G. I. 1.   |
| — dentelée       | 231. G. I. 5.   |
| Tour de Babel    | 308. I. V. 1.   |
| — de Coppenhague | 250. I. VI. 1.  |
| Tourterelle      | 278. H. III. 3. |
| Treillis         | 446. Q. V. 2.   |
| Tricotée         | 56. K. II. 17.  |
| Tronquée         | 42. I. 3.       |
| Truitée          | 168. D. II. 6.  |
| Tulipe           | 154. C. IV. 3.  |
| Turban rouge     | 234. G. II. 3.  |

## NOMENCLATOR GALLICVS.

|                                      | Pag.             |
|--------------------------------------|------------------|
| <b>V</b> erniculaires blanc & trian- |                  |
| gulaires                             | 452. S. I.       |
| Verole petite                        | 180. D. IV. 14.  |
| Vieille ridée                        | 45. K. I. 2.     |
| Vilebrequin                          | 455. S. 5.       |
| Vis de pressoir                      | 260. G. VIII. 8. |
| Vis tigrée                           | 257. G. VIII. 2. |
| Vitre chinoise                       | 105. P. 7.       |
| Volute panachée                      | 152. C. III. 10. |

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| <b>Z</b> ig - zag | 54. K. II. 13. |
|-------------------|----------------|



## NOMENCLATOR ANGLICVS.

### Englische Benennungen.

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| <b>A</b> gathe Chama    | 51. K. II. 8.  |
| Amber - Oyster, small   | 103. P. 3.     |
| Amboina scallop, common | 83. O. I. 3.   |
| Arabian - shell         | 62. K. IV. 1.  |
| Arck, spotted           | 78. N. IV. 1.  |
| — virgin                | 75. N. III. 1. |

Ar-



# Englische Benennungen.

|                              | Pag.             |
|------------------------------|------------------|
| Argus, little Wife of        | 172. D. IV. 1.   |
| Argus shell                  | 158. D. I. 4.    |
| Argus shell, girdled         | 293. I. III. 5.  |
| Ass Gowry                    | 171. D. III. 2.  |
| Augur Peg, speckled          | 192. E. 14.      |
|                              |                  |
| <b>B</b> abel Shell          | 308. I. V. 1.    |
| Balanus, great, wide mouthed | 4. B. 3.         |
| — — grey, narrow mouthed     | 3. B. 2.         |
| Barnacle, common english     | 2. B. 1.         |
| — — tortoise wart            | 5. B. 5.         |
| Batt Musik stamper, long     | 219. F. IV. 11.  |
| Beetle Porcelaine            | 177. D. IV. 9.   |
| Bischops Miter shell         | 217. F. IV. 8.   |
| Blaaws stamper               | 126. C. I. 3.    |
| Black - moors - tooth        | 173. D. IV. 2.   |
| Blobber - lip                | 266. H. I. 2.    |
| Bodkin, tooth'd              | 258. G. VIII. 5. |
| Brittle Saylor, course       | 120. A. I. 3.    |
| — — — great                  | 119. A. I. a.    |
| Broadlip, horned             | 172. H. II. 3.   |

Broad-

# NOMENCLATOR ANGLICVS.

|                  | Pag.           |
|------------------|----------------|
| Broadlip knobb'd | 271. H. II. 1. |
| Buff Gowry       | 161. D. I. 7.  |
| Burg's Stamper   | 134. O. II. 3. |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>C</b> ados Shell, wide  | 292. I. III. 1.  |
| Cake Shell, thik - lipd    | 390. N. III. 12. |
| Caltrup Shell              | 289. I. II. 3.   |
| Camel - Nerit              | 425. O. III. 11. |
| Camp                       | 197. F. II. 1.   |
| — turkische                | 61. K. III. 6.   |
| Canary, broad knobbed      | 280. H. III. 6.  |
| — girdled                  | 275. H. II. 7.   |
| — great                    | 278. H. III. 3.  |
| — hunch - bakt             | 279. H. III. 4.  |
| — long knobbed             | 280. H. III. 7.  |
| Canoe Shell, smal indian   | 431. Q. I. 2.    |
| Carpe muscle, deep furowed | 113. Q. III. 6.  |
| Caroline muscle            | 114. Q. III. 7.  |
| Cartagena Gowry            | 167. D. II. 4.   |
| Ceram Coronet              | 225. F. V. 1.    |
| Ceram Spuc - Shell         | 223. F. IV. 13.  |
| Chain Stamper, small       | 146. C. III. 3.  |

Cha-

# Englische Benennungen.

|                                      | Pag.            |
|--------------------------------------|-----------------|
| Chama, truncated, smouthed           | 51. K. II. 9.   |
| — violet and white                   | 41. I. 1.       |
| Cheefe Shell, great, girdled, Brasil | 383. N. III. 3. |
| — great, River                       | 382. N. III. 1. |
| — Land                               | 374. N. II. 1.  |
| Cheker Cockle, grained               | 58. K. III. 1.  |
| Chesnut, great                       | 301. I. IV. 2.  |
| Cloudy - Stamper                     | 154. C. IV. 4.  |
| Cockle, with heary streaks           | 78. N. IV. 2.   |
| Cocquet                              | 302. I. IV. 2.  |
| Conch, large                         | 277. H. III. 2. |
| Corall scallop                       | 83. O. I. 5.    |
| Couvin                               | 346. L. I. 1.   |
| Cross Cokle                          | 62. K. III. 8.  |
| Crown, papal                         | 218. F. IV. 9.  |
| Crown stamper                        | 125. C. I. 2.   |
| Curry Comb Oyster                    | 106. Q. I. 1.   |

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| <b>D</b> evils Claw, female | 267. H. I. 3.   |
| Diamond stamper, blak       | 142. C. II. 12. |
| Dice Gowry cloudy           | 250. G. VI. 1.  |

Dice

# NOMENCLATOR ANGLICVS.

|                   | Pag.           |
|-------------------|----------------|
| Dice Nerit        | 410. I. 1.     |
| Dog - tooth Shell | 451. R. 4.     |
| Doyer whelk       | 414. O. I. 4.  |
| Dragon Gowry      | 175. D. IV. 5. |
| Dvelwe Fingers    | 270. H. I. 6.  |

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| <b>E</b> ar, hairy | 299. I. III. 11. |
| — white            | 408. N. VI. 5.   |
| Ear - Shell, great | 427. P. 1.       |
| Endive Shell       | 291. I. II. 4.   |
| Egg Gowry, white   | 183. E. 1.       |
| Elephan's - tooth  | 449. R. 1.       |

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| <b>F</b> ary stamper | 152. C. IV. 1.  |
| Feather Stamper      | 236. G. II. 6.  |
| Finger Oyster great, | 107. Q. I. 2.   |
| Flying Muscle        | 114. Q. III. 8. |
| Fortresse            | 434. Q. II. 3.  |

Fur.

# Englische Benennungen.

|            | Pag.             |
|------------|------------------|
| Furrow pen | 261. G. VIII. 9. |
| Fyg wheelk | 190. E. 12.      |

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| <b>G</b> arter stamper | 132. C. I. 10.  |
| Giants Ear, great      | 352. L. II. 9.  |
| Goats Ey Limpet        | 434. Q. II. 4.  |
| Goldbrocade            | 150. C. III. 8. |
| Goose Shell            | 6. B. 6.        |
| Govry saffron toothed  | 168. D. II. 6.  |
| Saltspekled            | 166. D. II. 3.  |
| — whit eyed            | 175. D. IV. 6.  |
| Grain Cockle           | 32. G. 8.       |
| Grain Girdled stamper  | 146. C. III. 3. |
| Grater - scallop       | 95. O. III. 2.  |
| Green stamper          | 132. C. I. 9.   |

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| <b>H</b> am Muscle, priley | 117. R. 3.    |
| Hammer Oyster              | 79. O. IV. 1. |
| Harp Shell                 | 246. G. V. 1. |



# NOMENCLATOR ANGLICVS.

|                     | Pag.           |
|---------------------|----------------|
| Heart Cockle exotic | 28. G. 1.      |
| — — girdled         | 58. K. III. 2. |
| — — human           | 28. G. 2.      |
| Hebrew Gowry, great | 156. D. I. 1.  |
| Hogs Ear - Oyſter   | 108. Q. I. 3.  |
| Honez Comb Cockle   | 127. C. I. 4.  |
| Horſe - hoof        | 67. M. 3.      |

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| St. <b>J</b> ames Cockle | 81. O. I. 1.   |
| Indian Dipper            | 188. E. 8.     |
| Iſabelle Gowry           | 169. D. II. 7. |

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| <b>K</b> asket, knot - liſted | 232. G. II. 1.  |
| — — —                         | 233. G. II. 2.  |
| — — ſmal curl'd               | 241. G. III. 1. |
| — — ſmooth, gray              | 241. G. III. 2. |
| — — ſmooth, lipd              | 242. G. III. 3. |
| Kasket Shell red              | 234. G. II. 3.  |
| Knob fingers                  | 268. H. I. 4.   |
| Koſſer Shell, ſmall           | 244. G. IV. 1.  |

# Englische Benennungen.

Pag.

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| <b>L</b> eghorn Govry kin, small | 185. E. 3.      |
| Leopard, great                   | 167. D. II. 5.  |
| Leopard - stamper, great yellow  | 140. C. II. 9.  |
| Lighter, twisted                 | 27. N. I. 1.    |
| Limped béaked                    |                 |
| — — craked Barnstable            | 445. Q. V. 1.   |
| — — thimble                      | 446. Q. V. 2.   |
| — — wart rib'd                   | 448. Q. V. 4.   |
| — — white, rib'd                 | 432. Q. II. 1.  |
| Lohoe broad - lip                | 274. H. II. 5.  |
| Loufe - Gowry                    | 179. D. IV. 13. |

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| <b>M</b> agos Peg    | 324. I. VI. 2.   |
| Magpye. top Shell    | 358. L. III. 3.  |
| Maiden - Muscle      | 44. K. I. 1.     |
| Mantel scallop ducal | 48. O. II. 1.    |
| Map - Shell          | 158. D. I. 4.    |
| Marble date, purple  | 200 F. II. 2. 8. |
| Massle Gowry, long   | 174. D. IV. 4.   |
| Melon, clouded       | 226. F. V. 2.    |
| Melon - tun          | 227. F. V. 3.    |

# NOMENCLATOR ANGLICVS.

|                      | Pag.            |
|----------------------|-----------------|
| Midas Ear            | 196. F. I. 1.   |
| Monk, gray           | 137. C. II. 5.  |
| Mulberry Shell       | 302. I. IV. 4.  |
| Murex blue and white | 305. I. IV. 8.  |
| — common, thormey    | 286. I. I. 4.   |
| — pointed            | 313. I. V. 8.   |
| Muscle conted        | 74. N. II. 2.   |
| Musk Shell           | 218. F. IV. 10. |
| — oriental           | 221. F. IV. 12. |
| — white              | 224. F. IV. 13. |

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| <b>N</b> ail scallop, wife of | 66. M. 2.        |
| Nassau Shell                  | 347. L. II. 2.   |
| Nerit, deep, rig'd            | 426. O. III. 13. |
| — red                         | 419. O. III. 1.  |
| — twin girdled                | 413. O. I. 3.    |
| — white                       | 406. O. I. 6.    |
| Nestors - top, great          | 351. L. II. 6.   |
| Nipple Gowry - kin, white     | 185. E. 4.       |
| Noahs Lighter                 | 73. N. II. 1.    |

# Englische Benennungen.

Pag.

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| <b>O</b> aker -wood Stamper | 140. C. II. 10. |
| Olive Gowry, freckled       | 171. D. III. 3. |
| Olive Shell                 | 198. F. II. 2.  |
| — clouded                   | 202. F. II. 3.  |
| Oren Shell                  | 456. S. 7.      |
| Oxheart Cockle              | 31. G. 7.       |
| Oxheart Shell, rough        | 32. G. 9.       |
| Oyster                      | 99. O. IV. 4.   |
| — chinese pelluind          | 105. P. 7.      |
| — great prikley             | 64. L. I.       |

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| <b>P</b> aper Nautilus     | 119. A. I.      |
| Parement, italian          | 131. C. I. 8.   |
| Partridge great, spat ribd | 231. G. I. 5.   |
| — indian                   | 229. G. I. 2.   |
| — round                    | 191. E. 13.     |
| — thik lipd                | 230. G. I. 3.   |
| Pearl Gowry                | 182. D. IV. 17. |
| Pearl Oyster               | 108. Q. II. 1.  |
| — the flat                 | 101. O. IV. 7.  |

# NOMENCLATOR ANGLICVS.

|                         | Pag.              |
|-------------------------|-------------------|
| Pearl river muscle      | 11. D. 2.         |
| Peg, white snouted      | 323. I. VI. 1.    |
| Perian Shell            | 247. G. V. 2.     |
| Pholas, deaeap furrowed | 8. C. 2.          |
| Pidak, oblong white     | 7. C. 1.          |
| Plough                  | 271. H. II. 2.    |
| Poeloroon Nerit         | 422. O. III. 7.   |
| Popes Crown, knopped    | 325. I. VI. 3.    |
| Porcelain, yellow zoned | 162. D. I. 9.     |
| Porphyry Shell          | 151. C. III. 9.   |
| Pot wattering           | 457. S. 9.        |
| Prince Stamper          | 199. F. II. 2. 8. |

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| <b>R</b> amshorn              | 122. B. 2.      |
| Razor Shell, blueifch crooked | 15. E. 3.       |
| — — little, itrait            | 13. E. 2.       |
| — — thik                      | 13. E. 1.       |
| Rice Gowry                    | 180. D. IV. 14. |
| River ragged mouth            | 373. N. I. 1.   |



# Englische Benennungen

|                               | Pag.                  |
|-------------------------------|-----------------------|
| <b>S</b> ail Shell thik       | 121. B. I.            |
| Sanditamper                   | 143. C. II. 13.       |
| Saylor, course brittle        | 120. A. I. $\beta$ .  |
| — great brittle               | 119. A. I. $\alpha$ . |
| Scallop, litte yellow         | 84. O. II. I.         |
| — thin                        | 82. O. I. 4.          |
| Sea Ear, long                 | 429. P. 4.            |
| Seeren Shell, rough           | 326. I. VI. I.        |
| Silver Gowry kin, blakspekled | 208. F. III. 4.       |
| Silvermouth                   | 348. L. II. 3.        |
| — — spotted                   | 858. L. III. 4.       |
| Snail, echinated              | 360. L. III. 6.       |
| — golden mouthed              | 349. L. II. 4.        |
| Snailshell, smouth girdled    | 384. N. III. 4.       |
| Snake Gowry, small            | 164. D. II. I.        |
| Snippe, thorney               | 285. I. I. 3.         |
| Solen, thik, red              | 16. E. 5.             |
| — violet purple, papyraceons  | 15. E. 4.             |
| Spider Shell                  | 269. H. I. 5.         |
| Spindle Shell                 | 310. I. V. 3.         |
| Spinnet Shell                 | 333. K. I. 3.         |
| Spur Shell                    | 351. L. II. 7.        |

# NOMENCLATOR ANGLICVS.

|                         | Pag.            |
|-------------------------|-----------------|
| Spur Shell small        | 300. I. IV. 1.  |
| Stair Case, royal       | 362. L. IV. 1.  |
| — — small               | 363. L. IV. 2.  |
| Stamper, net lifted     | 129. C. I. 5.   |
| Starkake, wrinkled      | 4. B. 4.        |
| Star Gowry              | 178. D. IV. 10. |
| Strawberry heart Cockle | 30. G. 5.       |
| — — red                 | 33. G. 10.      |
| Stone piercer           | 109. Q. III. 1. |
| Stone whelk             | 196. I. III. 6. |

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| <b>T</b> abby Stamper | 148. C. III. 6. |
| Tellin, rayed         | 19. F. I. 3.    |
| Thik-top              | 339. K. II. 3.  |
| Top, great waved      | 331. K. I. 1.   |
| Tooth Shell, striated | 449. R. 2.      |
| Tourtlet Govry, great | 159. D. I. 5.   |
| —— Leopard great      | 165. D. II. 2.  |
| Tree Oyster           | 97. O. IV. 2.   |
| Tritons Trumpet       | 316. I. V. 12.  |

Tro -

# Englische Benennungen.

|                   | Pag.             |
|-------------------|------------------|
| Trochus , prikley | 350. L. II. 5.   |
| Trumpet - knobbed | 294. I. III. 3.  |
| Tullip tellina    | 23. F. II. 4.    |
| Tulip Shell       | 154. C. IV. 4.   |
| Tyger Shell       | 124. C. I. 1.    |
| Tygershorn brownn | 257. G. VIII. 2. |
| Tygerstamper      | 149. C. III. 7.  |
| Tyger tooth       | 256. G. VIII. 1. |

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>V</b> elk Nerit | 415. O. I. 5. |
|--------------------|---------------|

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| <b>W</b> art Gowry | 182. D. IV. 16. |
| Wax Stamper        | 130. C. I. 7.   |
| Wedge Muscle       | 24. F. II. 4.   |
| Whelk              | 254. G. VII. 3. |
| — common english   | 315. I. V. 11.  |
| — great net        | 279. H. III. 4. |
| — heary            | 297. I. III. 8. |
| — least ragged     | 290. I. II. 4.  |

# NOMENCLATOR ANGLICVS.

|                   | Pag.            |
|-------------------|-----------------|
| Whelk persian     | 235. G. II. 4.  |
| — small laticed   | 254. G. VII. 4. |
| — small prikle    | 304. I. IV. 7.  |
| — small rough     | 252. G. VII. I. |
| — spiked          | 276. H. III. I. |
| Whirligig, Indian | 344. K. III. I. |
| Woman, old        | 45. K. I. 2.    |
| Woodcock Shell    | 283. I. I.      |
| — — thorney       | 284. I. I. 2.   |

**Z**igzag Chama 53. K. II. 12.

---

W I E N ,  
gedruckt bei Joseph Gerold, kaisert. Reichshof-  
raths- und Universitätsbuchdruckern.

I 7 7 8.

# E R R A T A.

Pag.

corrigé

|                                                  |                                         |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 21. F. I. 6. Knor. Vergn. II. 20. t. 1. f.       | II. 20. t. 5. f.                        |
| 21. F. I. 6. — — — VI. 11. t. 2. f.              | V. 11. t. 2. f.                         |
| 23. F. II. 4. — — — II. 19. t.                   | I; 19. t.                               |
| 23. F. II. 4. — — — IV. 2. t; 24. f.             | IV. 2. t. 4. f.                         |
| 24. F. II. 5. — — — II. 2. t.                    | IV. 2. t.                               |
| 26. F. III. 1. List. H. C. 1. 2.                 | List. H. C. 1. 3.                       |
| 26. F. III. 2. mondförmigen                      | mondförmigen                            |
| 27. F. III. 3. List. H. C. 1. 2.                 | List. H. C. 1. 3.                       |
| 29. G. 2. Knor. Vergn. I, 18. t. 2. f.           | I. 18. t. 3. f.                         |
| 42. I. 3. Das Stümpchen                          | Das Stümpchen.                          |
| 42. I. 5. Donax                                  | Donax.                                  |
| 42. I. 5. Knor. Vergn. V.                        | Knor. Vergn. VI.                        |
| 50. K. II. 7. — — — II.                          | — — — VI.                               |
| 54. K. II. 12. — — — I. 21. t. 4. f.             | — — — I. 21. t. 5. f.                   |
| 54. K. II. 13. Zigzag                            | Zigzag.                                 |
| 63. L. dicke Zähne, zwischen eine Grube          | dicke Zähne, und dazwischen eine Grube. |
| 7. M. 8. verlängerte Schale                      | verlängerte Klappe.                     |
| 75. N. II. 2. Knor. Vergn. II. 27. t.            | II. 2. t.                               |
| 90. O. III. 9.                                   | O. II. 9.                               |
| 96. O. III. 4. Ostrea                            | Ostrea.                                 |
| 101. O. IV. 7. glattgedrückte                    | plattgedrückte.                         |
| 138. C. II. 7. breite eiförmige                  | nezförmige.                             |
| 158. D. I. 4. Grand Argus                        | Grand Argus.                            |
| 160. D. I. 6. Lian S. N. Sp. 320.                | S. N. Sp. 330.                          |
| 174. D. IV. 3. Knor. Vergn. II. 9. t.            | IV. 9. t.                               |
| 188. E. 9. verkehrt eiförmige                    | fast eiförmige                          |
| 203. F. II. 4. schief gespaltene                 | schief gefaltene.                       |
| 204. F. II. 4. γ. lang mit braunen               | weiß mit braunen                        |
| 204. F. II. 4. δ. Knor. Vergn. VI. 34. t. 45. f. | VI. 34. t. 4. 5. f.                     |
| 209. Knor. Vergn. IV. 21. t. 3. 4. f.            | IV. 21. t. 3. f.                        |
| 215. F. IV. 5. longitudinalibus                  | longitudinaliter.                       |
| 221. D. Hebraïque                                | L'hebraïque.                            |
| 224. F. IV. 16. β. Knor. Vergn. VI. 22. 2. f.    | VI. 27. t. 2. f.                        |
| 227. F. V. 3. Knor. Vergn. V. 28. t. 1. f.       | V. 28. t. 2. f.                         |
| 238. G. II. 7. — — — III. 8. n. 2. f.            | III. 8. t. 2. f.                        |
| 276. H. III. 1. tuberculato                      | tuberculata.                            |
| 283. I. I. 1. the common                         | the common.                             |
| 309. I. V. 1. Argenv. Conch. Pl. 12. f. M.       | Pl. 9. f. M.                            |
| 312. I. V. 5. — — — Pl. 0. f. A.                 | Pl. 9. f. A.                            |
| 319. I. V. 16. — — — Pl. 13. f. K.               | Pl. 10. f. K.                           |
| 318. I. VI. 7. — — — Pl. 11. f. L.               | Pl. 11. f. α.                           |
| 311. I. VI. 7. Obelisc chinois                   | Obelisc chinois.                        |
| 328. I. VI. 7. β. ex fusco luteo                 | ex fusco luteo.                         |
| 333. K. I. 3. Argenv. Conch. Pl. 9. f. M.        | Pl. 8. f. M.                            |
| 334. K. I. 4. — — — Pl. 11. f. L. Q.             | Pl. 8. f. L. Q.                         |



314. K. I. 5. le Sorciere  
 335. K. I. 5. Argenv. Conch. Pl. 11. f. S.  
 313. K. II. 9. Turbo crocatus  
 348. Knor. Vergn. I. 3. t. 3. f.  
 349. L. 4. Schale hot  
 350. L. II. 6 ist mit auf den Gewinden  
 351. L. II. 7 Blattgedrückten  
 352. L. II. 7 Knor. Vergn. III. 20 t. 1. f.  
 352. L. II. 8. gestreifte Schale hat  
 354. L. II. 10. convexo nodosa obtusa  
 365. L. IV. 4. Berl Mag. IV 3. t. 3. f.  
 376. N. II. 5. Knor. Vergn. VI. 26. t.  
 380. N. II. 12. Helix maculata  
 381. N. III. 2 gelblicher Schale  
 403. N. V. 3. Helix plicata  
 425. O. III. 11. Knor. Vergn. II. 9. t. 1. f.  
 449. R. I. Knor. Vergn. I. 19. t.  
 458. Knor. Vergn. IV. 28. t. 2. f.

la Sorciere.  
 Pl. 8. f. S  
 Trochus crocatus.  
 I 2. t. 4.  
 Schale ist  
 ist auf den Gewinden.  
 platgedrückten.  
 IV. 4 t. 2. f.  
 gestreifte Schale ist.  
 convexa obtusa.  
 ammittatur.  
 V. 26. t.  
 Helix maculosa.  
 gelblicher Farbe.  
 Helix plicaria.  
 ommittatur.  
 29. t.  
 IV. 28. t. 1. f.


















Date Du



3 2044 072 210 636

